

ЛОХОВЫЕ (*ELAEAGNACEAE* LINDL.)



Лох серебристый (*Elaeagnus argentea* Pursh.) растет на востоке Северной Америки. В культуре известен с 1813 г.

Листопадный кустарник или небольшое деревце до 4 м высотой с широкоэллиптической кроной. Кора на старых деревьях серовато-бурая, побеги буро-красные от красновато-коричневых чешуек, бесколючковые.

Листья яйцевидные или продолговато-ланцетные, 2–10 см длиной,

кожистые, серебристые с обеих сторон, на нижней стороне с коричневыми чешуйками. Ароматные цветки в пазухах листьев по 1–3, мелкие, поникающие, снаружи серебристые, внутри желтые, на маленьких цветоножках. Цветение с июня по июль, изредка может повторяться в августе. Продолжительность цветения – 15–20 дней. Плод – костянка, шаровидной или яйцевидной формы, небольшого размера (до 1 см), с серебристым оттенком. Плодоносить начинает в возрасте 7–10 лет. Плоды созревают к августу – сентябрю. Вкус плода очень гармоничный, напоминает сладкую бруснику, но едят его редко, так как косточка составляет значительную часть и без того маленького плода.

Зимостоек, морозостоек, светолюбив, засухоустойчив. Неприхотлив к почвенным условиям, успешно растет на песчаных, сильно оподзоленных супесях и суглинках. Устойчив к дыму и газам. Выдерживает городские условия. Хорошо переносит пересадку и обрезку. Отличается довольно медленным ростом и способностью разрастаться за счет обильной корневой поросли.

Размножается семенами, черенками и корневыми отпрысками.

Декоративен серебристыми листьями, формой роста и плодами. Особенно хорош в контрастных композициях в сочетании с краснолистными и золотистыми формами, хвойными породами, в одиночной и групповой посадке, в виде живых изгородей. Прекрасная порода для закрепления откосов. Рекомендуется для использования в одиночных и групповых посадках, на светлых опушках.



Облепиха крушиновая (*Hippophae rhamnoides* L.) – дерево или кустарник высотой до 6 м.

Произрастает на Кавказе, юге Западной и Восточной Сибири, в Азии, Западной Европе.

Отличается желтовато-серой, желто-бурой и черной корой. Молодые побеги заканчиваются колючками. Пластинки листьев линейные и линейно-ланцетные, 2–8 см длиной и 0,2–0,8 см шириной, на верхушке тупые, к основанию суженные, со слегка завернутыми краями. Листья очередные, зеленые в мелких точках сверху, серовато-белые или серебристые, или ржаво-золотистые с нижней стороны от густо покрывающих их звездчатых чешуек.

Цветки появляются раньше листьев. Они однополые мелкие, невзрачные и сидят либо скученно, в коротких колосовидных соцветиях при основании молодых побегов (мужские), либо по одному (реже по 2–5) в пазухе кроющей чешуйки (женские).

Растение двудомное. Плод ложный (костянка), состоящий из орешка, одетого разросшимся, сочным мясистым, гладким и блестящим цветоложем. Зрелые костянки сочные, многочисленные, различных оттенков оранжевого цвета, съедобные. Расположены так, как бы «облепляя» ветви (отсюда и русское название растения). Плод имеет шарообразную или вытянутую форму.