



В СОДЕРЖАНИЕ

Тестирование проводится в письменном виде: каждому студенту выдается один из 15 вариантов тестовых заданий. Каждое задание включает 70 тестов, причем 21–35 вопросов каждого теста по четырем из перечисленных выше семи разделов (так как согласно положению трудоемкость выполнения студентом контрольной работы должна составлять 30–50 % от общего объема материала изучаемой дисциплины): патологическая анатомия и патологическая физиология, фармакология, клиническая диагностика, хирургия, внутренние незаразные болезни, эпизоотология, паразитология.

Для успешного выполнения тестовых заданий необходимо правильно ответить не менее чем на 42 из 70 предложенных тестов (60 %). Продолжительность тестирования составляет до 30 минут.

Тесты для текущего контроля знаний по учебной дисциплине «Основы ветеринарной медицины»

Патологическая анатомия и физиология

1. Что не относится к внешним признакам воспаления?

- а) покраснение ткани
- б) припухлость
- в) болезненность
- г) местное повышение температуры
- д) нарушение эластичности кожи

2. Укажите правильную последовательность периодов болезни:

- а) скрытый, инкубационный, период клинически выраженной болезни, смерть
- б) скрытый, подострый, период клинически выраженной болезни, агония, смерть
- в) молниеносный, острый, подострый, хронический
- г) скрытый, продромальный, период клинически выраженной болезни, завершающий
- д) инкубационный, продромальный, хронический, завершающий, смерть

3. Этиология – это:

- а) наука о причинах и условиях возникновения болезней
- б) наука об особенностях поведения животных
- в) наука о инфекционных болезнях животных, птиц, рыб и пчёл
- г) раздел паразитологии, изучающий насекомых и вызываемые ими болезни
- д) местное расстройство кровообращения

4. Условия возникновения болезней делятся на:

- а) поверхностные и глубокие
- б) механические, физические, химические и биологические
- в) общие и видовые
- г) патологические и физиологические
- д) способствующие и предрасполагающие

5. Атрофия – это:

- а) повышенная или качественно измененная чувствительность организма к веществам антигенной и реже гап-тенной природы
- б) уменьшение органа или клеток в размерах и ослабление их функции
- в) устойчивость организма к действию патогенных факторов
- г) свойство организма реагировать изменением жизнедеятельности на воздействие окружающей среды
- д) отсутствие всех видимых признаков жизни, с сохранением обмена веществ на минимальном уровне

6. Укажите виды патологической атрофии:

- а) сухая, влажная, газовая
- б) циркуляторная, функциональная, неврогенная, от давления



- в) зернистая, вакуольная, гиалиново-капельная, роговая
- г) белковая, жировая, углеводная, минеральная
- д) рабочая, викарная, вакатная

7. *Дистрофия – это:*

- а) изменение физико-химических свойств, морфологии клеток и тканей организма и снижение их функции
- б) отсутствие всех видимых признаков жизни, с сохранением обмена веществ на минимальном уровне
- в) уменьшение органа или клеток в размерах и ослабление их функции
- г) местная смерть, омертвление или гибель отдельных клеток, органов или частей тела в живом организме
- д) увеличение объема органа за счет нарастания массы отдельных функциональных единиц

8. *Укажите виды дистрофии:*

- а) сухая, влажная, газовая
- б) циркуляторная, функциональная, неврогенная, от давления
- в) организация, инкапсуляция, трансплантация
- г) белковая, жировая, углеводная, минеральная
- д) рабочая, викарная, вакатная

9. *Что из перечисленного не относится к гипобиотическим процессам?*

- а) атрофия
- б) гипертрофия
- в) дистрофия
- г) некроз
- д) гангрена

10. *Что из перечисленного не относится к гипобиотическим процессам?*

- а) атрофия
- б) некроз
- в) дистрофия
- г) регенерация тканей
- д) гангрена

11. *Что из перечисленного не относится к гипобиотическим процессам?*

- а) атрофия
- б) гангрена
- в) дистрофия
- г) некроз
- д) опухолевый рост тканей

12. *Что из перечисленного не относится к гипербиотическим процессам?*

- а) регенерация тканей
- б) гипертрофия
- в) дистрофия
- г) гиперплазия
- д) опухолевый рост тканей

13. *Что из перечисленного не относится к гипербиотическим процессам?*

- а) регенерация тканей
- б) гипертрофия
- в) гиперплазия
- г) атрофия
- д) опухолевый рост тканей

14. *Что из перечисленного не относится к гипербиотическим процессам?*

- а) некроз
- б) гипертрофия
- в) регенерация тканей
- г) гиперплазия
- д) опухолевый рост тканей

15. *К расстройствам периферического кровообращения не относится:*

- а) инфаркт
- б) гиперемия
- в) альтерация
- г) тромбоз



д) эмболия

16. К расстройствам периферического кровообращения не относится:

- а) гипогликемия
- б) гиперемия
- в) стаз
- г) тромбоз
- д) эмболия

17. К расстройствам периферического кровообращения не относится:

- а) инфаркт
- б) гиперемия
- в) кровотечение
- г) пролиферация
- д) эмболия

18. К расстройствам периферического кровообращения не относится:

- а) инфаркт
- б) ишемия
- в) тромбоз
- г) эмболия
- д) некроз

19. К расстройствам периферического кровообращения не относится:

- а) гипотермия
- б) гиперемия
- в) стаз
- г) тромбоз
- д) эмболия

20. Что из перечисленного относится к расстройствам периферического кровообращения?

- а) гипертермия
- б) атрофия
- в) альтерация
- г) некроз
- д) эмболия

21. Что из перечисленного относится к расстройствам периферического кровообращения?

- а) гипотермия
- б) инфаркт
- в) альтерация
- г) некроз
- д) атрофия

22. Что из перечисленного относится к расстройствам периферического кровообращения?

- а) гипогликемия
- б) атрофия
- в) стаз
- г) некроз
- д) пролиферация

23. Что из перечисленного относится к расстройствам периферического кровообращения?

- а) пролиферация
- б) гипогликемия
- в) альтерация
- г) ишемия
- д) некроз

24. Гипертрофия – это:

- а) увеличение объема органа за счет нарастания массы отдельных функциональных единиц
- б) увеличение размеров органа или ткани за счет размножения клеточных элементов
- в) называется процесс восстановления структурных элементов клеток и тканей взамен погибших
- г) это механическая закупорка сосудов обычно не свойственными крови частицами
- д) отсутствие всех видимых признаков жизни, с сохранением обмена веществ на минимальном уровне

25. Гиперплазия – это:



- а) уменьшение органа или клеток в размерах и ослабление их функции
- б) увеличение размеров органа или ткани за счет размножения клеточных элементов
- в) изменение физико-химических свойств, морфологии клеток и тканей организма и снижение их функции
- г) увеличение объема органа за счет нарастания массы отдельных функциональных единиц
- д) отсутствие всех видимых признаков жизни, с сохранением обмена веществ на минимальном уровне

26. *Артериальная гиперемия – это:*

- а) замедление и полное прекращение тока крови в капиллярах, мелких артериях и венах
- б) прижизненное образование в кровеносных сосудах или полостях сердца плотных масс из крови
- в) затруднённый отток крови по венам при нормальном её притоке по артериям
- г) усиление притока крови к органам или тканям при её нормальном оттоке по венам
- д) ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к тканям

27. *Венозная гиперемия – это:*

- а) замедление и полное прекращение тока крови в капиллярах, мелких артериях и венах
- б) прижизненный выход крови из сосудов
- в) затруднённый отток крови по венам при нормальном её притоке по артериям
- г) усиление притока крови к органам или тканям при её нормальном оттоке по венам
- д) ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к тканям

28. *Гиперемия – это:*

- а) замедление и полное прекращение тока крови в капиллярах, мелких артериях и венах
- б) прижизненный выход крови из сосудов
- в) увеличение размеров органа или ткани за счет размножения клеточных элементов
- г) ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к тканям
- д) избыточное кровенаполнение органов или тканей

29. *Ишемия – это:*

- а) замедление и полное прекращение тока крови в капиллярах, мелких артериях и венах
- б) прижизненный выход крови из сосудов
- в) увеличение размеров органа или ткани за счет размножения клеточных элементов
- г) ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к тканям
- д) избыточное кровенаполнение органов или тканей

30. *Стаз – это:*

- а) замедление и полное прекращение тока крови в капиллярах, мелких артериях и венах
- б) затруднённый отток крови по венам при нормальном её притоке по артериям
- в) отсутствие всех видимых признаков жизни, с сохранением обмена веществ на минимальном уровне
- г) ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к тканям
- д) избыточное кровенаполнение органов или тканей

31. *Тромбоз – это:*

- а) замедление и полное прекращение тока крови в капиллярах, мелких артериях и венах
- б) затруднённый отток крови по венам при нормальном её притоке по артериям
- в) прижизненное образование в кровеносных сосудах или полостях сердца плотных масс из крови
- г) ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к тканям
- д) механическая закупорка сосудов обычно не свойственными крови частицами

32. *Эмболия – это:*

- а) замедление и полное прекращение тока крови в капиллярах, мелких артериях и венах
- б) механическая закупорка сосудов обычно не свойственными крови частицами
- в) местная смерть, омертвление или гибель отдельных клеток, органов или частей тела в живом организме
- г) ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к тканям
- д) прижизненное образование в кровеносных сосудах или полостях сердца плотных масс из крови

33. *Инфаркт – это:*

- а) отсутствие всех видимых признаков жизни, с сохранением обмена веществ на минимальном уровне
- б) механическая закупорка сосудов обычно не свойственными крови частицами
- в) местная смерть, омертвление или гибель отдельных клеток, органов или частей тела в живом организме
- г) ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к тканям
- д) некротический очаг в ткани или органе, возникший вследствие прекращения кровообращения

34. *К патологии тепловой регуляции не относится:*

- а) гипотермия



- б) воспаление
- в) лихорадка
- г) гипертермия
- д) солнечный удар

35. *Гипотермия – это:*

- а) стойкое снижение температуры тела вследствие уменьшения теплосодержания в организме
- б) чрезмерное воздействие прямых солнечных лучей на область головы
- в) изменение терморегуляции и повышение температуры тела под действием патогенных факторов
- г) пассивное повышение температуры тела вследствие внешнего перегрева
- д) солнечный удар

36. *Гипертермия – это:*

- а) стойкое снижение температуры тела вследствие уменьшения теплосодержания в организме
- б) чрезмерное воздействие прямых солнечных лучей на область головы
- в) изменение терморегуляции и повышение температуры тела под действием патогенных факторов
- г) пассивное повышение температуры тела вследствие внешнего перегрева
- д) солнечный удар

37. *Лихорадка – это:*

- а) стойкое снижение температуры тела вследствие уменьшения теплосодержания в организме
- б) чрезмерное воздействие прямых солнечных лучей на область головы
- в) изменение терморегуляции и повышение температуры тела под действием патогенных факторов
- г) пассивное повышение температуры тела вследствие внешнего перегрева
- д) солнечный удар

38. *Воспаление включает в себя следующие стадии:*

- а) альтерация, экссудация, пролиферация
- б) истощение, подъём температуры, адаптация
- в) подъём температуры, регенерация, инкапсуляция
- г) дистрофия, адаптация, регенерация
- д) дистрофия, инкапсуляция, регенерация

39. *Отсутствие аллергической реакции на повторное введение антигена (аллергена) называется:*

- а) анафилактический шок
- б) псевдоаллергическая реакция
- в) параллергическая реакция
- г) анергия
- д) иммунологическая толерантность

40. *Неспособность организма отвечать синтезом антител на введение определенного антигена называется:*

- а) анафилактический шок
- б) псевдоаллергическая реакция
- в) параллергическая реакция
- г) анергия
- д) иммунологическая толерантность

41. *Явление, при котором сенсibilизация организма одним антигеном, делает его чувствительным к другому антигену, называется:*

- а) анафилактический шок
- б) псевдоаллергическая реакция
- в) параллергическая реакция
- г) анергия
- д) иммунологическая толерантность

42. *Аллергические реакции, вызванные теми же антигенами, которыми сенсibilизирован организм, называется:*

- а) анафилактический шок
- б) неспецифические аллергические реакции
- в) специфические аллергические реакции
- г) анергия
- д) иммунологическая толерантность

43. *«Комплекс наук о строении и жизнедеятельности здорового и больного организма, причинах и сущности болезней животных, птиц, рыб и пчел, методах их диагностики, лечения и профилактики» – это определение:*



- а) эпизоотологии
- б) ветеринарной медицины
- в) внутренних незаразных болезней
- г) болезни
- д) этиологии

44. «Качественно новый процесс деятельности организма под действием чрезвычайного раздражителя, проявляющийся повреждением физиологических систем с одновременной мобилизацией защитных механизмов и выражающийся снижением или потерей продуктивности» – это определение:

- а) эпизоотологии
- б) ветеринарной медицины
- в) внутренних незаразных болезней
- г) болезни
- д) этиологии

45. Изменение структуры и функции определённых систем организма в условиях патологической регуляции называется:

- а) патологический процесс
- б) болезнь
- в) воспаление
- г) патологическое состояние
- д) патогенез

46. Стойкое изменение структуры и функции тканей, вызванное патологическим процессом называется:

- а) клинические симптомы болезни
- б) болезнь
- в) воспаление
- г) патологическое состояние
- д) патогенез

47. Время от начала действия причины до появления первых симптомов – это:

- а) продромальный период болезни
- б) патогенез
- в) скрытый (инкубационный, латентный) период болезни
- г) патологическое состояние
- д) патологический процесс

48. Время от появления первых симптомов до их полного развития – это:

- а) продромальный период болезни
- б) патологический процесс
- в) период клинически выраженной болезни
- г) патологическое состояние
- д) патогенез

49. Появление симптомов и синдромов, присущих данной болезни – это:

- а) продромальный период болезни
- б) патологический процесс
- в) период клинически выраженной болезни
- г) патологическое состояние
- д) патогенез

50. Реакция организма на воздействие генетически чужеродных веществ, обеспечивающая постоянство внутренней среды организма, реакции биологической несовместимости и повышенной чувствительности называется:

- а) анафилактический шок
- б) псевдоаллергическая реакция
- в) параллергическая реакция
- г) иммунитет
- д) иммунологическая толерантность

51. Сильно повышенная чувствительность организма на повторное парентеральное введение аллергена называется:

- а) анафилактический шок
- б) псевдоаллергическая реакция



- в) параллергическая реакция
- г) иммунитет
- д) иммунологическая толерантность

52. Сильно повышенная чувствительность организма на повторное парентеральное введение аллергена называется:

- а) параллергическая реакция
- б) псевдоаллергическая реакция
- в) аллергическая реакция немедленного действия
- г) анергия
- д) иммунологическая толерантность

53. Повышенная или качественно измененная чувствительность организма к веществам антигенной и реже гаптенной природы называется:

- а) параллергическая реакция
- б) аллергия
- в) псевдоаллергическая реакция
- г) анергия
- д) иммунологическая толерантность

54. Уменьшение органа или клеток в размерах и ослабление их функции называется:

- а) дистрофия
- б) анергия
- в) атрофия
- г) реактивность
- д) иммунологическая толерантность

55. Устойчивость организма к действию патогенных факторов называется:

- а) дистрофия
- б) резистентность
- в) анергия
- г) реактивность
- д) иммунологическая толерантность

56. Свойство организма реагировать изменением жизнедеятельности на воздействие окружающей среды называется:

- а) дистрофия
- б) резистентность
- в) анергия
- г) реактивность
- д) иммунологическая толерантность

57. Отсутствие всех видимых признаков жизни, с сохранением обмена веществ на минимальном уровне называется:

- а) клиническая смерть
- б) резистентность
- в) анергия
- г) реактивность
- д) иммунологическая толерантность

58. Изменение физико-химических свойств, морфологии клеток и тканей организма и снижение их функции называется:

- а) клиническая смерть
- б) дистрофия
- в) анергия
- г) реактивность
- д) атрофия

59. Местная смерть, омертвление или гибель клеток, органов или частей тела в живом организме называется:

- а) клиническая смерть
- б) дистрофия
- в) анергия
- г) некроз
- д) атрофия



60. Увеличение объема органа за счет нарастания массы отдельных функциональных единиц называется:

- а) гипертрофия
- б) дистрофия
- в) атрофия
- г) гиперплазия
- д) опухолевый рост тканей

61. Увеличение размеров органа или ткани за счет размножения клеточных элементов называется:

- а) гипертрофия
- б) дистрофия
- в) атрофия
- г) гиперплазия
- д) опухолевый рост тканей

62. Усиление притока крови к органам или тканям при её нормальном оттоке по венам называется:

- а) венозная гиперемия
- б) эмболия
- в) ишемия
- г) артериальная гиперемия
- д) кровотечение

63. Затруднённый отток крови по венам при нормальном её притоке по артериям называется:

- а) венозная гиперемия
- б) эмболия
- в) ишемия
- г) артериальная гиперемия
- д) кровотечение

64. Ограничение или полное прекращение притока артериальной крови к тканям называется:

- а) венозная гиперемия
- б) эмболия
- в) ишемия
- г) стаз
- д) некроз

65. Замедление и полное прекращение тока крови в капиллярах, мелких артериях и венах называется:

- а) венозная гиперемия
- б) эмболия
- в) ишемия
- г) стаз
- д) некроз

66. Механическая закупорка сосудов обычно не свойственными крови частицами называется:

- а) инфаркт
- б) эмболия
- в) ишемия
- г) стаз
- д) некроз

67. Некротический очаг в ткани или органе, возникший вследствие прекращения кровообращения называется:

- а) инфаркт
- б) альтерация
- в) ишемия
- г) пролиферация
- д) некроз

68. Изменение терморегуляции и повышение температуры тела под действием патогенных факторов называется:

- а) гипотермия
- б) воспаление
- в) лихорадка
- г) гипертермия
- д) солнечный удар



69. Укажите одну из стадий воспаления:

- а) стадия адаптации
- б) стадия истощения
- в) стадия альтерации
- г) стадия возбуждения
- д) стадия подъёма температуры

70. Укажите одну из стадий воспаления:

- а) стадия подъёма температуры
- б) стадия истощения
- в) стадия возбуждения
- г) стадия экссудации
- д) стадия адаптации

71. Укажите одну из стадий воспаления:

- а) стадия истощения
- б) стадия пролиферации
- в) стадия адаптации
- г) стадия подъёма температуры
- д) стадия возбуждения

72. Укажите одну из стадий гипертермии:

- а) стадия адаптации
- б) стадия стояния температуры
- в) стадия альтерации
- г) стадия подъёма температуры стадия возбуждения
- д) стадия падения температуры до нормы

73. Укажите одну из стадий гипертермии:

- а) стадия стояния температуры
- б) стадия подъёма температуры
- в) стадия пролиферации
- г) стадия возбуждения
- д) стадия падения температуры до нормы

74. Укажите одну из стадий гипотермии:

- а) стадия потовыделения
- б) стадия истощения
- в) стадия подъёма температуры
- г) стадия падения температуры до нормы
- д) стадия стояния температуры

75. Укажите одну из стадий лихорадки:

- а) стадия адаптации
- б) стадия истощения
- в) стадия подъёма температуры
- г) стадия возбуждения
- д) стадия альтерации

76. Потеря организмом внеклеточной и внутриклеточной жидкости называется:

- а) отёк
- б) экссудация
- в) водянка
- г) дегидратация
- д) гиперсекреция

77. Общее либо местное скопление жидкости в тканях, вследствие нарушения обмена воды между ними и кровью называется:

- а) отёк
- б) экссудация
- в) водянка
- г) дегидратация
- д) гиперсекреция



78. Скопление жидкости в серозных полостях тела при нарушении крово- и лимфообращения называется:

- а) отёк
- б) экссудация
- в) водянка
- г) дегидратация
- д) гиперсекреция

79. Потеря организмом внеклеточной и внутриклеточной жидкости называется:

- а) отёк
- б) экссудация
- в) водянка
- г) дегидратация
- д) гиперсекреция

Клиническая диагностика

80. Клиническое исследование включает в себя:

- а) общее исследование, осмотр, пальпацию
- б) осмотр, пальпацию, дополнительное исследование
- в) специальное исследование, аускультацию, дополнительное исследование
- г) общее исследование, перкуссию, аускультацию
- д) общее исследование, специальное исследование, дополнительное исследование

81. Пальпация бывает:

- а) поверхностная, глубокая, внутренняя
- б) общая, местная, внутренняя
- в) поверхностная, дигитальная, непосредственная
- г) общая, глубокая, специальная
- д) непосредственная, посредственная, местная

82. Для проведения инструментальной перкуссии необходимы:

- а) молоточек и стетоскоп
- б) плессиметр и фонендоскоп
- в) плессиметр и молоточек
- г) стетоскоп и фонендоскоп
- д) троакар и термометр

83. Нормальная температура тела у крупного рогатого скота:

- а) 40,5-42,0 °C
- б) 38,7-40,7 °C
- в) 37,5-39,0 °C
- г) 37,5-39,5 °C
- д) 38,0-40,0 °C

84. Нормальная температура тела у лошадей:

- а) 38,0-40,0 °C
- б) 37,5-38,5 °C
- в) 37,5-39,5 °C
- г) 37,5-39,0 °C
- д) 38,7-40,7 °C

85. Нормальная температура тела у мелкого рогатого скота:

- а) 38,5-40,0 °C
- б) 37,5-38,5 °C
- в) 38,7-40,7 °C
- г) 37,5-39,5 °C
- д) 37,5-39,0 °C

86. Нормальная температура тела у свиней:

- а) 40,5-42,0 °C
- б) 38,0-40,0 °C
- в) 37,5-38,5 °C
- г) 38,7-40,7 °C
- д) 37,5-39,0 °C

87. Габитус включает в себя:



- а) поза, темперамент, конституция, упитанность, телосложение
- б) руминация, темперамент, конституция, экстерьер, выход телят на 100 коров
- в) конституция, упитанность, телосложение, пульс, частота дыхания
- г) поза, темперамент, общее исследование, конституция, экстерьер
- д) поза, телосложение, конституция, экстерьер, руминация

88. *Общее исследование включает в себя:*

- а) габитус; исследование слизистых оболочек; осмотр; пальпацию; исследование поверхностных лимфоузлов
- б) исследование слизистых оболочек; осмотр; пальпацию; перкуссию; аускультацию
- в) габитус; исследование слизистых оболочек, кожи, шерстного покрова и поверхностных лимфоузлов; термометрию
- г) осмотр; пальпацию; перкуссию; аускультацию; термометрию
- д) осмотр; исследование слизистых оболочек, темперамента и поверхностных лимфоузлов; термометрию

89. *Пульс у крупного рогатого скота исследуют на:*

- а) наружной челюстной, височной артериях и артерии сафена
- б) наружной лицевой, хвостовой артериях и артерии сафена
- в) височной, хвостовой и наружной лицевой артериях
- г) наружной челюстной, хвостовой и бедренной артериях
- д) наружной лицевой, хвостовой и бедренной артериях

90. *Нормальная частота пульса у крупного рогатого скота за 1 минуту:*

- а) 70-80
- б) 24-42
- в) 50-80
- г) 60-90
- д) 70-120

91. *Нормальная частота пульса у лошадей за 1 минуту:*

- а) 24-42
- б) 50-80
- в) 70-80
- г) 80-140
- д) 60-90

92. *Нормальная частота пульса у свиней за 1 минуту:*

- а) 120-200
- б) 70-80
- в) 80-140
- г) 70-120
- д) 60-90

93. *Нормальная частота пульса у мелкого рогатого скота за 1 минуту:*

- а) 50-80
- б) 60-90
- в) 70-120
- г) 70-80
- д) 80-140

94. *При исследовании сердечного толчка определяют:*

- а) силу толчка, локализацию, болезненность
- б) ритм, частоту пульса, болезненность
- в) сердечные тоны, локализацию, частоту пульса
- г) частоту пульса, силу толчка, локализацию
- д) ритм, частоту пульса, силу толчка

95. *При перкуссии сердца у крупного рогатого скота его верхняя граница в норме находится:*

- а) на лопатко-плечевой линии
- б) на 2-3 см ниже лопатко-плечевой линии
- в) у локтевого бугра
- г) у заднего края лопатки
- д) в 3-ем межреберье

96. *При перкуссии сердца у лошадей его верхняя граница в норме находится:*

- а) на лопатко-плечевой линии



- б) на 2-3 см ниже лопатко-плечевой линии
- в) у локтевого бугра
- г) у заднего края лопатки
- д) в 3-ем межреберье

97. При перкуссии сердца у крупного рогатого скота его задняя граница в норме доходит до:

- а) 6-го ребра
- б) 7-го ребра
- в) 9-го ребра
- г) 5-го ребра
- д) 4-го ребра

98. При перкуссии сердца у лошадей его задняя граница в норме доходит до:

- а) 6-го ребра
- б) 7-го ребра
- в) 9-го ребра
- г) 5-го ребра
- д) 4-го ребра

99. Нормальная частота дыхательных движений в минуту у крупного рогатого скота составляет:

- а) 16-30
- б) 15-20
- в) 12-30
- г) 8-16
- д) 14-24

100. Нормальная частота дыхательных движений в минуту у лошадей:

- а) 16-30
- б) 15-20
- в) 12-30
- г) 8-16
- д) 14-24

101. Нормальная частота дыхательных движений в минуту у свиней:

- а) 16-30
- б) 15-20
- в) 12-30
- г) 8-16
- д) 14-24

102. Нормальная частота дыхательных движений в минуту у мелкого рогатого скота:

- а) 16-30
- б) 15-20
- в) 12-30
- г) 8-16
- д) 14-24

103. Исследование верхних дыхательных путей включает в себя:

- а) исследование носовых отверстий, лёгких, ротовой полости, трахеи
- б) исследование носовых отверстий, гортани, лёгких, грудной клетки
- в) исследование носовых отверстий, носовой полости, гортани, трахеи
- г) исследование носовой полости, выдыхаемого воздуха, трахеи, лёгких
- д) исследование носовых отверстий, носовой полости, трахеи, грудной клетки

104. При перкуссии лёгких по линии маклока их граница у крупного рогатого скота доходит в норме:

- а) справа и слева до 9-го ребра
- б) справа и слева до 12-го ребра
- в) справа до 12-го ребра, слева до 11-го ребра
- г) справа до 9-го ребра, слева до 12-го ребра
- д) справа до 11-го ребра, слева до 12-го ребра

105. При перкуссии лёгких по линии плечевого сустава их граница у крупного рогатого скота доходит в норме:

- а) справа и слева до 9-го ребра



- б) справа и слева до 12-го ребра
- в) справа и слева до 11-го ребра
- г) справа до 12-го ребра, слева до 11-го ребра
- д) справа до 11-го ребра, слева до 12-го ребра

106. При перкуссии лёгких по линии маклока их граница у лошадей доходит в норму:

- а) справа и слева до 15-го ребра
- б) справа и слева до 11-го ребра
- в) справа и слева до 17-го ребра
- г) справа и слева до 14-го ребра
- д) справа до 15-го ребра, слева до 17-го ребра

107. При перкуссии лёгких по линии седалищного бугра их граница у крупного рогатого скота доходит в норму:

- а) справа и слева до 17-го ребра
- б) справа и слева до 11-го ребра
- в) справа и слева до 15-го ребра
- г) справа и слева до 14-го ребра
- д) справа до 11-го ребра, слева до 12-го ребра

108. При перкуссии лёгких по линии плечевого сустава их граница у лошадей доходит в норму:

- а) справа и слева до 14-го ребра
- б) справа и слева до 9-го ребра
- в) справа и слева до 11-го ребра
- г) справа и слева до 15-го ребра
- д) справа до 12-го ребра, слева до 11-го ребра

109. У крупного рогатого скота рубец сокращается за 2 минуты:

- а) 3-6 раз
- б) 2-5 раз
- в) 4-8 раз
- г) 2-6 раз
- д) 3-5 раз

110. У овец рубец сокращается за 2 минуты:

- а) 3-6 раз
- б) 2-5 раз
- в) 4-8 раз
- г) 2-6 раз
- д) 3-5 раз

111. У коз рубец сокращается за 2 минуты:

- а) 3-6 раз
- б) 2-5 раз
- в) 4-8 раз
- г) 2-6 раз
- д) 3-5 раз

112. Перкуссия книжки у крупного рогатого скота осуществляется:

- а) справа по линии плечевого сустава в 7-10 межреберье
- б) слева по линии плечевого сустава в 10-12 межреберье
- в) справа по линии локтевого бугра в 7-10 межреберье
- г) слева по линии плечевого сустава в 7-10 межреберье
- д) справа по линии маклока в 10-12 межреберье

113. Печень исследуют клинически у:

- а) лошадей и свиней
- б) крупного рогатого скота и лошадей
- в) мелкого рогатого скота и свиней
- г) крупного рогатого скота и свиней
- д) крупного и мелкого рогатого скота

114. Область печёночного притупления в норму у крупного рогатого скота находится в пределах:

- а) 10-13-го межрёберных промежутков



- б) 8-12-го межрёберных промежутков
- в) 6-8-го межрёберных промежутков
- г) 10-12-го межрёберных промежутков
- д) 6-12-го межрёберных промежутков

115. Область печёночного притупления в норме у мелкого рогатого скота находится в пределах:

- а) 10-13-го межрёберных промежутков
- б) 8-12-го межрёберных промежутков
- в) 6-8-го межрёберных промежутков
- г) 10-12-го межрёберных промежутков
- д) 6-12-го межрёберных промежутков

116. При проведении диспансеризации у больных и часто болеющих животных обязательно исследуют:

- а) кровь, молоко, фекалии
- б) молоко, фекалии, соскоб с поверхности кожи
- в) фекалии, слюну, мочу
- г) кровь, молоко, мочу
- д) кровь, слюну, соскоб с поверхности кожи

117. Порядок клинического исследования сердечно-сосудистой системы:

- а) пульс, вены, сердце
- б) темперамент, пульс, сердечные шумы
- в) пульс, руминация, сердце
- г) пульс, вены, артерии
- д) сила сердечного толчка, болезненность сердечного толчка, определение границ сердца

118. Порядок клинического исследования дыхательной системы:

- а) ротовая полость, верхние дыхательные пути и придаточные пазухи, лёгкие
- б) носовые истечения, руминация, грудная клетка и лёгкие
- в) дыхательные движения, глотка, определение границ сердца и лёгких
- г) дыхательные движения, верхние дыхательные пути и придаточные пазухи, грудная клетка и лёгкие
- д) верхние дыхательные пути и придаточные пазухи, лёгкие, руминация

119. При исследовании мочеточников у крупных животных ректальной пальпацией в норме можно выявить, что:

- а) их диаметр около 1 см
- б) их диаметр около 2 см
- в) они не прощупываются из-за очень малого их диаметра – 3-4 мм
- г) их диаметр около 1,5 см
- д) до них невозможно достать рукой

120. Порядок клинического исследования нервной системы:

- а) габитус, наличие жвачки и глотательных движений, органы чувств, поза, двигательная сфера
- б) поведение, череп и позвоночник, темперамент, судороги, параличи
- в) череп и позвоночник, поверхностная чувствительность, поза, органы чувств
- г) габитус, поведение, органы чувств, мышечный тонус, двигательная сфера, темперамент
- д) поведение, череп и позвоночник, органы чувств, поверхностная чувствительность, двигательная сфера

121. Укажите расстройства мышечного тонуса:

- а) статическая атаксия, динамическая атаксия, спинальная атаксия
- б) гипотония, гипертония, спазм
- в) сонливость, спячка, коматозное состояние
- г) конвульсии, тремор, фибриллярная дрожь
- д) кифоз, лордоз, сколиоз

122. Укажите расстройства поведения животного:

- а) статическая атаксия, динамическая атаксия, спинальная атаксия
- б) гипотония, гипертония, спазм
- в) возбуждение, сонливость, спячка, коматозное состояние
- г) клонические, тонические и тетанические судороги
- д) кифоз, лордоз, сколиоз

123. Укажите расстройства координации движений:

- а) статическая атаксия, динамическая атаксия, спинальная атаксия



- б) гипотония, гипертония, спазм
- в) сонливость, спячка, коматозное состояние
- г) возбуждение, парезы, параличи
- д) кифоз, лордоз, сколиоз

124. Укажите расстройства координации движений:

- а) парезы, параличи
- б) гипотония, гипертония
- в) сонливость, спячка
- г) атаксия, гиперкинезы
- д) кифоз, лордоз, сколиоз

125. Общий метод клинического исследования путём прощупывания и осязания тканей называется:

- а) перкуссия
- б) аускультация
- в) пальпация
- г) фиксация
- д) определение габитуса

126. Общий метод клинического исследования путём выстукивания поверхности тела называется:

- а) перкуссия
- б) аускультация
- в) пальпация
- г) фиксация
- д) определение габитуса

127. Общий метод клинического исследования путём выслушивания органов и оценки звуков их работы называется:

- а) перкуссия
- б) аускультация
- в) пальпация
- г) фиксация
- д) определение габитуса

128. Анамнез – это:

- а) комплекс функциональных и морфологических изменений в органах и системах организма
- б) краткое заключение о сущности заболевания и состоянии организма
- в) предвидение развития и исхода заболевания
- г) комплекс сведений о животном, полученных путём опроса ухаживающего персонала или изучения документации
- д) общий метод клинического исследования животных при помощи зрения

129. Симптомы болезни – это:

- а) комплекс функциональных и морфологических изменений в органах и системах организма
- б) краткое заключение о сущности заболевания и состоянии организма
- в) предвидение развития и исхода заболевания
- г) комплекс сведений о животном, полученных путём опроса ухаживающего персонала или изучения документации
- д) общий метод клинического исследования животных при помощи зрения

130. Диагноз – это:

- а) комплекс функциональных и морфологических изменений в органах и системах организма
- б) краткое заключение о сущности заболевания и состоянии организма
- в) предвидение развития и исхода заболевания
- г) комплекс сведений о животном, полученных путём опроса ухаживающего персонала или изучения документации
- д) общий метод клинического исследования животных при помощи зрения

131. В племенных хозяйствах и станциях по искусственному осеменению для проведения диспансеризации кровь от коров и нетелей берут у:

- а) 20 % поголовья
- б) 30-40 % поголовья
- в) 20-30 % поголовья
- г) 50 % поголовья



д) 70 % поголовья

132. В племенных хозяйствах и станциях по искусственному осеменению для проведения диспансеризации молоко и мочу берут у:

- а) 20 % поголовья
- б) 10 % поголовья
- в) 10-15 % поголовья
- г) 20-30 % поголовья
- д) 25 % поголовья

133. В товарных хозяйствах для проведения диспансеризации кровь, молоко и мочу берут у:

- а) 5-15 % поголовья
- б) 5 % поголовья
- в) 10-20 % поголовья
- г) 25 % поголовья
- д) 30 % поголовья

134. Пульс у лошадей исследуют на:

- а) наружной челюстной и артерии сафена
- б) наружной лицевой, хвостовой артериях и артерии сафена
- в) наружной челюстной и височной артериях
- г) плечевой и хвостовой артериях
- д) бедренной артерии

135. Пульс у мелкого рогатого скота исследуют на:

- а) наружной челюстной и артерии сафена
- б) плечевой и бедренной артериях
- в) наружной челюстной и височной артериях
- г) наружной лицевой и хвостовой артериях
- д) хвостовой артерии и артерии сафена

136. Какому виду сельскохозяйственных животных зонд вводят через носовую полость?

- а) крупному рогатому скоту
- б) свиньям
- в) козам
- г) лошадям
- д) овцам

137. Пробу Рюгга используют при исследовании:

- а) книжки
- б) сетки
- в) рубца
- г) акта глотания
- д) сычуга

138. Исследование сычуга пальпацией проводят:

- а) слева по рёберной дуге с 9 по 12 ребро
- б) справа по линии плечевого сустава между 7-м – 10-м рёбрами
- в) справа по рёберной дуге с 9 по 12 ребро
- г) слева в верхней части 10-12-го межрёберных промежутков
- д) справа в верхней части 8-12-го межрёберных промежутков

139. Укажите один из этапов диспансеризации животных:

- а) осеннее-зимний
- б) диагностический
- в) текущий
- г) зимнее-весенний
- д) основной

140. Укажите один из этапов диспансеризации животных:

- а) биологический
- б) основной
- в) текущий
- г) физиологический
- д) профилактический



141. Патогенетическое действие лекарственных веществ проявляется:

- а) их влиянием лишь на определённый орган, ткань или биохимический процесс
- б) изменением функции многих тканей и органов
- в) развитием изменений в органах и системах, не имевших непосредственного контакта с лекарством
- г) влиянием на факторы непосредственно вызывающие заболевание
- д) повышением активности защитных реакций организма

142. Избирательное действие лекарственных веществ проявляется:

- а) их влиянием лишь на определённый орган, ткань или биохимический процесс
- б) изменением функции многих тканей и органов
- в) развитием изменений в органах и системах, не имевших непосредственного контакта с лекарством
- г) влиянием на факторы непосредственно вызывающие заболевание
- д) повышением активности защитных реакций организма

143. Общее действие лекарственных веществ проявляется:

- а) их влиянием лишь на определённый орган, ткань или биохимический процесс
- б) изменением функции многих тканей и органов
- в) развитием изменений в органах и системах, не имевших непосредственного контакта с лекарством
- г) влиянием на факторы непосредственно вызывающие заболевание
- д) повышением активности защитных реакций организма

144. Косвенное действие лекарственных веществ проявляется:

- а) их влиянием лишь на определённый орган, ткань или биохимический процесс
- б) изменением функции многих тканей и органов
- в) развитием изменений в органах и системах, не имевших непосредственного контакта с лекарством
- г) влиянием на факторы непосредственно вызывающие заболевание
- д) повышением активности защитных реакций организма

145. Этиотропное действие лекарственных веществ проявляется:

- а) их влиянием лишь на определённый орган, ткань или биохимический процесс
- б) изменением функции многих тканей и органов
- в) развитием изменений в органах и системах, не имевших непосредственного контакта с лекарством
- г) влиянием на факторы непосредственно вызывающие заболевание
- д) повышением активности защитных реакций организма

146. Какая из перечисленных разновидностей не относится к физиологическому антагонизму?

- а) прямой антагонизм
- б) односторонний антагонизм
- в) косвенный антагонизм
- г) физический антагонизм
- д) двусторонний антагонизм

147. Химический антагонизм – это:

- а) одновременное влияние лекарственных средств в одном направлении
- б) взаимодействие двух лекарственных средств с образованием неактивных продуктов или с иными свойствами
- в) противоположное действие лекарственных веществ на одни и те же реакции организма
- г) противоположное действие одновременно применяемых лекарств
- д) одно лекарственное средство механически препятствует всасыванию другого

148. Физиологический антагонизм – это:

- а) одновременное влияние лекарственных средств в одном направлении
- б) взаимодействие двух лекарственных средств с образованием неактивных продуктов или с иными свойствами
- в) противоположное действие лекарственных веществ на одни и те же реакции организма
- г) противоположное действие одновременно применяемых лекарств
- д) одно лекарственное средство механически препятствует всасыванию другого

149. Физический антагонизм – это:

- а) одновременное влияние лекарственных средств в одном направлении
- б) взаимодействие двух лекарственных средств с образованием неактивных продуктов или с иными свойствами
- в) противоположное действие лекарственных веществ на одни и те же реакции организма
- г) противоположное действие одновременно применяемых лекарств
- д) одно лекарственное средство механически препятствует всасыванию другого

150. Антагонизм – это:



- а) одновременное влияние лекарственных средств в одном направлении
- б) взаимодействие двух лекарственных средств с образованием неактивных продуктов или с иными свойствами
- в) противоположное действие лекарственных веществ на одни и те же реакции организма
- г) противоположное действие одновременно применяемых лекарств
- д) одно лекарственное средство механически препятствует всасыванию другого

151. Синергизм – это:

- а) одновременное влияние лекарственных средств в одном направлении
- б) взаимодействие двух лекарственных средств с образованием неактивных продуктов или с иными свойствами
- в) противоположное действие лекарственных веществ на одни и те же реакции организма
- г) противоположное действие одновременно применяемых лекарств
- д) одно лекарственное средство механически препятствует всасыванию другого

152. Лекарства, принятые внутрь начинают действовать через:

- а) 10–40 минут
- б) сразу же после введения
- в) 0,3–2 часа
- г) 10–15 минут
- д) 24 часа

153. Лекарства, введённые подкожно начинают действовать через:

- а) 10–40 минут
- б) сразу же после введения
- в) 0,3–2 часа
- г) 10–15 минут
- д) 24 часа

154. Лекарства, введённые в прямую кишку начинают действовать через:

- а) 10–40 минут
- б) сразу же после введения
- в) 0,3–2 часа
- г) 10–15 минут
- д) 24 часа

155. Лекарства, введённые внутримышечно начинают действовать через:

- а) 10–40 минут
- б) сразу же после введения
- в) 0,3–2 часа
- г) 10–15 минут
- д) 24 часа

156. К жидким лекарственным формам не относятся:

- а) растворы
- б) линименты
- в) микстуры
- г) настойки
- д) отвары

157. К мягким лекарственным формам не относятся:

- а) мази
- б) каши
- в) микстуры
- г) пасты
- д) линименты

158. К твёрдым лекарственным формам не относятся:

- а) таблетки
- б) драже
- в) брикеты
- г) пасты
- д) порошки

159. К витаминным препаратам не относятся:

- а) рыбий жир
- б) тетравит



- в) аскорбиновая кислота
- г) аминазин
- д) цианкобаламин

160. К минеральным препаратам не относятся:

- а) кальция хлорид
- б) седимин
- в) неомицина сульфат
- г) К МП-400
- д) седиминум +

161. К антибиотикам не относятся:

- а) бициллин
- б) стрептоцид
- в) гентамицин
- г) фармазин
- д) тетрациклин

162. К дезинфицирующим средствам не относятся:

- а) лизол
- б) едкий натр
- в) неоцидол
- г) формалин
- д) хлорная известь

163. К антигельминтным препаратам не относятся:

- а) селевит
- б) соли пиперазина
- в) нилверм
- г) мебендазол
- д) фазинекс

164. К дератизационным средствам не относятся:

- а) зоокумарин
- б) крысид
- в) фосфид цинка
- г) ратиндан
- д) кокцидин

165. Растения, содержащие алкалоиды и гликозиды сушат при температуре:

- а) 40–50 °С
- б) 10–15 °С
- в) 30–35 °С
- г) 100 °С
- д) 20–28 °С

166. Растения, содержащие эфирные масла сушат при температуре:

- а) 40–50 °С
- б) 10–15 °С
- в) 30–35 °С
- г) 50–60 °С
- д) 20–28 °С

167. Стандартная влажность высушенного лекарственного сырья составляет:

- а) 2–3 %
- б) 5–8 %
- в) 30–35 %
- г) 10–18 %
- д) 40 %

168. К лекарственным средствам списка А относятся:

- а) сильнодействующие
- б) ядовитые
- в) биопрепараты



- г) дезинфицирующие
- д) легко воспламеняющиеся

169. К лекарственным средствам списка Б относятся:

- а) дезинфицирующие
- б) ядовитые
- в) биопрепараты
- г) сильнодействующие
- д) легко воспламеняющиеся

170. Продолжительность хранения травы, листьев и цветков составляет:

- а) 3-5 лет
- б) 2-3 года
- в) 1-2 года
- г) до года
- д) 3 года

171. Продолжительность хранения плодов составляет:

- а) 3-5 лет
- б) 2-3 года
- в) 1-2 года
- г) до года
- д) 1,5 года

172. Продолжительность хранения корней составляет:

- а) 2-5 лет
- б) 2-3 года
- в) 1-2 года
- г) до года
- д) 1,5 года

173. Для настоев и отваров из несильнодействующих растений сырьё заливают водой в соотношении:

- а) 1 : 10
- б) 1 : 30
- в) 1 : 100
- г) 1 : 50
- д) 1 : 400

174. Для настоев и отваров из сильнодействующих растений сырьё заливают водой в соотношении:

- а) 1 : 10
- б) 1 : 30
- в) 1 : 100
- г) 1 : 50
- д) 1 : 400

Хирургия

175. Копыта сельскохозяйственных животных достигают полного развития к:

- а) 1 году
- б) 3 годам
- в) 7 годам
- г) 4-5 годам
- д) 2,5 годам

176. Расстояние между стежками прерывистого (узловатого) шва должно составлять:

- а) 1-2 см
- б) 0,5-1,5 см
- в) строго 0,5 см
- г) 1,5-2,5 см
- д) строго 1 см

177. Расстояние вкола иглы от края раны при наложении прерывистого (узловатого) шва должно составлять:

- а) 1-2 см



- б) строго 1 см
- в) строго 0,5 см
- г) 1,5-2,5 см
- д) 0,5-1,5 см

178. Швы на асептические раны можно накладывать не позднее чем через:

- а) 10 ч
- б) 48 ч
- в) 12-24 ч
- г) 36 ч
- д) 5 ч

179. Артрит – это:

- а) кратковременное расхождение суставных поверхностей костей
- б) стойкое смещение суставных концов костей
- в) воспаление сустава
- г) хроническое заболевание сустава невоспалительного характера с развитием дистрофических процессов
- д) гнойное воспаление основы кожи копыта

180. Артроз – это:

- а) кратковременное расхождение суставных поверхностей костей
- б) стойкое смещение суставных концов костей
- в) воспаление сустава
- г) хроническое заболевание сустава невоспалительного характера с развитием дистрофических процессов
- д) гнойное воспаление основы кожи копыта

181. Пододерматит – это:

- а) кратковременное расхождение суставных поверхностей костей
- б) стойкое смещение суставных концов костей
- в) воспаление сустава
- г) хроническое заболевание сустава невоспалительного характера с развитием дистрофических процессов
- д) воспаление основы кожи копыта

182. На какие органы не накладывают швы из кетгута?

- а) брюшину
- б) кожу
- в) кишечник
- г) матка
- д) желудок

183. Что используют для дезинфекции рук по способу Альфельда?

- а) 96° спирт
- б) 0,5 % раствор новокаина
- в) 5 % спиртовой раствор йода
- г) 0,02 % раствор фурацилина
- д) 5 % раствор формалина

184. Что не входит в подготовку рук хирурга к операции по способу Спасокукоцкого-Кочергина?:

- а) стрижка ногтей
- б) обработка 0,5 % раствором нашатырного спирта
- в) обработка 70° спиртом
- г) удаление волосяного покрова с рук
- д) дезинфекция кончиков пальцев 5 % спиртовым раствором йода

185. Продолжительность времени наложения кровоостанавливающего жгута зимой?

- а) 2 часа
- б) 5 минут
- в) 1 час
- г) 20 минут
- д) 1,5 часа

186. Продолжительность времени наложения кровоостанавливающего жгута летом?

- а) 2 часа
- б) 15 минут
- в) 1 час



- г) 20 минут
- д) 3 часа

187. Для стерилизации металлического и стеклянного инструмента кипячением используют:

- а) водопроводную воду
- б) 2 % раствор лизола
- в) дистиллированную воду
- г) 1-2 % раствор соды
- д) раствор диоксида 1:3000

188. Какой инструмент предназначен для остановки кровотечения?

- а) корнцанг
- б) пинцет Пеана
- в) раневой крючок
- г) щипцы Голенского-Глушко
- д) кюретка

189. Какой инструмент предназначен для остановки кровотечения?

- а) корнцанг
- б) щипцы Голенского-Глушко
- в) раневой крючок
- г) пинцет Кохера
- д) кюретка

190. Какой инструмент предназначен для разъединения тканей?

- а) раневой крючок
- б) острая ложка
- в) скальпель
- г) корнцанг
- д) ранорасширитель

191. Какой инструмент предназначен для фиксации краёв раны при операции?

- а) анатомический пинцет
- б) раневой крючок
- в) желобоватый зонд
- г) щипцы Голенского-Глушко
- д) корнцанг

192. В чём заключается стерилизация фламбированием?

- а) обработка паром под давлением
- б) обработка сухим жаром
- в) обработка обжиганием
- г) обработка текучим паром
- д) обработка путём погружения в спиртовые растворы

193. Когда снимают швы, наложенные на внутренние органы?

- а) через 10 дней
- б) через 1 месяц
- в) не снимают вообще
- г) через 1 неделю
- д) через 1,5 месяца

194. Для чего используют мандрен?

- а) для осуществления внутрикожных инъекций
- б) для чистки просвета игл
- в) для исследования ран
- г) для проталкивания в рану дренажа
- д) на него наматывают нитки при их стерилизации

195. Для стерилизации инструментов холодным способом используют:

- а) 96° спирт
- б) 1 % раствор калия перманганата
- в) 5 % спиртовой раствор йода
- г) тройной раствор Каретникова



д) 0,02 % раствор фурацилина

196. Для чего использую шприцы Жане?

- а) взятия крови
- б) внутритрахеального введения
- в) внутривенного введения
- г) взятия содержимого рубца
- д) внутрикожного введения

197. Дренаж используется для:

- а) остановки кровотечения
- б) удаления из ран экссудата
- в) наложения компрессов
- г) обрезки копыт
- д) туалета асептических ран

198. К перевязочному материалу не относится:

- а) марля
- б) вата
- в) кетгут
- г) бинт
- д) компрессионная бумага

199. Прокол рубца при тимпании у взрослого крупного рогатого скота осуществляют:

- а) трепаном
- б) троакаром
- в) остроконечным скальпелем
- г) иглой Боброва
- д) кюреткой

200. Прокол рубца при тимпании у телят осуществляют:

- а) трепаном
- б) троакаром
- в) остроконечным скальпелем
- г) иглой Боброва
- д) кюреткой

201. Для наложения швов на внутренние органы используют:

- а) шёлковые нити
- б) кетгут
- в) хлопчатобумажные нити
- г) синтетические нити
- д) льняные нити

202. Место прокола рубца при тимпании находится:

- а) в области правой голодной ямки на середине линии от наружного угла маклока к середине последнего ребра
- б) слева на линии лопатко-плечевого сустава у 13-го ребра
- в) справа на линии лопатко-плечевого сустава между 11 и 12 ребром
- г) в области левой голодной ямки на середине линии от наружного угла маклока к середине последнего ребра
- д) сразу за 13-ым ребром слева по линии маклока

203. Копыта у лошадей расчищают не реже:

- а) 1 раза в 6 месяцев
- б) 1 раза в 1,5-2 месяца
- в) 1 раза в год
- г) 1 раза в 4 месяца
- д) 1 раза в 1,5-2 года

204. Копыта у крупного рогатого скота при стойловом содержании расчищают не реже:

- а) 2 раз в год
- б) 3 раз в год
- в) 1 раза в год
- г) 1 раза в 2 года
- д) 1 раза в 1,5 года



205. Воспаление поверхностных слоёв кожи, сопровождающееся разнообразными сыпями называется:

- а) экзема
- б) фурункул
- в) дерматит
- г) флегмона
- д) карбункул

206. Воспаление глубоких и поверхностных слоёв кожи без образования сыпей называется:

- а) экзема
- б) фурункул
- в) дерматит
- г) флегмона
- д) карбункул

207. Острое гнойное воспаление волосяного мешочка, сальной железы и окружающей соединительной ткани называется:

- а) экзема
- б) фурункул
- в) дерматит
- г) флегмона
- д) карбункул

208. Острое гнойное воспаление нескольких соседних волосяных мешочков, сальных желез, окружающей их соединительной ткани и подкожной клетчатки называется:

- а) экзема
- б) фурункул
- в) дерматит
- г) флегмона
- д) карбункул

209. Разлитое острогнойное, реже гнилостное воспаление подкожной клетчатки с преобладанием некротических явлений над нагноительными называется:

- а) экзема
- б) фурункул
- в) дерматит
- г) флегмона
- д) карбункул

Внутренние незаразные болезни животных и терапия

210. Воспаление сердечной сорочки называется:

- а) порок сердца
- б) миокардоз
- в) эндокардит
- г) перикардит
- д) миокардит

211. Воспаление сердечной мышцы называется:

- а) пороки сердца
- б) миокардоз
- в) эндокардит
- г) перикардит
- д) миокардит

212. Заболевание миокарда, сопровождающееся его дистрофическими изменениями, называется:

- а) пороки сердца
- б) миокардоз
- в) эндокардит
- г) перикардит
- д) миокардит

213. Воспаление внутренней оболочки и клапанов сердца называется:

- а) пороки сердца
- б) миокардоз



- в) эндокардит
- г) перикардит
- д) миокардит

214. *Нарушение деятельности сердца, вызванное поражением его отверстий и клапанов называется:*

- а) пороки сердца
- б) миокардоз
- в) эндокардит
- г) перикардит
- д) миокардит

215. *Воспаление слизистой оболочки гортани называется:*

- а) ринит
- б) фарингит
- в) бронхит
- г) ларингит
- д) плеврит

216. *Воспаление слизистой оболочки мелких бронхов и отдельных долек лёгких называется:*

- а) ларингит
- б) бронхопневмония
- в) макробронхит
- г) пневмоторакс
- д) микробронхит

217. *Патологическое увеличение объёма лёгких при чрезмерном скоплении в них воздуха называется:*

- а) бронхопневмония
- б) плеврит
- в) макробронхит
- г) пневмоторакс
- д) эмфизема

218. *Пневмоторакс это:*

- а) воспаление плевры
- б) водянка грудной полости
- в) проникновение скопление воздуха в грудной клетке
- г) инородное тело в лёгких
- д) скопление воздуха в междольковой соединительной ткани лёгких

219. *Полное подавление двигательной функции преджелудков называется:*

- а) гипотония
- б) тимпания
- в) атония
- г) травматический ретикулит
- д) абомазит

220. *Частичное подавление двигательной функции преджелудков называется:*

- а) гипотония
- б) тимпания
- в) атония
- г) травматический ретикулит
- д) абомазит

221. *Чрезмерное скопление в полости рубца газов называется:*

- а) гипотония
- б) тимпания
- в) атония
- г) травматический ретикулит
- д) абомазит

222. *Воспаление стенки сетки при её травмировании инородными телами, попавшими с кормом, называется:*

- а) гипотония
- б) травматический перикардит
- в) атония
- г) травматический ретикулит



д) абомазит

223. Тимпания чаще всего встречается у:

- а) лошадей
- б) крупного рогатого скота
- в) поросят
- г) новорожденных телят
- д) взрослых свиней

224. Дистонии преджелудков возникают у:

- а) лошадей
- б) крупного рогатого скота
- в) поросят
- г) новорожденных телят
- д) взрослых свиней

225. Закупорка пищевода может возникать:

- а) только у крупного рогатого скота
- б) только у свиней
- в) только у жвачных
- г) у лошадей и крупного рогатого скота
- д) у всех сельскохозяйственных животных

226. Прокол рубца троакарном производят при:

- а) гипотонии
- б) тимпании
- в) атонии
- г) травматический ретикулите
- д) абомазите

227. Какое заболевание не относится к болезням органов дыхательной системы?

- а) ринит
- б) плеврит
- в) фарингит
- г) бронхит
- д) эмфизема

228. Какое заболевание относится к болезням лёгких?

- а) плеврит
- б) пневмония
- в) ларингит
- г) ринит
- д) фарингит

229. Какое заболевание относится к болезням лёгких?

- а) эмфизема
- б) ларингит
- в) ангина
- г) ринит
- д) плеврит

230. Какое заболевание не относится к болезням органов пищеварительной системы?:

- а) фарингит
- б) кератит
- в) тимпания
- г) абомазит
- д) гепатит

231. Какое заболевание не относится к болезням органов пищеварительной системы?:

- а) кутикулит
- б) стоматит
- в) энтерит
- г) эндемический зоб
- д) абомазит



232. Воспаление слизистой оболочки желудка называется:

- а) энтерит
- б) гастрит
- в) абомазит
- г) ретикулит
- д) гастроэнтерит

233. Воспаление тканей кишечной стенки называется:

- а) энтерит
- б) гастрит
- в) абомазит
- г) ретикулит
- д) гастроэнтерит

234. Воспаление слизистой оболочки и стенки желудка и кишечника называется:

- а) энтерит
- б) гастрит
- в) абомазит
- г) ретикулит
- д) гастроэнтерит

235. Воспаление слизистой оболочки сычуга называется:

- а) энтерит
- б) гастрит
- в) абомазит
- г) ретикулит
- д) гастроэнтерит

236. Абомазит возникает:

- а) только у телят
- б) у поросят
- в) у жеребят
- г) у телят и ягнят
- д) у телят и поросят

237. Глубокое нарушение всех видов обмена веществ, недостаток в крови сахара и гликогена в печени, избыточное скопление кетонных тел и выделение ацетона с выдыхаемым воздухом, молоком и мочой возникают при:

- а) ацидозе рубца
- б) кетозе
- в) пастбищной тетании
- г) остеодистрофии
- д) беломышечной болезни

238. Накопление молочной кислоты в рубце, снижение рН рубцового содержимого, нарушение пищеварения и ацидотиче состояние организма возникают при:

- а) пастбищной тетании
- б) беломышечной болезни
- в) ацидозе рубца
- г) остеодистрофии
- д) кетозе

239. Диспепсией болеют телята:

- а) от 2 недель до 1,5 месяцев
- б) от 1,5 в до 3 месяцев
- в) первые 6 месяцев жизни
- г) первые 7–10 дней жизни
- д) от рождения до года

240. Это заболевание характерно для взрослых животных:

- а) рахит
- б) железодефицитная анемия
- в) диспепсия
- г) остеодистрофия



д) беломышечная болезнь

241. Продолжительность голодной диеты для телят при лечении диспепсии составляет:

- а) 2-3 часа
- б) 8-12 часов
- в) 4-6 часов
- г) 24 часа
- д) 36 часов

242. На время голодной диеты при лечении диспепсии:

- а) полностью исключают кормление больных животных
- б) выпаивают больным животным только кипячёную воду
- в) больных животных поят молозивом, но в минимальной дозе и предварительно разбавляя его кипячёной водой
- г) выпаивают настои или отвары лекарственных трав, слизистые отвары, 0,5-1 % раствор натрия хлорида
- д) больным животным выпаивают заменители молозива

243. Укажите основные формы клинического течения диспепсии?

- а) сверхострая и острая
- б) острая, подострая и хроническая
- в) простая и токсическая
- г) острая и хроническая
- д) острая и токсическая

244. Эндемический зоб возникает при:

- а) недостатке в организме селена
- б) недостатке в организме меди
- в) недостатке в организме цинка
- г) недостатке в организме йода
- д) недостатке в организме фосфора

245. Основным симптомом эндемического зоба у молодняка?

- а) воспалением и отёком тканей глотки
- б) увеличением в объёме щитовидной железы
- в) закупоркой глотки инородным телом
- г) только у птицы, вследствие закупорки зоба кормом
- д) уменьшением в объёме и атрофией щитовидной железы

246. Беломышечная болезнь возникает при:

- а) недостатке в организме селена
- б) недостатке в организме меди
- в) недостатке в организме цинка
- г) недостатке в организме йода
- д) недостатке в организме фосфора

247. Беломышечная болезнь может встречаться:

- а) первые 10 дней жизни
- б) первый месяц жизни
- в) от 2 недель до 1,5 месяцев
- г) в течение первого года жизни
- д) с первых дней жизни до 3 месяцев

248. При беломышечной болезни поражается:

- а) только гладкая мускулатура
- б) только миокард
- в) только скелетная мускулатура
- г) миокард и скелетная мускулатура
- д) скелетная и гладкая мускулатура

249. Железодефицитная анемия встречается у:

- а) телят
- б) поросят
- в) жеребят
- г) цыплят
- д) лактирующих коров



250. Железодефицитная анемия у поросят протекает:

- а) первые 5 дней жизни
- б) первые 10 дней жизни
- в) в 5-30 дневном возрасте
- г) с первых дней жизни до 3 месяцев
- д) первые 6 месяцев жизни

251. Основная причина рахита:

- а) недостаток в организме витамина А
- б) недостаток в организме витамина Е
- в) недостаток в организме витамина F
- г) недостаток в организме витамина С
- д) недостаток в организме витамина Д

252. Рахит характеризуется:

- а) увеличением в объёме щитовидной железы и нарушением её функции
- б) нарушением обмена веществ и развитием дистрофических изменений в миокарде и скелетной мускулатуре
- в) развитием анемии, задержкой роста, нарушением обмена веществ и снижением резистентности
- г) нарушением фосфорно-кальциевого обмена и процесса костеобразования
- д) выраженным токсикозом, жировой дистрофией печени и некрозом её клеток

253. Матовость шерсти и копытного рога, шелушение и потеря эластичности кожи, выпадение шерсти, отставание в росте и развитии, конъюнктивиты, помутнение и язвы роговицы, снижение зрения в сумерках характерны для:

- а) гиповитаминозов группы В
- б) гиповитаминоза А
- в) гиповитаминоза Е
- г) гиповитаминоза Д
- д) гиповитаминоза С

254. Слабый тонус мышц, снижение двигательной активности, судороги, хромота, скованность движений, парезы и параличи конечностей, ослабление работы сердца, отеки, нарушение репродукции характерны для:

- а) гиповитаминозов группы В
- б) гиповитаминоза А
- в) гиповитаминоза Е
- г) гиповитаминоза Д
- д) гиповитаминоза С

255. Что является поражающим фактором при отравлении кормовой свеклой?

- а) гликозид госсипол
- б) алкалоид соланин
- в) нитриты
- г) синильная кислота
- д) цикутотоксин

256. Что является поражающим фактором при отравлении картофелем?

- а) гликозид госсипол
- б) алкалоид соланин
- в) нитриты
- г) синильная кислота
- д) цикутотоксин

257. Что является поражающим фактором при отравлении вехом ядовитым?

- а) гликозид госсипол
- б) алкалоид соланин
- в) нитриты
- г) синильная кислота
- д) цикутотоксин

258. Что является поражающим фактором при отравлении хлопчатниковым жмыхом и шротом?

- а) гликозид госсипол
- б) алкалоид соланин
- в) нитриты
- г) синильная кислота



д) цикутотоксин

259. Смертельная доза поваренной соли для крупного рогатого скота составляет (в г/кг массы):

- а) 1,5-2
- б) 2-3
- в) 8-10
- г) 0,5
- д) 3-6

260. Смертельная доза поваренной соли для лошадей составляет (в г/кг массы):

- а) 1,5-2
- б) 2-3
- в) 8-10
- г) 0,5
- д) 3-6

261. Смертельная доза поваренной соли для свиней составляет (в г/кг массы):

- а) 1,5-2
- б) 3-5
- в) 0,5-1
- г) 0,1-0,3
- д) 4-8

262. Повышение возбудимости, пульса и дыхания, судороги, анемия, расстройство пищеварения, бронхопневмонии, мышечная слабость, дерматиты, понижение резистентности характерны для:

- а) гиповитаминозов группы В
- б) гиповитаминоза А
- в) гиповитаминоза Е
- г) гиповитаминоза Д
- д) гиповитаминоза С

263. Снижение аппетита, вялость, припухание суставов, ороговение кожи, кровоточивость, набухание, изъязвление дёсен и языка, гнилостный запах изо рта, выпадение зубов, конъюнктивит характерны для:

- а) гиповитаминозов группы В
- б) гиповитаминоза А
- в) гиповитаминоза Е
- г) гиповитаминоза Д
- д) гиповитаминоза С

264. Воспаление брюшины – это:

- а) плеврит
- б) гепатит
- в) перитонит
- г) асцит
- д) абомазит

265. Воспаление слизистой оболочки носа – это:

- а) ларингит
- б) фарингит
- в) ринит
- г) кератит
- д) стоматит

266. Воспаление слизистой оболочки глотки – это:

- а) ларингит
- б) фарингит
- в) ринит
- г) кератит
- д) стоматит

267. Воспаление слизистой оболочки полости рта – это:

- а) ларингит
- б) фарингит
- в) ринит
- г) кератит



д) стоматит

268. Причина интерстициальной эмфиземы лёгких?

- а) чрезмерное расширение альвеол
- б) сужение просвета бронхов
- в) разрыв стенок альвеол и бронхов
- г) чрезмерное расширение просвета бронхов
- д) сужение альвеол

269. Цистит – это:

- а) воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря
- б) воспаление сердечной мышцы
- в) воспаление слизистой оболочки мочеиспускательного канала
- г) острое воспаление почек
- д) воспаление мочеточников

270. Миокардит – это:

- а) дистрофические изменения миокарда и нервно-проводящей системы сердца
- б) ишемический некроз миокарда
- в) воспаление внутренней оболочки сердца
- г) воспаление сердечной мышцы
- д) воспаление наружной оболочки сердца

271. Эндокардит – это:

- а) дистрофические изменения миокарда и нервно-проводящей системы сердца
- б) ишемический некроз миокарда
- в) воспаление внутренней оболочки сердца
- г) воспаление сердечной мышцы
- д) воспаление наружной оболочки сердца

272. Перикардит – это:

- а) дистрофические изменения миокарда и нервно-проводящей системы сердца
- б) ишемический некроз миокарда
- в) воспаление внутренней оболочки сердца
- г) воспаление сердечной мышцы
- д) воспаление сердечной сорочки

273. При сахарном диабете в моче увеличивается количество:

- а) общего белка
- б) глюкозы
- в) каротина
- г) билирубина
- д) инсулина

274. Воспаление роговицы – это:

- а) кератит
- б) конъюнктивит
- в) омфолит
- г) панофтальмия
- д) катаракта

275. Кератит – это:

- а) воспаление конъюнктивы
- б) воспаление слёзной железы
- в) воспаление век
- г) воспаление роговицы
- д) помутнение хрусталика

276. Кутикулит – это:

- а) язвенно-некротический распад кутикулы мышечного желудка
- б) воспаление клоаки
- в) смещение суставов, сухожилий, искривление костей ног
- г) полное или частичное отсутствие оперения на отдельных участках кожи
- д) болезнь птиц, проявляющаяся расклёвом различных участков тела



277. Клоацит – это:

- а) воспаление брюшины, плевры и серозных покровов внутренностей
- б) воспаление слизистой оболочки клоаки
- в) смещение суставов, сухожилий, искривление костей ног
- г) полное или частичное отсутствие оперения на отдельных участках кожи
- д) болезнь птиц, проявляющаяся расклёвом различных участков тела

278. Воспаление брюшины, плевры и серозных покровов внутренностей вследствие попадания в брюшную полость желточной массы разорвавшихся фолликулов яичника называется:

- а) кутикулит
- б) клоацит
- в) желточный перитонит
- г) расклёв
- д) перроз

279. Объём вводимой при микроклизме жидкости не должен превышать:

- а) 50 мл
- б) 100 мл
- в) 150 мл
- г) 200 мл
- д) 80 мл

280. Крупному рогатому скоту жидкие лекарственные формы внутрь можно задавать с помощью:

- а) шпателя
- б) резиновой или полиэтиленовой бутылки
- в) болюсодавателя
- г) спринцовки
- д) инъекционного шприца

281. Подкожные инъекции крупному рогатому скоту и лошадям осуществляют:

- а) за ушной раковиной
- б) на боковой поверхности шеи
- в) в подхвостовую складку
- г) на внутренней поверхности бедра
- д) на боковой поверхности грудной клетки

282. Подкожные инъекции свиньям осуществляют:

- а) за ушной раковиной
- б) на боковой поверхности шеи
- в) в подхвостовую складку
- г) на внутренней поверхности бедра
- д) на боковой поверхности грудной клетки

283. Подкожные инъекции овцам осуществляют:

- а) за ушной раковиной
- б) на боковой поверхности шеи
- в) в подхвостовую складку
- г) в область холки
- д) на боковой поверхности грудной клетки

284. Внутримышечные инъекции крупному рогатому скоту и лошадям осуществляют:

- а) за ушной раковиной
- б) в подгрудок
- в) в подхвостовую складку
- г) во внутреннюю поверхность бедра
- д) в ягодичные мышцы

285. Внутримышечные инъекции свиньям осуществляют:

- а) на боковой поверхности шеи
- б) за ушной раковиной
- в) в подхвостовую складку
- г) на боковой поверхности грудной клетки
- д) в ягодичные мышцы

286. Внутримышечные инъекции мелкому рогатому скоту осуществляют:



- а) за ушной раковиной
- б) в подгрудок
- в) в подхвостовую складку
- г) во внутреннюю поверхность бедра
- д) в ягодичные мышцы

287. Охлаждающие процедуры назначают при:

- а) септических воспалительных процессах
- б) острых асептических воспалительных процессах
- в) хронических асептических воспалительных процессах
- г) воспалении верхних дыхательных путей
- д) открытых переломах

288. Длительность охлаждающих водолечебных процедур не должна превышать:

- а) 1 час
- б) 2 часа
- в) 3 часа
- г) 1,5 часа
- д) 2,5 часа

289. Тепловые водолечебные процедуры назначают при:

- а) септических воспалительных процессах (абсцессы, флегмоны) в стадии нагноения
- б) острых асептических воспалительных процессах
- в) ранах и язвах
- г) переломах
- д) подострых и хронических асептических воспалительных процессах

290. Для водного согревающего компресса используют воду температуры:

- а) 15-17 °C
- б) 12-15 °C
- в) 25-28 °C
- г) 30-40 °C
- д) 40-50 °C

291. Для спиртового согревающего компресса используют спирт:

- а) 10-20 °
- б) 20-30 °
- в) 40-50 °
- г) 70-80 °
- д) 96 °

292. Согревающий компресс состоит 4 слоя, укладываемых в следующей последовательности:

- а) увлажнённый, фиксирующий, утепляющий, вентилирующий
- б) увлажнённый, непроницаемый, фиксирующий, утепляющий
- в) непроницаемый, увлажнённый, фиксирующий, утепляющий
- г) увлажнённый, непроницаемый, утепляющий, фиксирующий
- д) увлажнённый, непроницаемый, вентилирующий, фиксирующий

293. Водные согревающие компрессы накладываются на:

- а) 2-3 часа
- б) 1-2 часа
- в) 4-6 часов
- г) 0,5-1 час
- д) 10-12 часов

294. Спиртовые согревающие компрессы накладываются на:

- а) 4-6 часов
- б) 0,5-1 час
- в) 1-2 часа
- г) 24 часа
- д) 10-12 часов

295. Лекарственные согревающие компрессы накладываются на:

- а) 10-12 часов
- б) 24 часа



- в) 1-2 часа
- г) 0,5-1 час
- д) 4-6 часов

296. К источникам инфракрасного излучения относят:

- а) лампа ДРТ
- б) лампа-соллюкс
- в) лампа БУВ
- г) лампа ЭУВ
- д) лампа АРК

297. К источникам инфракрасного излучения относят:

- а) лампа ДРТ
- б) лампа ЭУВ
- в) лампа АРК
- г) инфраруж
- д) лампа БУВ

298. Массаж запрещён при:

- а) подострых и хронических асептических воспалительных процессах
- б) тимпании рубца
- в) септических процессах
- г) залёживании
- д) атонии преджелудков

299. Массаж проводят при:

- а) открытых повреждениях кожи
- б) септических процессах
- в) переломах
- г) кровоизлияниях
- д) подострых и хронических асептических воспалительных процессах

Эпизоотология

300. Эпизоотология это наука, изучающая:

- а) наука о причинах и условиях возникновения болезней
- б) наука об особенностях поведения животных
- в) наука о инфекционных болезнях животных, птиц, рыб и пчёл
- г) раздел паразитологии, изучающий насекомых и вызываемые ими болезни
- д) порядок организации и проведения профилактических мероприятий

301. Что такое зооантропонозы?

- а) инфекционные болезни, поражающие только животных
- б) инфекционные болезни, поражающие только человека
- в) инфекционные болезни, поражающие человека и животных
- г) инфекционные болезни, поражающие только диких животных
- д) инфекционные болезни, встречающиеся только у экзотических животных

302. Что такое антропозоонозы?

- а) инфекционные болезни, поражающие только животных
- б) инфекционные болезни, поражающие только человека
- в) инфекционные болезни, поражающие человека и животных
- г) инфекционные болезни, поражающие только диких животных
- д) инфекционные болезни, встречающиеся только у экзотических животных

303. Что такое зоонозы?

- а) инфекционные болезни, поражающие только животных
- б) инфекционные болезни, поражающие только человека
- в) инфекционные болезни, поражающие человека и животных
- г) инфекционные болезни, поражающие только диких животных
- д) инфекционные болезни, встречающиеся только у экзотических животных

304. Что такое инфекция?

- а) клинически выраженная инфекция



- б) наличие возбудителя в организме здорового животного не сопровождающееся развитием инфекционной болезни
- в) взаимодействие организма и возбудителя инфекции в определенных условиях внешней среды
- г) естественная среда обитания возбудителя инфекции, где он сохраняется, размножается и накапливается
- д) процесс перемещения возбудителя от источника к здоровому животному

305. Что такое инфекционная болезнь?

- а) клинически выраженная инфекция
- б) наличие возбудителя в организме здорового животного не сопровождающееся развитием инфекционной болезни
- в) взаимодействие организма и возбудителя инфекции в определенных условиях внешней среды
- г) естественная среда обитания возбудителя инфекции, где он сохраняется, размножается и накапливается
- д) процесс перемещения возбудителя от источника к здоровому животному

306. Что такое микробоносительство?

- а) клинически выраженная инфекция
- б) наличие возбудителя в организме здорового животного не сопровождающееся развитием инфекционной болезни
- в) взаимодействие организма и возбудителя инфекции в определенных условиях внешней среды
- г) естественная среда обитания возбудителя инфекции, где он сохраняется, размножается и накапливается
- д) процесс перемещения возбудителя от источника к здоровому животному

307. Что такое источник возбудителя инфекции?

- а) клинически выраженная инфекция
- б) наличие возбудителя в организме здорового животного не сопровождающееся развитием инфекционной болезни
- в) взаимодействие организма и возбудителя инфекции в определенных условиях внешней среды
- г) естественная среда обитания возбудителя инфекции, где он сохраняется, размножается и накапливается
- д) процесс перемещения возбудителя от источника к здоровому животному

308. Что такое механизм передачи возбудителя инфекции?

- а) клинически выраженная инфекция
- б) наличие возбудителя в организме здорового животного не сопровождающееся развитием инфекционной болезни
- в) взаимодействие организма и возбудителя инфекции в определенных условиях внешней среды
- г) естественная среда обитания возбудителя инфекции, где он сохраняется, размножается и накапливается
- д) процесс перемещения возбудителя от источника к здоровому животному

309. Что не относится к путям (способам) передачи возбудителя инфекции?

- а) алиментарный путь
- б) латентный путь
- в) аэрогенный путь
- г) контактный путь
- д) внутриутробный путь

310. Укажите болезнь, вызывающую интоксикацию, появление отеков, карбункулов, поражение кишечника и легких?

- а) туберкулез
- б) ящур
- в) сибирская язва
- г) некробактериоз
- д) лейкоз крупного рогатого скота

311. Укажите болезнь, проявляющуюся лихорадкой, афтозным поражением слизистой рта, кожи вымени и межкопытной щели?

- а) туберкулез
- б) ящур
- в) сибирская язва
- г) некробактериоз
- д) лейкоз крупного рогатого скота

312. Укажите хроническую болезнь, при которой во многих органах и тканях образуются туберкулы?

- а) туберкулез
- б) ящур



- в) сибирская язва
- г) некробактериоз
- д) лейкоз крупного рогатого скота

313. Укажите болезнь, характеризующуюся лихорадкой и поражением органов дыхания?

- а) инфекционный ринотрахеит
- б) парагрипп-3
- в) пастереллёз
- г) хламидиоз
- д) туберкулез

314. Какая болезнь не относится к группе общих для всех или нескольких видов животных?

- а) сибирская язва
- б) туберкулез
- в) ящур
- г) некробактериоз
- д) инфекционный ринотрахеит

315. Укажите болезнь, проявляющаяся возбуждением и развитием параличей?

- а) африканская чума свиней
- б) бешенство
- в) лептоспироз
- г) классическая чума свиней
- д) сибирская язва

316. Укажите болезнь, проявляющуюся лихорадкой, септициемией и воспалительной эритемой кожи?

- а) африканская чума свиней
- б) рожа свиней
- в) болезнь Тешена
- г) классическая чума свиней
- д) грипп свиней

317. Укажите болезнь, проявляющуюся септициемией и геморрагическим воспалением органов и тканей?

- а) африканская чума свиней
- б) бешенство
- в) пастереллёз
- г) классическая чума свиней
- д) болезнь Тешена

318. Укажите контагиозную болезнь, характеризующуюся лихорадкой, септициемией, поражением пищеварительного тракта и легких?

- а) африканская чума свиней
- б) бешенство
- в) лептоспироз
- г) классическая чума свиней
- д) болезнь Ауески

319. Укажите высококонтагиозную, природно-очаговую болезнь, характеризующуюся лихорадкой, септициемией, дистрофическим и некротическим поражением внутренних органов?

- а) африканская чума свиней
- б) бешенство
- в) лептоспироз
- г) классическая чума свиней
- д) грипп свиней

320. Поражённые участки дают изумрудно-зелёное свечение при:

- а) трихофитии
- б) аспергиллёзе
- в) роже свиней
- г) микроспории
- д) болезнь Ауески

321. Возбудитель трихофитии относится к:

- а) бактериям
- б) вирусам



- в) грибкам
- г) риккетсиям
- д) хламидиям

322. Вирус бешенства продвигается к головному мозгу:

- а) с кровью
- б) по нервным волокнам
- в) с лимфой
- г) по мозговым оболочкам
- д) по мышечным волокнам

323. Укажите заболевание, не относящееся к вирусной этиологии?

- а) ящур
- б) лейкоз крупного рогатого скота
- в) лептоспироз
- г) бешенство
- д) болезнь Тешена

324. Укажите заболевание, не относящееся к вирусной этиологии?

- а) парагрипп-3
- б) пастереллёз
- в) классическая чума свиней
- г) грипп свиней
- д) инфекционный ринотрахеит

325. Укажите заболевание, не относящееся к вирусной этиологии?

- а) некробактериоз
- б) африканская чума свиней
- в) болезнь Ауески
- г) репродуктивно-респираторный синдром свиней
- д) парвовирусная инфекция свиней

326. Укажите заболевание, не относящееся к бактериальной этиологии?

- а) некробактериоз
- б) туберкулез
- в) сибирская язва
- г) рожа свиней
- д) парвовирусная инфекция свиней

327. Укажите заболевание, не относящееся к бактериальной этиологии?

- а) пастереллёз
- б) трихофития
- в) сибирская язва
- г) лептоспироз
- д) рожа свиней

328. Укажите болезнь, характеризуется гнойно-некротическими поражениями преимущественно дистальных частей задних конечностей (копыта, пальцы), а в отдельных случаях ротовой полости и внутренностей?

- а) туберкулез
- б) ящур
- в) сибирская язва
- г) некробактериоз
- д) лейкоз крупного рогатого скота

329. Укажите, какая из перечисленных болезней поражает именно лошадей?

- а) сибирская язва
- б) бешенство
- в) туберкулез
- г) сап
- д) ящур

330. Укажите, какая из перечисленных болезней поражает именно лошадей?

- а) мыт
- б) парагрипп-3
- в) болезнь Тешена



- г) инфекционный ринотрахеит
- д) ящур

331. Укажите медленно развивающуюся болезнь с поражением центральной нервной системы?

- а) ящур
- б) трихофития
- в) сибирская язва
- г) губкообразная энцефалопатия
- д) туберкулез

332. Укажите болезнь, возбудитель которой – прион, агрегированный в скрепи-ассоциированные фибриллы?

- а) сап
- б) губкообразная энцефалопатия
- в) мыт
- г) болезнь Тешена
- д) трихофития

333. Укажите контагиозную болезнь, характеризующуюся лихорадкой, конъюнктивитом, катарально-некротическим поражением органов дыхания, вагинитами и абортами?

- а) грипп свиней
- б) болезнь Ауески
- в) парегрипп-3
- г) инфекционный ринотрахеит
- д) парвовирусная инфекция свиней

334. При каком заболевании не наблюдаются патологические симптомы со стороны системы размножения?

- а) инфекционный ринотрахеит
- б) репродуктивно-респираторный синдром свиней
- в) трихофития
- г) хламидиоз
- д) парвовирусная инфекция свиней

335. Укажите болезнь, проявляющуюся гнойно-катаральным воспалением слизистой оболочки носоглотки и поражением подчелюстных лимфатических узлов?

- а) сибирская язва
- б) бешенство
- в) губкообразная энцефалопатия
- г) болезнь Ауески
- д) мыт

336. При каком заболевании не наблюдаются симптомы поражения нервной системы?

- а) бешенство
- б) губкообразная энцефалопатия
- в) болезнь Тешена
- г) туберкулез
- д) болезнь Ауески

337. Биопрепараты, полученные из крови животных, гипериммунизированных одним или несколькими антигенами и содержащие специфические антитела против данных антигенов называются:

- а) живые вакцины
- б) сыворотки реконвалесцентов
- в) инаktivированные вакцины
- г) гипериммунные сыворотки
- д) анатоксины

338. Биопрепараты, полученные из культур микроорганизмов, убитых различными физическими или химическими способами называются:

- а) живые вакцины
- б) сыворотки реконвалесцентов
- в) инаktivированные вакцины
- г) химические вакцины
- д) анатоксины

339. Биопрепараты, полученные из комплекса антигенов и отдельных фракций микробных клеток, выделяемых химическими методами, называются:



- а) ассоциированные вакцины
- б) химические вакцины
- в) инактивированные вакцины
- г) моновалентные вакцины
- д) анатоксины

340. Биопрепараты, содержащие вирулентных, авирулентных или слабовирулентных микроорганизмов, не способных к возврату первоначальных свойств называются:

- а) живые вакцины
- б) моновалентные вакцины
- в) инактивированные вакцины
- г) ассоциированные вакцины
- д) анатоксины

341. После введения вакцин иммунитет формируется в течение:

- а) 3–5 дней
- б) 7 дней
- в) 30 дней
- г) 12–14 дней
- д) 5–10 дней

342. Длительность иммунитета после применения вакцин в среднем составляет:

- а) 12 месяцев
- б) 1 месяц
- в) 3 месяца
- г) 1,5 года
- д) 2 года

343. Биопрепарат, полученный из различных микроорганизмов, их отдельных компонентов или продуктов жизнедеятельности и используемый для активной иммунизации животных называется:

- а) туберкулин
- б) маллеин
- в) гипериммунная сыворотка
- г) вакцина
- д) иммуноглобулин

344. Укажите, какой разновидности сывороток не существует?

- а) моновалентные
- б) живые
- в) бивалентные
- г) поливалентные
- д) антиоксидантные

345. Укажите, какой разновидности сывороток не существует?

- а) антибактериальные
- б) противовирусные
- в) инактивированные
- г) смешанные
- д) антиоксидантные

346. В гипериммунной сыворотке содержатся:

- а) вирусы
- б) бактерии
- в) антигены
- г) специфические антитела
- д) антитоксины

347. Один из этапов получения гипериммунных сывороток называется:

- а) гипертрансплантация
- б) гипериммунизация
- в) политрансформация
- г) аккомодация
- д) биоинактивация

348. Гипериммунные сыворотки применяют:



- а) только с лечебной целью
- б) только с профилактической
- в) с диагностической
- г) с профилактической и диагностической
- д) с лечебной и профилактической

349. С лечебной целью гипериммунные сыворотки вводят:

- а) 5 раз подряд через 3 часа
- б) 7 раз через 2 часа
- в) 1–2 раза (повторно через 8–12 часов)
- г) 3 раза с перерывами 12 дней
- д) 2 раза с перерывами 12 дней

350. При повторном применении гипериммунной сыворотки через 12 дней и более нужно учитывать:

- а) возможность временного ухудшения состояния здоровья и появление рвоты
- б) опасность проявления анафилактического шока
- в) повышение температуры на градус и более и её удержание в течение 8–12 часов
- г) никакой опасности не существует, кроме лёгкого угнетения и понижения аппетита
- д) обязательное увеличение дозировки вводимой сыворотки

351. Гипериммунные сыворотки, содержащие антитела против одного возбудителя называются:

- а) бивалентные
- б) ассоциированные
- в) моновалентные
- г) комплексные
- д) поливалентные

352. Гипериммунные сыворотки, содержащие антитела против двух возбудителей называются:

- а) бивалентные
- б) ассоциированные
- в) моновалентные
- г) комплексные
- д) поливалентные

353. Гипериммунные сыворотки, содержащие антитела против трёх и более возбудителей называются:

- а) бивалентные
- б) ассоциированные
- в) моновалентные
- г) комплексные
- д) поливалентные

354. Гипериммунные сыворотки, полученные от животных, гипериммунизированных анатоксинами называются:

- а) антибактериальные
- б) противовирусные
- в) антитоксические
- г) инактивированные
- д) ассоциированные

355. Длительность иммунитета после применения гипериммунных сывороток составляет:

- а) 15–20 дней
- б) 5–10 дней
- в) около недели
- г) 1,5 месяца
- д) 0,5 года

356. Вакцины, содержащие антигены одного возбудителя называются:

- а) бивалентные
- б) ассоциированные
- в) моновалентные
- г) комплексные
- д) поливалентные

357. Вакцины, содержащие антигены различных типов, вариантов, штаммов одного возбудителя называются:



- а) бивалентные
- б) ассоциированные
- в) моновалентные
- г) комплексные
- д) поливалентные

358. *Вакцины, содержащие антигены нескольких различных возбудителей называются:*

- а) бивалентные
- б) ассоциированные
- в) моновалентные
- г) комплексные
- д) поливалентные

359. *Биопрепараты, полученные из обработанных различными физическими или химическими способами токсинов возбудителей, называются:*

- а) сыворотки реконвалесцентов
- б) анатоксины
- в) инаktivированные вакцины
- г) химические вакцины
- д) иммуноглобулины

360. *Укажите правильно сущность применения депонирующих веществ (адъювантов) при производстве вакцин?*

- а) повышают иммуногенную активность вакцин вследствие более длительного воздействия антигенов вакцины на иммунную систему организма
- б) максимально освобождают от балластных компонентов антигены вакцины
- в) обеспечивают вакцине слабые алергизирующие свойства, максимально снижая поствакцинальные осложнения
- г) обеспечивают неограниченные возможности для приготовления ассоциированных вакцин
- д) обеспечивают возможность очень длительного хранения вакцин в минимальных объёмах

361. *Аллергическая диагностика туберкулёза называется:*

- а) диспансеризация
- б) туберкулинизация
- в) пункция
- г) маллеинизация
- д) реакция иммунодиффузии

362. *Туберкулинизация делится на:*

- а) глазную и наружную
- б) внутрикожную и подкожную
- в) подкожную и внутримышечную
- г) внутрикожную и глазную
- д) подкожную и наружную

363. *Внутрикожную туберкулинизацию проводят:*

- а) всем сельскохозяйственным животным и птице
- б) сельскохозяйственной птице и животным, кроме лошадей
- в) сельскохозяйственной птице и животным, кроме свиней
- г) сельскохозяйственной птице и животным, кроме поросят до шести недельного возраста
- д) только сельскохозяйственным животным

364. *Глазную туберкулинизацию проводят:*

- а) всем сельскохозяйственным животным и птице
- б) лошадям и в отдельных случаях крупному рогатому скоту
- в) только свиньям
- г) исключительно только лошадям
- д) только сельскохозяйственной птице

365. *Туберкулинизации подвергают без ограничений:*

- а) здоровых коров через 1,5-2 мес. после родов
- б) молодняк до 6 нед. возраста
- в) больных животных
- г) вакцинированных животных
- д) подозрительных по заболеванию животных



366. Для проведения внутрикожной туберкулинизации используют:

- а) маллеин
- б) альттуберкулин
- в) ППД-туберкулин
- г) иммуноглобулин
- д) анатоксин

367. Для проведения глазной туберкулинизации используют:

- а) маллеин
- б) альттуберкулин
- в) ППД-туберкулин
- г) иммуноглобулин
- д) анатоксин

368. Для проведения внутрикожной туберкулинизации используют:

- а) птице – ППД-туберкулин для птиц, остальным животным, кроме лошадей – ППД-туберкулин для млекопитающих
- б) всем сельскохозяйственным животным (кроме лошадей) и птице ППД-туберкулин для млекопитающих
- в) птице – альттуберкулин, остальным животным, кроме лошадей – ППД-туберкулин для млекопитающих
- г) птице – ППД-туберкулин для птиц, КРС и МРС – ППД-туберкулин для млекопитающих, свиньям – одновременно оба туберкулина
- д) птице и свиньям – ППД-туберкулин для птиц, остальным животным, кроме лошадей – ППД-туберкулин для млекопитающих

369. Туберкулин сельскохозяйственным животным вводят при помощи:

- а) скарификации
- б) одноразового шприца
- в) стеклянного шприца на 1 или 2 мл и специальных игл
- г) шприца-автомата
- д) безыгольного инъектора

370. Доза туберкулина крупному рогатому скоту на введение составляет:

- а) 0,2 мл на гол.
- б) 0,1 мл на гол.
- в) 0,2 мл/кг массы
- г) 2 мл на гол.
- д) 0,1 мл/кг массы

371. Доза туберкулина мелкому рогатому скоту на введение составляет:

- а) 2 мл на гол.
- б) 0,1 мл на гол.
- в) 0,2 мл/кг массы
- г) 0,2 мл на гол.
- д) 0,1 мл/кг массы

372. Доза туберкулина птице на введение составляет:

- а) 2 мл на гол.
- б) 0,1 мл на гол.
- в) 0,1 мл/кг массы
- г) 0,2 мл на гол.
- д) 1 мл на гол.

373. Доза туберкулина свиньям на введение составляет:

- а) 2 мл на гол. птичьего и 1 мл на гол. туберкулина для млекопитающих
- б) 0,1 мл на гол. птичьего и 0,2 мл на гол. туберкулина для млекопитающих
- в) 0,2 мл/кг массы птичьего и 1 мл на гол. туберкулина для млекопитающих
- г) по 0,2 мл на гол. и птичьего туберкулина и для млекопитающих
- д) 1 мл на гол. птичьего и 0,2 мл/кг массы туберкулина для млекопитающих

374. Укажите неверно отмеченные места введения туберкулина?

- а) молодянку и самкам КРС – на границе верхней и средней трети шеи по середине
- б) взрослым быкам и производителям – в области средней трети шеи по середине
- в) свиньям – в кожу наружной поверхности ушной раковины, отступив от ее основания к верхушке на 2 см
- г) поросётам до 4-х мес. возраста – в области поясницы, отступив в стороны от позвоночника на 5–8 см



д) курам – в толщу бородки, индейкам – в подчелюстную сережку, гусям и уткам – в подчелюстную складку

375. Укажите неверно отмеченные места введения туберкулина?

- а) молодняку КРС в подхвостовую складку кожи, а самкам – на границе верхней и средней трети шеи по середине
- б) взрослым быкам и производителям – в подхвостовую складку кожи
- в) свиньям – в кожу наружной поверхности ушной раковины, отступив от ее основания к верхушке на 2 см
- г) поросятам до 4-х мес. возраста – в области поясницы, отступив в стороны от позвоночника на 5–8 см
- д) курам – в толщу бородки, индейкам – в подчелюстную сережку, гусям и уткам – в подчелюстную складку

376. Укажите неверно отмеченные места введения туберкулина?

- а) молодняку и самкам КРС – на границе верхней и средней трети шеи по середине
- б) взрослым быкам и производителям – в подхвостовую складку кожи
- в) свиньям – в кожу наружной поверхности ушной раковины, отступив от ее основания к верхушке на 2 см
- г) поросятам до 4-х мес. – в кожу наружной поверхности уха, ровно посередине
- д) курам – в толщу бородки, индейкам – в подчелюстную сережку, гусям и уткам – в подчелюстную складку

377. Укажите неверно отмеченные места введения туберкулина?

- а) молодняку и самкам КРС – на границе верхней и средней трети шеи по середине
- б) взрослым быкам и производителям – в подхвостовую складку кожи
- в) свиньям – в кожу наружной поверхности ушной раковины, отступив от ее основания к верхушке на 2 см
- г) поросятам до 4-х мес. возраста – в области поясницы, отступив в стороны от позвоночника на 5–8 см
- д) сельскохозяйственной птице – в подчелюстную складку кожи

378. Перед введением туберкулина кожу в месте инъекции обрабатывают этиловым спиртом в концентрации:

- а) 70°
- б) 96°
- в) 30°
- г) 40°.
- д) 50°

379. Укажите необходимую дозу этилового спирта для обработки кожи перед введением туберкулина?

- а) 0,5 г/гол.
- б) 2 г/гол.
- в) 1 г/гол.
- г) 5 г/гол.
- д) 3 г/гол.

380. Учет реакции после проведения внутрикожной туберкулинизации у КРС проводят через:

- а) 30–36 ч
- б) 72+3 ч
- в) 48 ч
- г) 24 +3 ч
- д) 48+3 ч

381. Учет реакции после проведения внутрикожной туберкулинизации у МРС проводят через:

- а) 30–36 ч
- б) 72+3 ч
- в) 48 ч
- г) 24 +3 ч
- д) 48+3 ч

382. Учет реакции после проведения внутрикожной туберкулинизации у птиц проводят через:

- а) 30–36 ч
- б) 72+3 ч
- в) 48 ч
- г) 24 +3 ч
- д) 48+3 ч

383. Учет реакции после проведения внутрикожной туберкулинизации у свиней проводят через:

- а) 30–36 ч
- б) 72+3 ч
- в) 48 ч
- г) 24 +3 ч



д) 48+3 ч

384. *Замер толщины кожной складки в месте введения туберкулина при проведении учета осуществляют:*

- а) у КРС и МРС
- б) только у свиней
- в) только у птиц
- г) только у водоплавающей птицы
- д) только у КРС

385. *Симультанную пробу для уточнения диагностики туберкулёза проводят:*

- а) только птице
- б) только КРС
- в) КРС и МРС
- г) только водоплавающей птице
- д) только свиньям

386. *Если несколько животных дают сомнительную или положительную реакцию при туберкулинизации КРС, то её проводят повторно через:*

- а) 60 дней
- б) 45 дней
- в) 30 дней
- г) 42 дня
- д) 40 дней

387. *Глазная туберкулинизация проводится:*

- а) однократно
- б) двукратно с интервалом в 5–6 дней
- в) двукратно с интервалом в 2 дня
- г) двукратно с интервалом в 36 часов
- д) двукратно с интервалом в 24 часа

388. *Доза альттуберкулина при проведении глазной туберкулинизации составляет:*

- а) 3–5 капель
- б) 1 капля
- в) 10 капель
- г) 1 мл
- д) 0,2 мл

389. *Основным методом диагностики сапа в РБ является:*

- а) подкожная маллеинизация
- б) внутримышечная маллеинизация
- в) внутрикожная маллеинизация
- г) глазная маллеинизация
- д) интраназальная маллеинизация

390. *Исследованию на лейкоз КРС подвергают:*

- а) с 6 мес.
- б) с 2 мес.
- в) с 1 мес.
- г) с 2 нед.
- д) с 1 года и старше

391. *С использованием какого метода проводят исследование молока на лейкоз?*

- а) РИД
- б) РП
- в) ИФА
- г) РГА
- д) НАРВАК

392. *Укажите болезнь свиней, характеризующуюся лихорадкой, конъюнктивитом, воспалением верхних дыхательных путей и легких?*

- а) грипп свиней
- б) болезнь Тешена
- в) парвовирусная инфекция свиней
- г) инфекционный ринотрахеит



д) репродуктивно-респираторный синдром свиней

393. Укажите болезнь, характеризующуюся массовыми абортами у свиноматок в конце супоросности, преждевременными родами, рождением нежизнеспособных поросят, поражением дыхательной системы у поросят?

- а) грипп свиней
- б) болезнь Тешена
- в) парвовирусная инфекция свиней
- г) болезнь Ауески
- д) репродуктивно-респираторный синдром свиней

394. Укажите болезнь, характеризующуюся геморрагическим и некротическим воспалением толстого кишечника, сопровождающимся поносом с примесью крови и слизи?

- а) грипп свиней
- б) дизентерия
- в) парвовирусная инфекция свиней
- г) болезнь Ауески
- д) болезнь Тешена

395. Укажите вирусную болезнь, проявляющуюся парезами и параличами на почве воспаления головного и спинного мозга?

- а) грипп свиней
- б) болезнь Тешена
- в) парвовирусная инфекция свиней
- г) болезнь Ауески
- д) дизентерия

396. Укажите вирусную болезнь, клинически проявляющуюся только у свиноматок и характеризующуюся прохолостами, малоплодием, рождением мумифицированных плодов, мертвых и слабых поросят, реже абортми?

- а) репродуктивно-респираторный синдром свиней
- б) болезнь Тешена
- в) парвовирусная инфекция свиней
- г) болезнь Ауески
- д) дизентерия

397. Укажите хроническую болезнь, сопровождающуюся возникновением на слизистой оболочки носа, коже, в легких и других внутренних органах специфических узелков, склонных к распаду с образованием язв?

- а) трихофития
- б) мыт
- в) лептоспироз
- г) сап
- д) дизентерия

398. Укажите хроническую болезнь, протекающую бессимптомно и проявляющуюся лимфоцитозом и образованием опухолей в кровеносных и других органах и тканях?

- а) трихофития
- б) лейкоз КРС
- в) лептоспироз
- г) сап
- д) дизентерия

399. Укажите остро протекающую болезнь, вызывающую поражение головного и спинного мозга, лихорадку и воспаление легких, а также сильный зуд и расчесы у всех видов животных, кроме свиней и норок?

- а) трихофития
- б) сап
- в) лептоспироз
- г) болезнь Ауески
- д) дизентерия

400. Укажите хроническую болезнь, вызывающую появление на коже ограниченных бесшерстных воспалительных очагов, покрытых желтоватой рыхлой или плотной коркой?

- а) трихофития
- б) сап



- в) лептоспироз
- г) болезнь Ауески
- д) дизентерия

401. Укажите болезнь, проявляющуюся лихорадкой, анемией, желтухой, гемоглобинурией, некрозом слизистых оболочек, кожи, рождением нежизнеспособного потомства?

- а) трихофития
- б) сап
- в) лептоспироз
- г) болезнь Ауески
- д) дизентерия

402. Укажите остро протекающую болезнь молодняка, проявляющуюся профузным поносом, интоксикацией и обезвоживанием организма?

- а) колибактериоз
- б) трихофития
- в) отечная болезнь поросят
- г) сальмонеллез
- д) дизентерия

403. Укажите болезнь молодняка, проявляющуюся лихорадкой, поносом, а в затяжных случаях и поражением легких?

- а) колибактериоз
- б) трихофития
- в) отечная болезнь поросят
- г) сальмонеллез
- д) дизентерия

404. Укажите остро протекающую болезнь, характеризующуюся нарушением координации движений, парезами или параличами и отеками различных тканей и органов?

- а) колибактериоз
- б) трихофития
- в) отечная болезнь поросят
- г) сальмонеллез
- д) дизентерия

405. В каком возрасте возникает колибактериоз у телят?

- а) первые 10 дней жизни
- б) первые 2 недели жизни
- в) с первых дней жизни до 5 месяцев
- г) в 1–3 месячном возрасте
- д) с первых дней жизни до 7 месяцев

406. В каком возрасте возникает колибактериоз у поросят?

- а) первые 10 дней жизни
- б) первые 2 недели жизни, пред- и после отъемный период
- в) с первых дней жизни до 5 месяцев
- г) в 1–3 месячном возрасте
- д) с первых дней жизни до 7 месяцев

407. В каком возрасте возникает сальмонеллез у телят?

- а) с первых дней жизни и до 4-5-месяцев
- б) первая неделя жизни
- в) в 1–3 месячном возрасте
- г) от 10 дней до 2 месяцев
- д) с первых дней жизни до 7 месяцев

408. В каком возрасте возникает сальмонеллез у поросят?

- а) в 1–3 месячном возрасте
- б) первая неделя жизни
- в) с первых дней жизни и до 4-5-месяцев
- г) от 10 дней до 2 месяцев
- д) с первых дней жизни до 7 месяцев



409. Укажите высококонтагиозную вирусную болезнь, проявляющуюся поражением органов дыхания, пищеварения и нервной системы?

- а) болезнь Марека
- б) болезнь Ньюкасла
- в) болезнь Гамборо
- г) пуллороз
- д) грипп птиц

410. Укажите хроническую вирусную болезнь, вызывающую поражение глаз, параличи и парезы конечностей, образование опухолей во внутренних органах, скелетной мускулатуре и коже?

- а) болезнь Марека
- б) болезнь Ньюкасла
- в) болезнь Гамборо
- г) пуллороз
- д) грипп птиц

411. Укажите контагиозную вирусную болезнь молодняка куриных, проявляющуюся поражением фабрициевой сумки, почек и нарушением роста?

- а) болезнь Марека
- б) болезнь Ньюкасла
- в) болезнь Гамборо
- г) пуллороз
- д) грипп птиц

412. Укажите остро протекающую болезнь птиц отряда куриных, проявляющуюся поражением кишечника и паренхиматозных органов?

- а) болезнь Марека
- б) инфекционный бронхит
- в) болезнь Гамборо
- г) пуллороз
- д) грипп птиц

413. Укажите высококонтагиозную острую вирусную болезнь домашних и диких птиц, сопровождающуюся поражением кровеносной системы?

- а) болезнь Марека
- б) болезнь Ньюкасла
- в) болезнь Гамборо
- г) пуллороз
- д) грипп птиц

414. Для какой из перечисленных болезней характерно изменение цвета радужки на металлическо-серый, изменение формы зрачка вплоть до исчезновения, частичная или полная потеря зрения?

- а) болезнь Марека
- б) болезнь Ньюкасла
- в) болезнь Гамборо
- г) пуллороз
- д) грипп птиц

415. Какая из перечисленных болезней вызывается бактерией?

- а) болезнь Марека
- б) болезнь Ньюкасла
- в) болезнь Гамборо
- г) пуллороз
- д) грипп птиц

416. Укажите контагиозную вирусную болезнь, характеризующуюся поражением респираторных органов и почек у цыплят и репродуктивных органов у кур?

- а) инфекционный бронхит
- б) инфекционный ларинготрахеит
- в) болезнь Гамборо
- г) болезнь Ньюкасла
- д) грипп птиц



417. Укажите острую вирусную болезнь, характеризующуюся геморрагическим воспалением глаз, слизистой оболочки верхних дыхательных путей и признаками удушья?
- а) инфекционный бронхит
 - б) инфекционный ларинготрахеит
 - в) болезнь Гамборо
 - г) болезнь Ньюкасла
 - д) грипп птиц
418. Укажите болезнь кур, индеек, уток, гусей, голубей, характеризующуюся поражением органов дыхания и сухожилий, дегенерацией паренхимы печени и хроническим течением?
- а) респираторный микоплазмоз
 - б) болезнь Гамборо
 - в) инфекционный ларинготрахеит
 - г) грипп птиц
 - д) инфекционный бронхит
419. Яма Беккари должна располагаться от жилых и животноводческих построек на расстоянии:
- а) 300 м
 - б) 1-2 км
 - в) 5 км
 - г) 500 м
 - д) не менее 10 км
420. Стирка и дезинфекция спецодежды работников производственных цехов должна проводиться не реже:
- а) 1 раза в неделю
 - б) 1 раза в 1 месяц
 - в) 2 раза в 1 месяц
 - г) 1 раза в 3 дня
 - д) 1 раза в 2 недели
421. Для дезинфекции изделий из х/б, прорезиненных тканей, войлока, брезента, металла и полимерных материалов используют раствор формальдегида в концентрации:
- а) 3 %
 - б) 2 %
 - в) 5 %
 - г) 0,5 %
 - д) 1 %
422. Для дезинфекции изделий из х/б, прорезиненных тканей, войлока, брезента, металла и полимерных материалов в 2 % растворе формальдегида время экспозиции составляет:
- а) 10 ч
 - б) 30 мин.
 - в) 1 ч
 - г) 24 ч
 - д) 2-5 ч
423. Общая длина дезбарьера для транспорта должна составлять не менее:
- а) 12 м
 - б) 8 м
 - в) 10 м
 - г) 5 м
 - д) 15 м
424. Укажите необходимую концентрацию раствора едкого натра для заправки дезбарьера для транспорта?
- а) 10 %
 - б) 5 %
 - в) 3 %
 - г) 15 %
 - д) 1 %
425. Укажите необходимую концентрацию раствора едкого натра для заправки дезковриков при входе в производственные помещения?
- а) 5 %
 - б) 2 %



- в) 4 %
- г) 0,5 %
- д) 1 %

426. Укажите необходимую концентрацию активного хлора растворов хлорсодержащих препаратов для заправки дезовки при входе в производственные помещения:

- а) 1 %
- б) 4 %
- в) 0,5 %
- г) 5 %
- д) 2 %

427. Профилактическую дезинфекцию считают удовлетворительной, если в исследованных пробах нет роста микробов:

- а) во всех пробах
- б) в 90 % проб
- в) в 80 % проб
- г) в 95 % проб
- д) в 85 % проб

428. Текущую дезинфекцию считают удовлетворительной, если в исследованных пробах нет роста микробов:

- а) не менее чем в 75 % проб
- б) не менее чем в 80 % проб
- в) не менее чем в 90 % проб
- г) не менее чем в 60 % проб
- д) во всех пробах

429. Заключительную дезинфекцию считают удовлетворительной, если в исследованных пробах нет роста микробов:

- а) в 85 % проб
- б) в 90 % проб
- в) в 80 % проб
- г) во всех пробах
- д) в 95 % проб

430. Аэрозольную дезинфекцию можно проводить в присутствии животных при использовании:

- а) хлорамина Б
- б) формалина
- в) хлорной извести
- г) натрия гидроокиси
- д) формальдегида

431. Аэрозольную дезинфекцию нельзя проводить в присутствии животных при использовании:

- а) алкамона
- б) молочной кислоты
- в) триэтиленгликоля
- г) натрия гидроокиси
- д) резорцина

432. Безаппаратный способ аэрозольной дезинфекции максимально эффективен в помещениях объёмом:

- а) 500-1000 м³
- б) 1500-2000 м³
- в) 2500-3000 м³
- г) 3500 м³
- д) 5000 м³

433. Норма расхода дезраствора при проведении профилактической дезинфекции на м² составляет:

- а) 2 л
- б) 0,5 л
- в) 1 л
- г) 1,5 л
- д) 2,5 л

434. Норма расхода дезраствора при проведении вынужденной дезинфекции на м² составляет:

- а) 2 л



- б) 0,5 л
- в) 1 л
- г) 1,5 л
- д) 2,5 л

435. Профилактическую дезинфекцию проводят:

- а) после сдачи фермы или отдельного объекта в эксплуатацию
- б) при возникновении в хозяйстве инфекционной болезни
- в) с момента возникновения инфекционной болезни и до её ликвидации
- г) после ликвидации инфекционной болезни перед снятием с хозяйства ограничений или карантина
- д) только в помещении с больными животными

436. Собственно дезинфекция делится на:

- а) механическую очистку и влажную дезинфекцию
- б) дератизацию и дезакаризацию
- в) механическую очистку и аэрозольную дезинфекцию
- г) утилизацию и уничтожение трупов
- д) влажную и аэрозольную дезинфекцию

437. Контроль качества проведённой дезинфекции производится:

- а) только визуально
- б) только химически
- в) визуально, химически и биологически
- г) только биологически
- д) механически и биологически

438. Для утилизации трупов используют:

- а) сжигание
- б) скотомогильники
- в) утильзаводы
- г) биотермические ямы
- д) леофильное высушивание

439. В ямах Беккари (биотермических) трупы полностью разлагаются в течение:

- а) 1 месяца
- б) 5 месяцев
- в) 10 месяцев
- г) 1 года
- д) 2 лет

440. В утильустановках трупы варят в открытых котлах при непрерывном кипении в течение:

- а) 3 ч
- б) 7 ч
- в) 5 ч
- г) 10 ч
- д) 4 ч

441. Дератизация – это:

- а) комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов
- б) комплекс мер, направленных на уничтожение клещей
- в) комплекс мер, направленных на уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных болезней
- г) комплекс мер, направленных на уничтожение насекомых
- д) система мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекций

442. Дезинфекция – это:

- а) комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов
- б) комплекс мер, направленных на уничтожение клещей
- в) комплекс мер, направленных на уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных болезней
- г) комплекс мер, направленных на уничтожение насекомых
- д) система мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекций

Паразитология

443. Какая из перечисленных наук изучает паразитов, вызывающих болезни у человека, животных и растений и меры борьбы с ними?

- а) эпизоотология



- б) фармакология
- в) паразитология
- г) протозоология
- д) арахноэнтомология

444. Живые существа, в которых развиваются личиночные стадии паразита, называются:

- а) окончательными
- б) промежуточными хозяевами
- в) резервуарными хозяевами
- г) облигатные хозяева
- д) дефинитивными

445. Живые существа, в которых паразиты не развиваются, но сохраняют при этом способность к заражению, называются:

- а) окончательными
- б) промежуточными хозяевами
- в) резервуарными хозяевами
- г) облигатные хозяева
- д) дефинитивными

446. Хозяева, в которых паразиты достигают половой зрелости, называются:

- а) индивидуальными
- б) промежуточными хозяевами
- в) резервуарными хозяевами
- г) облигатные хозяева
- д) дефинитивными

447. Болезнь (преимущественно жвачных) с нарушением пищеварения, поражением печени, отеками, анемией, желтухой и снижением продуктивности называется:

- а) аскаридоз свиней
- б) диктиокаулёз
- в) телязиоз
- г) фасциолёз
- д) парамфистоматоз

448. Болезнь жвачных, характеризующаяся острым и хроническим течением, поражением рубца, сетки, сычуга, тонкого кишечника называется:

- а) аскаридоз свиней
- б) диктиокаулёз
- в) телязиоз
- г) фасциолёз
- д) парамфистоматоз

449. Какая из перечисленных болезней не относится к цестодозам?

- а) эхинококкоз
- б) ценуроз церебральный
- в) цистицеркоз (финноз) КРС
- г) фасциолёз
- д) мониезиоз

450. Какая из перечисленных болезней не относится к цестодозам?

- а) мониезиоз
- б) ценуроз церебральный
- в) телязиоз
- г) цистицеркоз (финноз) КРС
- д) эхинококкоз

451. Какая из перечисленных болезней не относится к цестодозам?

- а) ценуроз церебральный
- б) оксиуроз лошадей
- в) мониезиоз
- г) эхинококкоз
- д) цистицеркоз (финноз) свиней

452. Какая из перечисленных болезней не относится к цестодозам?



- а) эхинококкоз
- б) ценуроз церебральный
- в) мониезиоз
- г) цистицеркоз (финноз) свиней
- д) эймериоз

453. *Укажите цестодоз многих видов животных, характеризующийся хроническим течением без выраженных клинических признаков и сопровождающийся поражением внутренних органов (главным образом, печени и легких)?*

- а) эхинококкоз
- б) ценуроз церебральный
- в) цистицеркоз (финноз) КРС
- г) цистицеркоз (финноз) свиней
- д) мониезиоз

454. *Укажите болезнь, характеризующуюся аллергическими явлениями, болезненностью мышц, лихорадкой, отёками и нарушением работы ряда органов и систем?*

- а) телязиоз
- б) трихинеллез
- в) оксиуроз
- г) фасциолёз
- д) эймериоз

455. *Укажите нематодозную болезнь лошадей, характеризующуюся поражением толстого кишечника (слепая и ободочная кишка)?*

- а) телязиоз
- б) трихинеллез
- в) оксиуроз
- г) фасциолёз
- д) эймериоз

456. *Укажите нематодозную болезнь преимущественно КРС, характеризующуюся поражением глаз и даже потерей зрения?*

- а) телязиоз
- б) трихинеллез
- в) оксиуроз
- г) фасциолёз
- д) эймериоз

457. *Укажите нематодозную болезнь свиней, характеризующуюся поражением сердца, легких, печени, лимфоузлов и тонкого кишечника. Чаще болеют поросята- сосуны и поросята 2-6-месячного возраста?*

- а) аскаридоз
- б) трихинеллез
- в) оксиуроз
- г) фасциолёз
- д) эймериоз

458. *Укажите цестодоз, характеризующийся поражением скелетных мышц, сердца, языка и других органов. Вызывается личиночной стадией цистицеркус бовис?*

- а) эхинококкоз
- б) ценуроз церебральный
- в) цистицеркоз (финноз) КРС
- г) цистицеркоз (финноз) свиней
- д) мониезиоз

459. *Как называется мероприятие, направленное на уничтожение паразитов животных на всех стадиях их развития?*

- а) дегельминтизация
- б) девастация
- в) дезинфекция
- г) дератизация
- д) дезакаризация



460. Какой из наиболее распространённых методов диагностики, используют при постановке диагноза на гельминтозные болезни животных?

- а) гельминтологическое вскрытие
- б) копрологические методы
- в) аллергические методы
- г) серологические методы
- д) бактериологические методы

461. Какой из указанных паразитов относится к классу плоских червей?

- а) аскарида
- б) трихинелла
- в) телязия
- г) бычий цепень
- д) фасциола

462. Кто преимущественно является дефинитивным хозяином при фасциолёзе?

- а) кошки
- б) лошади
- в) собаки
- г) жвачные
- д) свиньи

463. Какая из перечисленных болезней передаются при помощи кровососущих насекомых?

- а) оксиуроз
- б) трихинеллез
- в) бабезиоз
- г) эймериоз
- д) диктиокаулёз

464. Какой из методов диагностики применяют при трихинеллезе животных?

- а) компрессорный метод
- б) гельминтологическое вскрытие
- в) гельминтооовоскопия
- г) гельминтолارвоскопия
- д) гельминтоскопия

465. При каком заболевании жизненный цикл возбудителя проходит в эпидермальном слое кожи?

- а) псороптоз
- б) демодекоз
- в) хориоптоз
- г) саркоптоз
- д) гиподерматоз КРС

466. Какой из указанных возбудителей локализуется по периферии эритроцита?

- а) псороптес
- б) демодекс
- в) бабезия
- г) саркоптес
- д) телязия

467. Что кроме кишечника поражается у кроликов при эймериозе?

- а) лёгкие
- б) мочевого пузырь
- в) почки
- г) мочеполовой канал
- д) печень

468. Что кроме кишечника поражается у гусей при эймериозе?

- а) клоака
- б) почки
- в) печень
- г) мочевого пузырь
- д) лёгкие

469. Кто является промежуточным хозяином при телязиозе КРС?



- а) слепни
- б) мухи-коровницы
- в) комары
- г) подкожный овод
- д) моллюск-прудовик

470. Кто является промежуточным хозяином при фасциолёзе?

- а) слепни
- б) мухи-коровницы
- в) комары
- г) подкожный овод
- д) моллюск-прудовик

471. При каком заболевании животное одновременно является и промежуточным и дефинитивным хозяином?

- а) бабезиоз
- б) цистицеркоз (финноз) свиней
- в) трихинеллез
- г) фасциолёз
- д) ценуроз церебральный

472. При какой болезни, вызванной клещами, поражения кожи начинаются с конечностей?

- а) псороптоз
- б) демодекоз
- в) хориоптоз
- г) саркоптоз
- д) отодектоз

473. Какой из указанных клещей относится к накожникам?

- а) псороптес
- б) демодекс
- в) хориоптес
- г) саркоптес
- д) отодектес

474. Какой из указанных клещей относится к кожеедам?

- а) псороптес
- б) демодекс
- в) хориоптес
- г) саркоптес
- д) отодектес

475. Какой из указанных клещей относится к зудням?

- а) псороптес
- б) демодекс
- в) хориоптес
- г) саркоптес
- д) отодектес

476. Какой из указанных клещей вызывает «железницу»?

- а) псороптес
- б) демодекс
- в) хориоптес
- г) саркоптес
- д) отодектес

477. Какой из указанных клещей локализуется в волосяных фолликулах, в сальных и потовых железах?

- а) псороптес
- б) демодекс
- в) хориоптес
- г) саркоптес
- д) отодектес

478. При каком из указанных заболеваний отмечается самый сильный зуд?

- а) псороптоз
- б) демодекоз



- в) хориоптоз
- г) саркоптоз
- д) отодектоз

479. При диагностике какого заболевания берут соскобы со складок вокруг ануса и внутренней поверхности корня хвоста?

- а) аскаридоз
- б) трихинеллез
- в) оксиуроз
- г) фасциолёз
- д) эймериоз

480. Исследование фекалий на наличие целых гельминтов или их частей называется:

- а) гельминтоовоскопия
- б) трихинеллоскопия
- в) гельминтолارвоскопия
- г) гельминтоскопия
- д) микроскопия

481. Исследование фекалий на наличие яиц паразитов с последующим определением по ним рода и вида гельминта называется:

- а) гельминтоовоскопия
- б) трихинеллоскопия
- в) гельминтоларвоскопия
- г) гельминтоскопия
- д) микроскопия

482. Исследование фекалий на наличие личинок паразитов с последующим определением по ним рода и вида гельминта называется:

- а) гельминтоовоскопия
- б) трихинеллоскопия
- в) гельминтоларвоскопия
- г) гельминтоскопия
- д) микроскопия

483. Исследование мышечной ткани на наличие личинок трихинелл называется:

- а) гельминтоовоскопия
- б) трихинеллоскопия
- в) гельминтоларвоскопия
- г) гельминтоскопия
- д) микроскопия

484. Исследование тканей и органов животного с целью выявления в них гельминтов, с последующим их количественным и качественным учетом называется:

- а) гельминтоовоскопия
- б) трихинеллоскопия
- в) гельминтоларвоскопия
- г) гельминтоскопия
- д) гельминтологическое вскрытие

485. Исследование тканей и органов, в процессе которого из них извлекают макроскопически заметных гельминтов или крупных личинок и подсчитывают их количество, называется:

- а) полное гельминтологическое вскрытие
- б) трихинеллоскопия
- в) гельминтоларвоскопия
- г) гельминтоскопия
- д) неполное гельминтологическое вскрытие

486. Хроническая болезнь КРС с образованием в коже свищей, общим токсикозом и снижением продуктивности называется:

- а) телязиоз КРС
- б) гиподерматоз КРС
- в) диктиокаулёз
- г) бабезиоз



д) цистицеркоз (финноз) КРС

487. Цестодоз жвачных, характеризующийся повреждением головного мозга, нервными проявлениями и истощением животных называется:

- а) телязиоз КРС
- б) ценуроз церебральный
- в) диктиокаулёз
- г) бабезиоз
- д) цистицеркоз (финноз) КРС

488. Заболевание, вызванное личиночной стадией цестоды *мультицепс мультицепс*, называется:

- а) демодекоз
- б) бабезиоз
- в) диктиокаулёз
- г) ценуроз церебральный
- д) саркоптоз

489. Протозойная болезнь, характеризующаяся повреждением кишечника и сопровождающаяся поносами, истощением и падежом животных, называется:

- а) демодекоз
- б) бабезиоз
- в) диктиокаулёз
- г) эймериоз
- д) псороптоз

490. Укажите болезнь с поражением скелетных мышц, сердца, языка и других органов, окончательным хозяином при которой является человек, а промежуточным – КРС?

- а) цистицеркоз (финноз) КРС
- б) гиподерматоз КРС
- в) диктиокаулёз
- г) бабезиоз
- д) телязиоз КРС

491. Дезинсекция – это:

- а) комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов
- б) комплекс мер, направленных на уничтожение клещей
- в) комплекс мер, направленных на уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных болезней
- г) комплекс мер, направленных на уничтожение насекомых
- д) система мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекций

492. Деакаризация – это:

- а) комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов
- б) комплекс мер, направленных на уничтожение клещей
- в) комплекс мер, направленных на уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных болезней
- г) комплекс мер, направленных на уничтожение насекомых
- д) система мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекций

493. Дезинвазия – это:

- а) комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов
- б) комплекс мер, направленных на уничтожение клещей
- в) комплекс мер, направленных на уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных болезней
- г) комплекс мер, направленных на уничтожение насекомых
- д) система мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекций

494. Укажите болезнь лошадей, при которой возникают бронхиты, бронхопневмонии, энтериты и интоксикация организма?

- а) оксиуроз
- б) параскаридоз
- в) диктиокаулёз
- г) бабезиоз
- д) псороптоз

495. Для какого заболевания характерна локализация паразита в бронхах и трахее?

- а) телязиоз
- б) фасциолёз



- в) диктиокаулёз
- г) бабезиоз
- д) демодекоз

496. Для какого заболевания характерна локализация паразита в конъюнктивальном мешке, под третьим веком, в протоках слёзной железы и в слёзно-носовом канале?

- а) телязиоз
- б) фасциолёз
- в) диктиокаулёз
- г) бабезиоз
- д) демодекоз

497. Кто из указанных паразитов вызывает симулидотоксикоз?

- а) мухи
- б) слепни
- в) бабезии
- г) мошки
- д) клещи

498. Кто из указанных паразитов вызывает сифункулятоз?

- а) мухи
- б) вши
- в) власоеды и пухопероеды
- г) мошки
- д) клещи

499. Кто из указанных паразитов вызывает маллофагоз?

- а) мухи
- б) вши
- в) власоеды и пухопероеды
- г) мошки
- д) клещи

500. Укажите болезнь, которую вызывают инфузории:

- а) балантидиоз
- б) ценуроз церебральный
- в) эймериоз
- г) бабезиоз
- д) цистицеркоз (финноз) КРС