

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКОГО (КРЕСТЬЯНСКОГО) ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СФЕРЕ АГРАРНОГО ТУРИЗМА

1. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Основы создания и ведения фермерских хозяйств в условиях действия рыночных законов.
3. Права и обязанности членов фермерского хозяйства.
4. Государственная поддержка и гарантии деятельности фермерских хозяйств.
5. Реорганизация и ликвидация фермерского хозяйства

1.

Крестьянским (фермерским) хозяйством признается коммерческая организация, созданная одним гражданином или членами одной семьи, внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель (далее – фермерское хозяйство).

Основными направлениями фермерских хозяйств являются: скотоводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, растениеводство, садоводство или выращивание грибов, зелени.

Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют виды деятельности фермерского хозяйства.

Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- транспортировка (перевозка) сельскохозяйственной продукции;
- хранение, реализация сельскохозяйственной продукции.

Фермерскому хозяйству принадлежит на праве собственности имущество, переданное в качестве вклада в уставный фонд фермерского хозяйства его учредителями (членами), а также имущество, произведенное и приобретенное фермерским хозяйством в процессе его деятельности.

Члены фермерского хозяйства имеют обязательственные права в отношении этого фермерского хозяйства.

Отношения, связанные с созданием и деятельностью фермерского хозяйства, регулируются Законом о фермерском хозяйстве, актами Президента Республики Беларусь, гражданским законодательством, законодательством об охране и использовании земель и иным законодательством.

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о фермерском хозяйстве, то применяются правила международного договора.

Реализация продукции фермерского хозяйства. 1. Фермерское хозяйство вправе распоряжаться произведенной им продукцией и реализовывать ее по своему усмотрению в соответствии с заключенными договорами.

2. При реализации сельскохозяйственной продукции, а также в процессе ее производства, переработки, хранения и транспортировки фермерское хозяйство обязано соблюдать санитарные нормы и правила, требования законодательства в области качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека, а также требования экологической безопасности.

2.

Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь.

Преимущественное право на создание фермерских хозяйств на земельных участках, изъятых у ликвидируемых и реорганизуемых сельскохозяйственных организаций, имеют члены (работники) этих сельскохозяйственных организаций.

Решение о создании фермерского хозяйства оформляется протоколом собрания учредителей фермерского хозяйства (кроме случаев создания фермерского хозяйства одним гражданином).

Устав фермерского хозяйства. Фермерское хозяйство действует на основании устава, в котором указываются:

- наименование фермерского хозяйства, которое должно содержать слова "крестьянское (фермерское) хозяйство" либо "фермерское хозяйство" или "крестьянское хозяйство";
- сведения о главе и иных членах фермерского хозяйства (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства);
- место нахождения фермерского хозяйства;
- цели деятельности фермерского хозяйства;
- размер уставного фонда фермерского хозяйства, размер вкладов в уставный фонд его членов, состав, сроки и порядок их внесения;
- размер долей членов фермерского хозяйства в его уставном фонде;
- порядок формирования имущества фермерского хозяйства и условия распоряжения им;
- порядок трудового участия членов фермерского хозяйства в деятельности фермерского хозяйства;
- порядок распределения прибыли фермерского хозяйства;
- права и обязанности членов фермерского хозяйства;
- порядок вступления в состав членов фермерского хозяйства новых членов, выхода и исключения из состава членов фермерского хозяйства;
- порядок управления деятельностью фермерского хозяйства, его ликвидации.

Устав фермерского хозяйства утверждается решением собрания учредителей фермерского хозяйства, которое оформляется протоколом собрания

учредителей фермерского хозяйства. Протокол собрания учредителей фермерского хозяйства подписывается всеми учредителями фермерского хозяйства.

В случае создания фермерского хозяйства одним гражданином устав фермерского хозяйства утверждается этим гражданином (главой фермерского хозяйства).

Уставный фонд фермерского хозяйства. При создании фермерского хозяйства формируется его уставный фонд в порядке, установленном настоящим Законом, иным законодательством и уставом фермерского хозяйства.

Уставный фонд фермерского хозяйства формируется из стоимости вкладов учредителей (членов) фермерского хозяйства.

Вкладом в уставный фонд фермерского хозяйства могут быть принадлежащие учредителям (членам) фермерского хозяйства на праве собственности (в том числе общей собственности) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права либо иные отчуждаемые права, имеющие стоимость.

Оценка стоимости неденежного вклада в уставный фонд фермерского хозяйства подлежит экспертизе в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

В уставный фонд фермерского хозяйства не может быть внесено имущество, если право на отчуждение этого имущества ограничено законодательством, договором либо собственником.

Уставный фонд фермерского хозяйства делится на доли, за исключением случаев создания фермерского хозяйства одним гражданином. Размер доли учредителя (члена) фермерского хозяйства в уставном фонде определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли учредителя фермерского хозяйства на момент формирования уставного фонда фермерского хозяйства равняется отношению стоимости его вклада в уставный фонд к размеру уставного фонда фермерского хозяйства.

Стоимость доли учредителя (члена) фермерского хозяйства в имуществе фермерского хозяйства равняется части стоимости чистых активов фермерского хозяйства, пропорциональной размеру его доли в уставном фонде фермерского хозяйства.

В случае внесения в уставный фонд фермерского хозяйства имущества, принадлежащего учредителям (членам) фермерского хозяйства на праве общей собственности, размеры долей членов фермерского хозяйства считаются равными, если иное не предусмотрено уставом фермерского хозяйства.

Уменьшение уставного фонда фермерского хозяйства допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения обязательств фермерского хозяйства и возмещения им убытков.

Увеличение уставного фонда фермерского хозяйства допускается после внесения всеми его учредителями (членами) вкладов в уставный фонд в полном объеме.

Увеличение уставного фонда может осуществляться за счет имущества фермерского хозяйства, дополнительных вкладов в уставный фонд чле-

нов фермерского хозяйства и (или) за счет вкладов в уставный фонд граждан, принимаемых в состав членов фермерского хозяйства в качестве новых членов.

При увеличении уставного фонда фермерского хозяйства за счет имущества фермерского хозяйства размер доли члена фермерского хозяйства может быть изменен с учетом вклада в уставный фонд и (или) личного трудового участия члена фермерского хозяйства в его деятельности по решению общего собрания членов фермерского хозяйства.

Государственная регистрация фермерского хозяйства. Фермерское хозяйство считается созданным с даты его государственной регистрации.

Государственная регистрация фермерского хозяйства осуществляется в соответствии с законодательными актами.

Для целей государственной регистрации местом нахождения фермерского хозяйства может являться жилое помещение (квартира, жилой дом), принадлежащее главе фермерского хозяйства на праве собственности (в том числе на праве долевой или совместной собственности) либо являющееся его постоянным местом жительства (за исключением жилого помещения государственного жилищного фонда).

Органы управления фермерского хозяйства. 1. Управление деятельностью фермерского хозяйства, в состав которого входят два или более члена, осуществляют общее собрание членов фермерского хозяйства и глава фермерского хозяйства.

Общее собрание членов фермерского хозяйства является высшим органом управления фермерского хозяйства.

Глава фермерского хозяйства является исполнительным органом фермерского хозяйства.

2. В фермерском хозяйстве, созданном одним гражданином, глава фермерского хозяйства является высшим органом управления, который вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью фермерского хозяйства.

Глава фермерского хозяйства. 1. Главой фермерского хозяйства является один из учредителей (членов) фермерского хозяйства, избранный на эту должность собранием учредителей фермерского хозяйства или общим собранием членов фермерского хозяйства и указанный в уставе фермерского хозяйства.

Глава фермерского хозяйства подотчетен общему собранию членов фермерского хозяйства.

2. В случае создания фермерского хозяйства одним гражданином главой фермерского хозяйства является этот гражданин.

3. Глава фермерского хозяйства не может быть одновременно руководителем иной коммерческой организации.

4. Глава фермерского хозяйства без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе представляет его интересы во взаимоотношениях с государственными органами, гражданами и юридическими лицами, совершает от имени фермерского хозяйства сделки, выдает доверенности на право представительства от имени фермерского хозяйства, распоряжается имуществом фермерского хозяйства, является нанимателем лиц, рабо-

тающих в фермерском хозяйстве по трудовому договору, осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Законом или уставом фермерского хозяйства.

5. В случае временной потери трудоспособности или отсутствия (не более четырех месяцев подряд) главы фермерского хозяйства по решению общего собрания членов фермерского хозяйства глава фермерского хозяйства может уполномочить выполнять его обязанности на основании доверенности одного из членов фермерского хозяйства.

6. В случае временной потери трудоспособности или длительного отсутствия (более четырех месяцев подряд), отказа от выполнения обязанностей главы фермерского хозяйства, выхода или исключения из состава членов фермерского хозяйства или смерти главы фермерского хозяйства решением общего собрания членов фермерского хозяйства избирается новый глава фермерского хозяйства.

7. Если ведение фермерского хозяйства осуществляется одним гражданином, то в случае временной потери им трудоспособности или отсутствия (но не более четырех месяцев подряд) он может уполномочить выполнять его обязанности на основании договора поручения или договора доверительного управления имуществом дееспособного гражданина.

Члены фермерского хозяйства. Членами фермерского хозяйства могут быть дееспособные граждане, являющиеся членами одной семьи.

Членами семьи признаются супруги, их родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные), братья и сестры, супруги и дети указанных лиц, а также другие лица, признанные членами семьи в соответствии с законодательством о браке и семье.

Членство в фермерском хозяйстве сохраняется, если иное не предусмотрено уставом фермерского хозяйства, за членами фермерского хозяйства, которые не могут принимать личное трудовое участие в деятельности фермерского хозяйства в связи с:

- выходом на пенсию по возрасту или инвалидности – пожизненно;
- переходом на работу на выборную должность, прохождением военной службы по призыву, обучением по дневной форме в учреждениях образования, обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, - на время работы на выборной должности, прохождения военной службы по призыву, обучения по дневной форме в таких учреждениях образования.

Изменение состава членов фермерского хозяйства может осуществляться по следующим основаниям:

- принятие нового члена фермерского хозяйства, в том числе в результате уступки доли (ее части) члена фермерского хозяйства в уставном фонде фермерского хозяйства;
- выход члена фермерского хозяйства из состава членов фермерского хозяйства;
- исключение члена фермерского хозяйства из состава членов фермерского хозяйства;
- смерть члена фермерского хозяйства или объявление его умершим.

Принятие нового члена фермерского хозяйства может быть принято по решению общего собрания членов фермерского хозяйства или главы фермерского хозяйства (в случае создания фермерского хозяйства одним гражданином) при условии внесения вклада в уставный фонд фермерского хозяйства, а также в результате уступки доли (ее части) члена фермерского хозяйства в уставном фонде фермерского хозяйства в порядке, установленном уставом фермерского хозяйства.

Член фермерского хозяйства вправе в любое время выйти из состава членов фермерского хозяйства независимо от согласия других членов фермерского хозяйства при условии предварительного их уведомления в порядке и сроки, установленные уставом фермерского хозяйства, но не позднее чем за месяц до выхода из состава членов фермерского хозяйства.

Член фермерского хозяйства может быть исключен из состава членов фермерского хозяйства на основании решения общего собрания членов фермерского хозяйства в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им обязанностей, предусмотренных настоящим Законом, иными законодательными актами или уставом фермерского хозяйства, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также по иным основаниям, установленным уставом фермерского хозяйства.

В случае смерти члена фермерского хозяйства или объявления его умершим его наследник (наследники) может быть принят в члены фермерского хозяйства по решению общего собрания членов фермерского хозяйства.

В случае смерти члена фермерского хозяйства, если его наследниками по завещанию являются юридическое лицо Республики Беларусь или административно-территориальная единица Республики Беларусь, им выплачивается стоимость наследуемой доли.

В случае смерти главы фермерского хозяйства, созданного одним гражданином, его наследник (наследники), изъявивший (изъявившие) желание вести фермерское хозяйство, признается членом (членами этого фермерского хозяйства).

При отказе наследника (наследников) от вступления в состав членов фермерского хозяйства либо при вынесении общим собранием членов фермерского хозяйства решения об отказе в принятии наследника (наследников) в состав членов фермерского хозяйства расчеты с ним (с ними) производятся в порядке, предусмотренном Законом о фермерском хозяйстве.

Состав имущества фермерского хозяйства. Фермерское хозяйство может иметь в собственности необходимые для производства сельскохозяйственной продукции, а также ее переработки, хранения, транспортировки и реализации насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птицу, сельскохозяйственную и иную технику и оборудование, транспортные средства, инвентарь, имущество частных унитарных предприятий, созданных фермерским хозяйством, другое имущество, приобретенное фермерским хозяйством, а равно принадлежащие фермерскому хозяйству имущественные права либо иные отчуждаемые права, имеющие стоимость.

2. Продукция и доходы, полученные в результате деятельности фермерского хозяйства, являются собственностью этого фермерского хозяйства.

Источники формирования имущества фермерского хозяйства. Источниками формирования имущества фермерского хозяйства могут быть:

- вклады в уставный фонд фермерского хозяйства;
- доходы, полученные от реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции, а также от других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

Организации и индивидуальные предприниматели вправе передавать фермерским хозяйствам неиспользуемые здания, сооружения, сельскохозяйственную технику и оборудование в аренду с последующим их выкупом и отсрочкой начала внесения арендной платы сроком до трех лет.

Распределение прибыли фермерского хозяйства. Прибыль фермерского хозяйства распределяется по итогам финансового года между его членами по решению общего собрания членов фермерского хозяйства соразмерно долям в уставном фонде фермерского хозяйства и (или) личному трудовому участию членов фермерского хозяйства в его деятельности.

Порядок осуществления расчетов при выходе или исключении члена фермерского хозяйства из состава членов фермерского хозяйства

При выходе или исключении члена фермерского хозяйства из состава членов фермерского хозяйства он вправе получить стоимость своей доли в имуществе фермерского хозяйства.

Причитающаяся гражданину, вышедшему или исключенному из состава членов фермерского хозяйства, стоимость доли в имуществе фермерского хозяйства определяется по бухгалтерскому балансу, составленному на момент его выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли - на день расчета с ним. Выплата стоимости доли и части прибыли гражданину, вышедшему или исключенному из состава членов фермерского хозяйства, производится по окончании финансового года, в котором он вышел или исключен из состава членов фермерского хозяйства, в срок до 12 месяцев со дня подачи заявления о выходе или принятия решения об исключении, если иной срок не предусмотрен уставом фермерского хозяйства.

3.

Члены фермерского хозяйства вправе:

- участвовать в управлении деятельностью фермерского хозяйства в порядке, установленном настоящим Законом и уставом фермерского хозяйства;
- получать информацию о деятельности фермерского хозяйства, в том числе о его доходах и расходах, знакомиться с его уставом, документами бухгалтерской отчетности и иными документами в порядке, установленном уставом фермерского хозяйства;
- участвовать в распределении прибыли, полученной фермерским хозяйством;

- получать часть прибыли в порядке, установленном настоящим Законом и уставом фермерского хозяйства;
- получать вознаграждение за труд в денежных единицах и (или) натуральной форме, иметь ежедневный и еженедельный отдых, трудовые и социальные отпуска в соответствии с законодательством о труде;
- продать или иным образом уступить свою долю (ее часть) в уставном фонде фермерского хозяйства в порядке, установленном уставом фермерского хозяйства;
- приобретать у членов фермерского хозяйства в преимущественном порядке перед другими гражданами (не членами фермерского хозяйства) доли (их части) в уставном фонде фермерского хозяйства;
- выйти из состава членов фермерского хозяйства независимо от согласия других его членов в порядке, установленном настоящим Законом и уставом фермерского хозяйства, и получить стоимость своей доли в имуществе фермерского хозяйства, а также причитающуюся часть прибыли;
- получить в случае ликвидации фермерского хозяйства часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально своей доле в уставном фонде фермерского хозяйства, а также с учетом их личного трудового участия, если иной порядок не предусмотрен уставом фермерского хозяйства.

Члены фермерского хозяйства в соответствии с законодательством об охране труда, социальной защите и социальном страховании имеют право на охрану труда, социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в случае профессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы.

Члены фермерского хозяйства обязаны:

- сформировать уставный фонд фермерского хозяйства в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и уставом фермерского хозяйства;
- принимать личное трудовое участие в деятельности фермерского хозяйства;
- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну фермерского хозяйства;
- соблюдать требования устава фермерского хозяйства и исполнять решения его органов управления, соответствующие настоящему Закону, иным актам законодательства и уставу фермерского хозяйства.

4.

Фермерским хозяйствам, у которых выручка от реализации произведенной или произведенной и переработанной ими продукции собственного производства растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства составляет не менее 50 процентов от общей выручки за предыдущий финансовый год, а также вновь созданным фермерским хозяйствам (в течение первого года со дня их создания) оказывается государственная поддержка за счет средств республиканского и местных бюджетов в порядке и формах, предусмотренных законодательством.

Указанным хозяйствам оказывается государственная поддержка в сфере материально-технического снабжения, приобретения (в том числе по договору финансовой аренды (лизинга)), ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, мелиорации земель и известкования почв, защиты растений, семеноводства, ветеринарного и племенного дела, научного обслуживания и в иных сферах наравне с другими производителями сельскохозяйственной продукции.

Фермерские хозяйства имеют равные права с другими производителями сельскохозяйственной продукции на поставку товаров для государственных нужд в соответствии с законодательством.

Установление границ земельных участков, предоставленных для ведения фермерских хозяйств, разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства фермерских хозяйств, оформление документов, удостоверяющих права на земельные участки, осуществляются государственными организациями, подчиненными Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством об охране и использовании земель, за счет средств, направляемых на эти цели из республиканского бюджета.

Президентом Республики Беларусь могут быть установлены иные условия и формы государственной поддержки и гарантии деятельности фермерских хозяйств.

На территории, где отсутствуют объекты производственной инфраструктуры, районный исполнительный и распорядительный орган обеспечивает первичное обустройство фермерского хозяйства путем строительства дорог, линий радио- и электропередачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи и иных объектов, а также мелиорацию земель за счет средств, направляемых на эти цели из республиканского и местных бюджетов в соответствии с законодательством.

5.

Реорганизация фермерского хозяйства. 1. Фермерское хозяйство может быть реорганизовано по решению высшего органа управления фермерского хозяйства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Реорганизация фермерского хозяйства осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и уставом фермерского хозяйства.

2. Члены вновь возникшего в результате реорганизации фермерского хозяйства должны соответствовать требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 4 и пункте 1 статьи 8 настоящего Закона.

Ликвидация фермерского хозяйства. 1. Ликвидация фермерского хозяйства осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательными актами.

2. Споры о ликвидации фермерского хозяйства разрешаются в хозяйственном суде.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКИХ (КРЕСТЬЯНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

1. Биолого-физиологические особенности крупного рогатого скота
2. Особенности организации воспроизводства стада крупного рогатого скота
3. Особенности выращивания ремонтных телок
4. Системы и способы содержания коров
5. Породы крупного рогатого скота, молочного направления продуктивности
6. Выращивание телят в молочный период
7. Основы производства говядины в фермерском хозяйстве
8. Основы мясного скотоводства
9. Организация мясного скотоводства в фермерском хозяйстве

1.

Крупный рогатый скот растет и развивается в сравнении с другими сельскохозяйственными животными медленно и долго: до 5 лет – скороспелые породы и до 7 лет – позднеспелые. Естественная продолжительность жизни коров составляет около 20 лет, иногда – до 35 лет. Срок хозяйственного использования коров – 7–10 лет.

Половая зрелость у телок наступает в 6–9 мес, у бычков – в 7–10 мес, физиологическая – в 14–16 и 15–18 мес. Однако возраст не является главным показателем возможности первого осеменения телок. Его следует увязывать с их развитием и живой массой. Считается, что живая масса телок к первой случке должна составлять не менее 70 % живой массы полновозрастных коров (для крупных пород – не менее 360–400 кг, для мелких – 320–360 кг). Удлинение периода выращивания телок из-за недостаточного кормления и осеменение их в более старшем возрасте также недопустимы, так как это связано с нарушением воспроизводительной функции и увеличением числа повторных осеменений.

Первый отел проходит в возрасте 25–29 мес. Корова в год приносит одного теленка, т. е. скорость размножения крупного рогатого скота в сравнении с другими сельскохозяйственными животными очень низкая.

Стельность коров продолжается 260–310 дней в зависимости от породы, метода разведения, пола будущего теленка (в среднем 285 дней). Двойни бывают в 2 % случаев. Большинство телок из разнополых двоен являются бесплодными, поэтому их не следует оставлять для воспроизводства стада. Средняя продолжительность лактации – 300–305 дней.

Бычки рождаются более тяжелыми (на 1–3 кг) и в дальнейшем растут быстрее при более низких затратах корма, чем телки, что объясняется хорошо выраженным половым диморфизмом, особенно в более старшем возрасте. Связано это с формированием у бычков с достижением половой зрелости вторичных половых признаков, к которым и относится живая масса. Поэтому при производстве говядины нецелесообразно проводить кастрацию самцов,

так как волю ввиду отсутствия в организме половых желез, отвечающих за образование андрогенов, растут менее интенсивно.

Крупный рогатый скот почти лишен цветного зрения и воспринимает только яркость освещения, он относительно неприхотлив и хорошо акклиматизируется в различных почвенно-климатических условиях, что способствует его широкому распространению.

Крупный рогатый скот способен превращать грубые корма в продукты, пригодные для питания человека, что не характерно для других видов сельскохозяйственных животных. Способность крупного рогатого скота переваривать объемистые корма с высоким содержанием клетчатки обусловлена наличием у него многокамерного желудка и специфического пищеварения в желудочно-кишечном тракте, где микроорганизмы синтезируют полноценные белки из клетчатки, низкокачественных белков и небелкового азота. Эта особенность жвачных животных создает им большую популярность.

Желудок у крупного рогатого скота состоит из четырех камер: рубца, сетки, книжки и сычуга. Многослойный эпителий слизистой оболочки рубца, сетки и книжки лишен желез, поэтому эти отделы называются преджелудками.

Из ротовой полости жвачных значительная часть пищи попадает в рубец непрожеванной. В рубце корм набухает, размягчается, измельчается и подвергается брожению под действием различных микроорганизмов и ферментов корма. Перемешивание корма в рубце происходит благодаря сильным сокращениям стенки рубца. Микроорганизмы рубца расщепляют клетчатку (оболочка растительных клеток). Поэтому жвачные хорошо усваивают солому и другие корма, богатые клетчаткой. Микрофлора рубца синтезирует витамины группы В.

Характерная особенность пищеварения жвачных – отрыгивание жвачки, т. е. возвращение набухшего и размягченного корма из рубца и сетки небольшими порциями обратно в ротовую полость для дополнительного пережевывания, после чего корм, обильно смоченный слюной, вторично проглатывается и попадает в книжку. За сутки корова успевает пережевать до 100 кг содержимого рубца. Продолжительность одной жвачки – 40–50 мин. В книжке происходит дальнейшее измельчение и переваривание корма. Разжиженная его часть направляется в сычуг, вместе с тем до 70 % жидкости всасывается в книжке. В сычуге корм подвергается действию ферментов. Пепсин расщепляет протеины корма. Липаза расщепляет жиры.

В первый период жизни молодняка жвачных рубец не функционирует. Молоко, потребляемое телятами, по пищеводному желобу попадает в сычуг. Сычужный сок богат ферментом – химозином. Важно лишь, чтобы молоко поступало небольшими порциями, что обеспечивается при подсосном выращивании телят или при выпаивании им молока из сосковых поилок. В таком случае оно хорошо подвергается действию химозина. По мере роста телят у них начинают функционировать преджелудки. Раннее приучение телят к поеданию растительных кормов стимулирует развитие преджелудков.

Средняя продолжительность полового цикла у коров составляет 21 день, у телок – 20 дней. У некоторых коров и телок наряду с нормальными

регистрируются укороченные (7–12 дней) и удлиненные (26–45 дней) половые циклы. Увеличение продолжительности полового цикла косвенно указывает на гибель эмбриона. Как правило, в конце каждого полового цикла у животных наблюдается половое возбуждение – это своеобразная поведенческая реакция самки. Она проявляется рядом характерных признаков: животное активно, у него ухудшается аппетит. Находясь в стаде, такая корова обнюхивает других самок, прыгает на них, допускает прыжки самок на себя. При наличии в стаде самца осуществляется ритуал взаимного ухаживания, который, в частности, включает заигрывание, обнюхивание и облизывание самцом эрогенных зон (область паха, поясница, клитор, молочная железа). Под влиянием раздражения эрогенных зон возрастает концентрация в крови окситоцина, сопровождающаяся подъемом сократительной активности матки. При прыжках на других самок и на самца ускоряется выведение наружу половой слизи. Таким образом возрастает уровень готовности половых путей к осеменению и оплодотворению.

В начале стадии полового возбуждения у коровы можно обнаружить выделение из половых органов небольшого количества слегка мутной полужидкой слизи, спустя сутки секрета слизи заметно возрастает, она выделяется в виде шнура, по цвету и консистенции напоминающего белок куриного яйца. Вульва и слизистые оболочки преддверия и влагалища гиперемизованы. Канал шейки матки в это время приоткрыт на 0,5–1 см.

Во второй половине течки выделение слизи почти прекращается, однако уже в конце течки выделение половой слизи вновь усиливается (фактор самоочищения половых путей), она становится густой, мажущейся, мутной. Течка начинается у коров за 15 ч до начала охоты и продолжается в среднем 28–30 ч (от 10 до 56). Чаще всего она продолжается одни сутки.

Признаки полового возбуждения проявляются у коровы через 1–2 суток после начала течки: корова становится подвижной, постоянно оглядывается на зад, не ложится, мычит, у некоторых животных заметно снижается удои и ухудшается аппетит. При свободно-выгульном содержании корова активно перемещается, вскакивает на других самок, в дальнейшем начинает допускать прыжки самок на себя, при этом спокойно стоит («рефлекс неподвижности»).

Охота наступает через 6–12 ч после того, как у коровы появились признаки полового возбуждения. Продолжительность охоты у коров в среднем составляет 18 ч (от 6 до 36 ч). Зимой, особенно при безвыгульном содержании и скудном кормлении, признаки половой охоты проявляются у животных слабее, чем весной и летом. Нередко охота протекает с очень слабыми признаками. Поэтому, чтобы ее не пропустить, надо внимательно следить за проявлением половых рефлексов и ежедневно организовывать активный моцион. У подавляющего большинства коров (65–70 %) охота начинается утром, у 10 % – в полдень; у остальных (20–30 %) – вечером или ночью.

Овуляция у коров наиболее тесно связана по времени с началом охоты. Выход яйцеклетки из фолликула (овуляция) происходит в среднем через 24 ч после начала охоты. Сроки овуляции зависят от физиологического состояния коровы, условий кормления и интенсивности использования.

Наиболее благоприятным временем осеменения является вторая половина охоты. В это время в матке начинается всасывающий процесс, что способствует процессу оплодотворения. Если у коровы охота наступила в первой половине дня, ее осеменяют вечером, а коров, проявивших признаки охоты вечером и ночью, осеменяют на следующий день утром. Осеменять коров следует дважды с интервалом 10–12 ч.

В практике фермерских хозяйств наиболее целесообразно использовать централизованное искусственное осеменение. В этом случае владелец фермы экономит большие средства на покупке и длительном содержании племенных быков-производителей.

2.

Воспроизводство стада – один из важнейших этапов при разведении крупного рогатого скота. Правильная его организация во многом определяет рентабельность ведения отрасли. Рост объемов животноводческой продукции наряду с кормлением, уходом и содержанием в первую очередь зависит от уровня организации воспроизводства стада. Поэтому в каждом хозяйстве, где содержат крупный рогатый скот, должна быть создана база, обеспечивающая ускорение интенсификации его воспроизводства.

Помимо основной продукции – молока, от каждой коровы ежегодно необходимо получать как минимум одного теленка. Это в дальнейшем способствует сохранению высокого уровня ее молочной продуктивности, так как молочная продуктивность коров существенно изменяется с возрастом. Считается, что до 5–6-го отела молочная продуктивность коров увеличивается и только затем начинает снижаться. В связи с этим срок хозяйственного использования высокопродуктивной коровы должен составлять не менее шести лактаций, а коров с рекордными удоями – до восьми лактаций. Наиболее оптимальной считают следующую структуру дойного стада: первотелок – 21–22 %, коров второго отела – 18–19, третьего – 16–17, четвертого – 14–15, пятого и старше – 27–32 %.

В фермерских хозяйствах, где наряду с производством молока занимаются откормом молодняка крупного рогатого скота, целесообразно до 30–50 % худших коров (в зависимости от процента ввода первотелок в основное стадо) осеменять спермой быков мясных пород (рис. 1).

Для этих целей в Беларуси лучше использовать быков герефордской, шаролежской, лимузинской или абердин-ангусской пород. Причем выбор породы должен определяться развитием животных основного стада. При скрещивании с маловесным маточным поголовьем во избежание трудных отелов предпочтение следует отдавать производителям герефордской, лимузинской или абердин-ангусской пород как дающим некрупный плод. В маточных стадах, имеющих хорошие весовые кондиции (свыше 500 кг), наиболее целесообразно использовать быков шаролежской породы.

Двухпородный молодняк, полученный в результате промышленного скрещивания молочных коров с быками специализированных мясных пород, независимо от пола используют для интенсивного откорма. Как правило, он растет намного быстрее чистопородных сверстников молочной породы, тра-

тит меньше кормов на единицу прироста, имеет больший убойный выход и более высокое качество мяса.




Рис. 1. Схема простого промышленного скрещивания

В фермерских хозяйствах с небольшим поголовьем крупного рогатого скота и хорошо организованной кормовой базой целесообразно получать массовые сезонные отелы, которые должны проходить в конце зимы или начале весны как можно в более сжатые сроки. В этом случае фермерскому хозяйству удастся минимизировать производственные затраты, значительно повысить объемы производства молока, снизить себестоимость производимой продукции.

Минимизация затрат и снижение себестоимости продукции будут происходить за счет экономии энергоресурсов и трудовых затрат, связанных с доением животных и первичной обработкой молока. При таком ведении воспроизводства стада на ферме возможен непроизводительный период, когда все животные будут находиться в запуске. Это позволит владельцу фермы провести профилактический ремонт доильного оборудования, системы первичной обработки и охлаждения молока, а также значительно облегчит уход за животными и организацию их кормления на протяжении дальнейшего производственного периода, так как все они будут находиться в одинаковом физиологическом состоянии.

Планируемое повышение объемов производства молока будет возможно благодаря двум традиционным подъемам в его производстве: биологическому, обусловленному новотельностью (за первые три месяца лактации от коровы получают до 40 % всего ее удоя), и физиологическому, обусловленному выгоном на пастбище. Для коров, отелившихся в конце зимы – начале весны, свойственна двухпиковая лактационная кривая, при которой длительное время удерживаются высокие суточные удои, что способствует значительному увеличению молочной продуктивности за лактацию в целом.

В хозяйствах с большим поголовьем крупного рогатого скота и испытывающих дефицит фуража в стойловый период, напротив, намного целесообразнее вести ритмичное круглогодичное воспроизводство стада, исключая лишь летние месяцы. Это, в свою очередь, позволит обеспечить ритмичное на протяжении всего года производство молока за счет исключения спада его в зимний период.

Проведенный анализ объемов производства молока в коллективных хозяйствах республики с плохо организованной кормовой базой показал отсутствие так называемого биологического «пика», связанного с новотельностью коров. В месяцы массовых растелов (январь – март) суточный удой на одну корову в среднем по хозяйствам в лучшие годы повышался до 6,3 кг молока. Нельзя назвать разумной практику массового запуска коров в осенний, изобилующий кормами период и массовых растелов в зимне-весеннюю бескормицу, растелы в разгар бескормицы – не самое рациональное звено в технологии производства молока.

У хорошего хозяина на данный период припасены и хорошего качества сено, и концентраты, и, самое главное, большое количество сочных кормов, являющихся залогом высоких удоев у новотельных коров.

Кроме того, сезонные отелы при плохой обеспеченности хозяйств кормами накладывают большой отпечаток на второй, так называемый физиологический подъем молочной продуктивности коров. Животные, не раздоенные в начальный период лактации, в результате оказываются неспособными на высокую продуктивность с выгоном их на пастбище. В результате этого в первые летние месяцы, когда на частных подворьях молочная продуктивность коров опять возрастает, средние суточные удои в общественном стаде не превышают 11–12 кг молока в расчете на одну корову в зависимости от года.

Таким образом, система воспроизводства стада в хозяйстве должна определяться, прежде всего, состоянием кормовой базы, наличием трудовых ресурсов и производственных фондов.

Ремонт стада – одно из основных мероприятий, обуславливающих высокий уровень продуктивности скота, под ним следует понимать, своевременную замену низкопродуктивных, старых и больных коров первотелками. Ежегодная выбраковка коров из основного стада в зависимости от условий, созданных в хозяйстве, должна составлять от 15 до 30 % от общей численности поголовья.

Основными причинами выбраковки коров из основного стада являются низкая молочная продуктивность, болезни органов воспроизводства (бесплодие), молочных желез и других органов, а также инфекционные заболевания (лейкоз, туберкулез) и др. Пополнение стада должно осуществляться за счет выращивания хорошо развитых ремонтных телок.

3.

Важнейшим звеном при создании высокопродуктивных молочных стад является целенаправленное выращивание ремонтных телок с получением хорошо развитых, с крепким здоровьем животных, достигающих необходимой для осеменения живой массы в достаточно раннем возрасте (16–17

мес). Это в дальнейшем позволит получать коров, способных в первую и последующие лактации устойчиво удерживать высокие надои и обладающих хорошими воспроизводительными способностями. Упущения при выращивании ремонтных телок сдерживают проявление генетического потенциала коров по молочной продуктивности и продуктивному долголетию.

В настоящее время в мировой зоотехнической практике сложились четыре системы выращивания телок и нетелей молочных пород крупного рогатого скота.

1. Высокоинтенсивная – характеризуется интенсивным выращиванием телок на начальном этапе с последующим постепенным снижением уровня среднесуточных приростов живой массы. Данная система выращивания ремонтных телок основана на биологических особенностях роста молодого организма.

2. Умеренная – характеризуется умеренным уровнем кормления телок в первые два месяца жизни и получением более высоких приростов в старшем возрасте. Данная система выращивания ремонтных телок позволяет достичь экономии цельного молока в молочный период с компенсацией недо развития животных в последующем на более дешевых кормах.

3. Шведская – характеризуется пониженным уровнем кормления телок до полуторалетнего возраста с высоким уровнем кормления нетелей.

4. Экономичная – характеризуется умеренным уровнем кормления телок в стойловый период и высоким – в пастбищный. Данная система выращивания телок применяется в большинстве хозяйств республики, где имеются хорошие пастбищные угодья.

Каждая из указанных систем более или менее приемлема в конкретных хозяйственных условиях, однако наиболее оптимальной для фермерских хозяйств в мировой практике считают интенсивную систему выращивания ремонтных телок.

Уровень кормления ремонтных телок должен быть взаимосвязан с наследственно обусловленным типом организма, так как только до определенного предела масса тела животных способствует обеспечению напряженной лактационной деятельности. При излишнем развитии подкожной и межмышечной жировой ткани формируется мясной тип телосложения, что угнетает формирование молочной продуктивности (табл. 1).

Таблица 1. Примерная схема выращивания телок и нетелей

Возраст, мес	Живая масса полновозрастных коров, кг			
	500–550		550–600	
	Живая масса в конце периода, кг	Среднесуточный прирост, г	Живая масса в конце периода, кг	Среднесуточный прирост, г
2	70	650–700	74	700–750
3	90	650–700	96	700–750
6	150	650–700	160	700–750
12	255	550–600	270	600–650
18	340	450–500	375	550–600
24	425	450–500	460	450–500

При выращивании ремонтных телок большое значение имеет кормление растущих животных. Основными кормами на протяжении всего периода выращивания телок должны быть дешевые объемистые корма – грубые, сочные, зеленые, с незначительным уровнем концентратов в рационе. Такой тип кормления способствует хорошему развитию желудочно-кишечного тракта животных, что позволяет им в будущем потреблять и переваривать большое количество объемистых (пастбищных) кормов, являющихся залогом высокого уровня молочной продуктивности. Тип кормления телок должен быть близким к типу кормления взрослого маточного поголовья, применяемого в фермерском хозяйстве. Концентрированные корма должны составлять не более 25 % от общей энергетической ценности рациона.

Ремонтных телок необходимо выращивать только в условиях беспривязного содержания как в стойловый, так и в пастбищный периоды. Только такая система выращивания обеспечивает получение хорошо развитых, с крепким здоровьем животных.

Осеменение ремонтных телок следует проводить в возрасте 14–16 мес при достижении ими живой массы 360 кг и более.

Начиная с седьмого месяца стельности нетелей начинают подготавливать к предстоящей лактации, проводят регулярный массаж вымени, который прекращают за 20–30 дней до отела.

В первые три месяца лактации первотелку раздаивают и оценивают по молочной продуктивности. В основное стадо вводят первотелок с продуктивностью не ниже средней по стаду.

4.

В сочетании с другими факторами система и способ содержания коров создают определенные предпосылки для жизнедеятельности животных и производства продукции. В практике скотоводства применяют два способа содержания молочных коров: привязный и беспривязный. Привязный способ содержания коров и доение их в стойлах в переносные ведра или в молокопровод применяются на фермах практически любых размеров. Животные содержатся на привязи в стойлах (длина – 1,7–1,9 м, ширина – 1–1,2 м), где для каждого животного предусмотрено определенное место с кормушкой и поилкой (рис. 2). Обслуживание группы коров одним человеком, индивидуальный подход к каждой из них, наличие постоянного места кормления, поения, отдыха, доения способствуют максимальному использованию потенциальных возможностей коров.



Рис. 2. Привязный способ содержания крупного рогатого скота

Удаление навоза при такой системе содержания осуществляется при помощи скребковых транспортеров. Поение животных из автоматиче-

ских поилок, трехразовое кормление осуществляются при помощи мобильных или стационарных кормораздатчиков или вручную в зависимости от поголовья коров в хозяйстве.

Доение животных (двух- или трехразовое в зависимости от принятой технологии и уровня продуктивности животных) проводится в стойлах в переносные ведра или молокопровод.

К недостаткам данной технологии относятся большие затраты труда обслуживающего персонала на многократное отвязывание и привязывание животных, на ручную очистку стойл от навоза, индивидуальную раздачу кормов, подготовку вымени, перемещение доильных аппаратов и другие операции.

В условиях фермерских хозяйств наиболее целесообразно использовать беспривязную технологию содержания коров. Она менее энергоемка и обеспечивает получение продукции с более низкой себестоимостью несмотря на более высокие затраты кормов на ее производство.

Различают три варианта беспривязного содержания коров.

Беспривязная боксовая система содержания. При данной технологии групповые секции оборудуют индивидуальными боксами для отдыха коров, с противоположной стороны от боксов располагают кормовой стол, между ними и боксами находится навозный проход (рис. 3).



Рис. 3. Беспривязная боксовая система содержания

При использовании данной технологии удаление навоза производят по мере необходимости при помощи бульдозера. Кормление и поение животных осуществляют здесь же в групповых секциях. Доеение – на стационарных доильных установках.

Беспривязная комбибоксовая система содержания. При данной технологии групповые секции оборудуют совмещенным местом для отдыха и кормления.

При использовании данной технологии уборку навоза производят при помощи дельта-скрепера. Кормление и поение животных осуществляют здесь же в групповых секциях. Доеение – на стационарных доильных установках.

Беспривязное содержание коров на глубокой подстилке. При данной технологии животные находятся в помещении на соломенной подстилке. Подстилку добавляют не реже одного раза в неделю, навоз из помещений убирают бульдозерами.

Кормление и поение животных осуществляют либо здесь же в помещении, либо на кормовых площадках. Доеение производят в доильных залах, оборудованных стационарными доильными установками.

В пастбищный период в хозяйствах с недостаточным количеством пастбищных площадей применяют стойловую систему содержания коров. Животные для моциона используют выгульные площадки, здесь же осуществляют их кормление и поение, доение – в доильном зале (рис. 4).




Рис. 4. Беспривязное содержание коров на глубокой подстилке

В хозяйствах, располагающих необходимыми пастбищными площадями, используют пастбищную либо стойлово-пастбищную системы содержания коров на протяжении всего летнего периода. Как правило, в фермерских хозяйствах ввиду небольшой их земельной площади и незначительного удаления пастбищ от животноводческих помещений чаще используют вторую.

5.

Для производства молока в Республике Беларусь в основном используют чистопородный молочный скот, преимущественно белорусской черно-пестрой породы. Однако в последнее время для повышения молочной продуктивности коров и качества молока в республике практически повсеместно начали применять голштинизацию черно-пестрого скота, т. е. использование для племенных целей чистопородных быков-производителей голштинской породы, получение помесей 1-го и 2-го поколений по голштинской породе с дальнейшим разведением их в себе.

Удой помесей 1-го и 2-го поколений по голштинской породе увеличиваются на 350–500 кг молока по сравнению с коровами материнской породы. Однако дальнейшее прилитие крови голштинского скота ведет, как правило, к утрате ценных качеств материнской породы, животные становятся более требовательными к условиям кормления и содержания.

Белорусская черно-пестрая порода. Животные данной породы отличаются черно-пестрой мастью, пропорциональным телосложением, креп-

кой конституцией, хорошо развитым костяком и мускулатурой, обильномолочностью, хорошей скороспелостью. Мясная продуктивность выражена удовлетворительно. Убойный выход составляет 50–55 %.



Рис. 5. Корова белорусской черно-пестрой породы

Вымя пропорционально развитое, чаще чашеобразной и округлой формы. Соски цилиндрической формы (рис. 5).

Молочная продуктивность коров в хороших условиях кормления и содержания составляет 4000–6000 кг молока за лактацию жирностью 3,6–3,8 %.

Генетический потенциал по молочной продуктивности превышает 4500 кг, по среднесуточному приросту живой массы бычков – 1000–1200 г. Живая масса коров по первому отелу достигает 440 кг, по третьему отелу и старше – более 500 кг (в племенных заводах – 500 и 600 кг соответственно).

В настоящее время порода активно совершенствуется, на племпредприятиях республики используются быки с продуктивностью матерей 8000 кг молока жирностью не ниже 4 %, а также быки голштинской породы.

Голштинская порода. Выведена в США и Канаде в результате целенаправленной селекционной работы с черно-пестрым голландским скотом в течение двух столетий (рис. 6).

Животные обладают ярко выраженным обильно-молочным типом с гармонично развитым объемным выменем и крупными размерами тела. Голштинский скот является самым крупным из всех молочных пород. Живая масса новорожденных бычков составляет 44–47 кг, телочек – 38–42, коров – около 700, взрослых быков – 1000–1200 кг. Удой коров за лактацию равен 6500 кг и более при средней жирности молока 3,65 % и содержании белка 3,3 %.

Коровы характеризуются крепкой конституцией, хорошими воспроизводительными способностями, высоким качеством вымени, быстрой молокоотдачей, скороспелостью. Однако животные достаточно требовательны к условиям кормления и содержания.



Рис. 6. Корова голштинской породы

В настоящее время в мире нет породы, которая по уровню молочной продуктивности могла бы конкурировать с голштинской, поэтому голштинский скот активно завозят в зоны разведения черно-пестрой, холмогорской, симментальской и других пород для скрещивания с целью улучшения их молочной продуктивности. Однако разведение этой породы в чистоте требует прежде всего очень хорошей кормовой базы.

Молочные и молочно-мясные поро-

ды крупного рогатого скота значительно различаются между собой по уровню молочной продуктивности и составу молока. Так, специализированные молочные породы крупного рогатого скота (голштинская, черно-пестрая и др.) характеризуются высокими удоями, приспособлены к машинному доению, хорошо раздаиваются, но имеют сравнительно низкое содержание жира в молоке (3,6–4,0 %).

Как правило, удой и содержание жира в молоке имеют между собой обратную взаимосвязь: чем выше удой, тем ниже содержание жира в молоке, и наоборот. Животные, сочетающие прямую взаимосвязь между данными признаками, имеют большую племенную ценность. Однако в мире существуют породы скота, у которых высокие удои сочетаются с высокой жирно-




Рис. 7. Корова айширской породы

стью молока. Так, одной из самых распространенных пород в фермерских хозяйствах Нидерландов и Дании является айширская порода крупного рогатого скота.

Айширская порода скота. Создана в Шотландии. Завозилась в республики бывшего СССР в 60-х гг. из Финляндии (рис. 7). Животные айширской породы отличаются не только высокими удоями – 5000–6000 кг молока за лактацию, но и высокой жирностью молока – 4,2–4,5 %. Кроме того, животные этой породы очень экономно используют корма, затрачивают на 1 ц молока всего около 0,9 ц кормовых единиц, что значительно меньше, чем другие породы. Костяк тонкий и крепкий. Конституция айширского скота крепкая, экстерьер и тип телосложения характерны для молочного направления. Масть красно-пестрая с мелкими пятнами на средней и задней частях туловища. Рога лирообразной формы. Молочные признаки выражены очень хорошо, мясные – плохо. Вымя большое, ваннообразной формы, с широко расставленными сосками. Живая масса коров – 450–500 кг, взрослых быков – 900–1100, телят при рождении – 25–30 кг. Особенностью породы является ранняя скороспелость – среднесуточный прирост в первый год жизни достигает – 800–1000 г. Это позволяет сократить возраст первого осеменения телок до 14-месячного возраста.

Хорошая молочная и высокая мясная продуктивности сочетаются у комбинированных (молочно-мясных) пород. Эти породы разводят преимущественно в России, Швейцарии, Австрии, Германии, Франции и других странах с развитым скотоводством. Химический состав молока этих животных отличается большим содержанием сухих веществ в сравнении с животными специализированных молочных пород. Одной из таких пород, которая имеет широкое распространение в хозяйствах России, является симментальская порода.

Симментальская порода. Выведена в Швейцарии. В настоящее время по численности поголовья симментальский скот занимает третье место в мире после черно-пестрой и герефордской пород (рис. 8).




Рис. 8. Корова симментальской породы

Масть скота палевая, палево-пестрая, красно-пестрая, красная, рыжая. Животные имеют крепкую конституцию, крепкий костяк и крепкие конечности, хорошо развитую мускулатуру в области груди, плеча и тазобедренной части. Голова большая с широким лбом, шея средней длины, грудь глубокая средней ширины, спина широкая, задняя часть туловища длинная и широкая, кожа толстая. Живая масса новорожденных бычков

составляет 40–45 кг, телочек – 35–40, взрослых быков – 900–1100, коров – 550–650 кг. Молочная продуктивность находится на уровне 3500–4000 кг молока жирностью 3,7–3,9 %. Среднесуточный прирост живой массы на выращивании и откорме достигает 800–1200 г. Скот хорошо откармливается, и от него получают мясо высокого качества. Убойный выход откормленных животных составляет в среднем 56–58 %.

Большой интерес для разведения в фермерских и крестьянских хозяйствах представляет нормандская порода крупного рогатого скота. Эта порода очень широко распространена во Франции, в этой стране на ее долю приходится более 70 % имеющегося в государстве поголовья.

Джерсейская порода. Родиной этой породы скота является небольшой остров Джерси, находящийся в проливе Ла-Манш в 9 милях от побережья Франции и 70 милях от побережья Англии. Развитию на острове молочного скотоводства способствовали мягкий морской климат, почти круглогодичное содержание скота на хороших пастбищах.

Благодаря высокой жирномолочности джерсейский скот получил широкую известность (рис. 9).

Масть джерсеев рыжая, светло-бурая. Быки имеют более темную окраску головы, шеи, передней части туловища и, как правило, черную полосу вдоль спины. У некоторых животных на конечностях и нижней части туловища бывают белые отметины.




Рис. 9. Корова джерсейской породы

Джерсейский скот имеет нежную конституцию с четко выраженным типом телосложения молочного скота. Вымя объемистое, обычно чашеобразной формы, с широко расставленными сосками цилиндрической формы; кожа на теле тонкая, эластичная.

Джерсейская порода является самой жирномолочной породой скота в мире. Удои коров обычно составляют 3–4 тыс. кг молока за лактацию, а рекордные – до 9 000–11 500 кг. Содержание жира в молоке – 5,5–7,0 %, а у некоторых животных до 8 %, причем у отдельных коров высокие удои сочетаются с высоким содержанием жира. Среднее содержание белка в молоке коров джерсейской породы составляет 3,6–4,4 %.

Мясные качества животных низкие. Среднесуточные приросты живой массы молодняка при выращивании не превышают 800 г.

Джерсеи хорошо акклиматизируются. На территорию бывшего СССР джерсейский скот был завезен в 1948 г.

Завезенных джерсейских бычков использовали для скрещивания с маточным поголовьем черно-пестрой породы с целью повышения жирномолочности.

6.

Основной проблемой выращивания телят в молочный период является высокий уровень их заболеваемости, что нередко вызывает отход до 15–20 % и более. Особенно трудно предотвратить падеж телят в первые 15–20 дней жизни, когда они наиболее подвержены болезням желудочно-кишечного тракта (диспепсия, колибактериоз, энтерит и др.). Желудочно-кишечные заболевания новорожденных телят инфекционной и неинфекционной природы возникают, если в хозяйстве не соблюдаются ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования в технологии содержания и кормления сухостойных коров и нетелей, проведения отела и ухода за новорожденными телятами (рис. 10).

Важным звеном в технологии выращивания телят в молочный период является правильная организация их содержания. На новоро-



Рис. 10. Содержание коровы с новорожденным теленком в деннике

жденного сразу после появления его на свет одновременно воздействует ряд факторов окружающей внешней среды: температура воздуха, относительная и абсолютная влажность, движение, загазованность воздуха и др. Так как у телят тонкая кожа, редкий и короткий волос, нет подкожных жировых отложений, температура воздуха в помещениях для новорожденных не должна быть ниже 18–20 °С, влажность – 70 %. Помещение, где содержат новорожденных телят, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, так как при отсутствии вентиляции повышается не только температура, но и влажность воздуха в помещении, увеличивается количество пыли, аммиака и содержание микроорганизмов. Как показывают исследования ряда авторов, при плохом обмене воздуха в профилактории падеж телят выше в 2–3 раза, чем в по-

мещениях, где имеется постоянный его приток. Зимой вентиляция не должна вызывать образование конденсата в помещениях. Одновременно нужно избегать сквозняков, так как при быстром перемещении воздуха, особенно при низкой температуре, резко возрастают потери тепла у молодняка.

Наилучшим в практике молочного скотоводства считают содержание новорожденных телят в первые 5–7 дней после рождения под коровами-матерями, однако это возможно только в том случае, если в хозяйстве есть

специально устроенные денники. Если в фермерском хозяйстве родильное отделение не оборудовано и коровы телятся непосредственно в стойлах, телят можно содержать в профилактории в индивидуальных клетках. Используют клетки разных типов. Наибольшее распространение в хозяйствах Беларуси получили клетки Эверса размером 120×100×120 см и узкогабаритные размером 120×45×100. Узкогабаритные клетки более практичны. Для их размещения в секциях профилактория требуется меньше места (рис. 11).



Рис. 11. Содержание новорожденных телят в узкогабаритных клетках

Кроме того, в задней части клеток часто устраивают решетчатый пол, что позволяет механизировать удаление навоза. Остальная часть пола чаще всего деревянная. Решетчатый пол целесообразно изготовлять из 5-миллиметрового полосового железа. Ширина планки при этом составляет 20 мм, просветов – 12 мм. Клетки сооружают из дерева и металла. Боковые стенки делают сплошными. Для удобства работы передние и задние стенки открываются наружу. Со стороны кормового прохода они должны быть решетчатыми. В них устраивают гнезда для ведер, сосковых поилок, кормушки для скармливания сена и сухих концентратов. Со стороны кормового прохода между клетками желательно иметь разделительные щитки, установленные на высоте головы теленка, что предотвращает лизание телятами друг друга.

В фермерских хозяйствах с успехом можно практиковать «холодный» способ выращивания телят в молочный период. Телята, выращиваемые этим способом, более подвижны, лучше поедают корм, реже болеют по сравнению с содержанием в профилактории.

Суть его заключается в том, что через сутки, когда шерстный покров теленка становится совершенно сухим, его помещают в индивидуальный домик. Домик представляет собой фанерный короб без дна и передней стенки. Чтобы фанера не размокла, домик снаружи обтягивают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Размер домика следующий: длина – 250 см, ширина – 120, высота в передней части – 120, в задней – 110 см.

Ставят домики на расстоянии 1–1,5 м друг от друга недалеко от животноводческого помещения на открытой площадке с твердым покрытием. Площадка должна размещаться на солнечной стороне и иметь уклон для стока воды. Перед постановкой домика на площадку насыпают слой опилок толщиной 15–20 см (или торфокрошку влажностью до 50 %), застилают его

соломой из расчета 9–12 кг на домик. В дальнейшем подстилку добавляют в домик по мере загрязнения (через 1–2 дня). Основное требование при этом способе выращивания – наличие сухой подстилки.

Чтобы теленок имел возможность свободно выходить и получать солнечные ванны, у домика нет передней стенки. К домику пристраивают вольер шириной 120 см, длиной 180 см. Вольер огораживают съемными деревянными щитами. Для кормления и подстилки телят в верхней части боковой стенки домика делают дверцы, под ними внутри домика устраивают кормушку для сена, концентратов и подкормок. В зимнее время передняя сторона домика закрывается пологом из брезента (мешковины), который крепится в виде шторы. При температуре наружного воздуха -10°C и ниже, а также при сильном ветре, метели брезентовый полог опускают, но теленок может свободно входить и выходить из домика. При температуре выше -10°C полог надо поднять, иначе внутри домика может образоваться конденсат, что является нежелательным.

В индивидуальныхдомиках телят содержат 45–60 дней. После каждого освобождения домики переворачивают, очищают и дезинфицируют; подстилку с площадки удаляют бульдозером.

Не менее важным звеном в технологии выращивания телят в молочный период является правильная организация их кормления. Молозиво является первым кормом для телят, и по своему составу оно значительно отличается от обычного молока более высоким содержанием сухого вещества, белка в форме альбумина и глобулина, жира, минеральных веществ и витаминов. Молозиво первого-второго дня после отела по своему составу приближается к химическому составу крови новорожденного теленка. К пятому дню в молозиве уменьшается количество белков, кальция, магния и других минеральных веществ и гормонов, но возрастает количество молочного сахара.

Особый химический состав молозива и его постепенное изменение имеют большое физиологическое значение для новорожденного животного. За счет иммунных тел, поступающих с белками молозива, у телят формируется неспецифический иммунитет, компенсирующий еще несовершенную иммунную систему организма. Кроме того, молозиво, действуя послабляюще, способствует также очищению кишечника от первородного кала.

Однако молозиво является носителем антител в максимальной концентрации лишь первые 24–36 ч жизни телят, так как лишь в этот период кишечник телят проницаем для глобулинов молозива. Таким образом, если молозиво не выпоено вовремя, патогенные микроорганизмы могут вызвать необратимые последствия. В связи с этим телят первый раз следует напоить молозивом первой дойки не позже чем через 1 ч после рождения. Первая порция молозива должна составлять 6–8 % от массы плода, а суточная норма в первый день – 17–20 % от его живой массы, в последующие дни – 20–24 %. Крупным телятам за одно кормление выпаивают не более 2 л молозива, средним – 1,5, мелким и слабым – не более 1 л. В первые 2–3 дня после отела телят необходимо поить молозивом 4–5 раз в сутки, затем кратность кормления можно сократить до 3–4 раз в день. В первый раз телят можно напоить

сборным молозивом от других новотельных коров, особенно старшего возраста, так как оно содержит больше антител и характеризуется более высокой активностью. Не рекомендуется использовать молозиво от коров с продолжительностью сухостойного периода менее чем три недели и доившихся до отела, а также от коров с низкой продуктивностью.

Очень важно организовать стабильный режим кормления и ухода за телятами. Животные довольно быстро привыкают к любому распорядку и при его строгом соблюдении растут крепкими и здоровыми. Задержка с кормлением приводит к жадному потреблению корма и образованию сгустков, слабо обработанных слюной, и не только малодоступных для воздействия пищеварительных соков, но и вызывающих расстройство пищеварения. При жадном потреблении часть молозива может попасть в рубец, где может вызвать процесс гниения и, следовательно, тяжелые заболевания телят.

При расстройстве пищеварения к молоку можно добавлять воду. Разбавленное водой молоко в желудке теленка свертывается в рыхлые, творожистые сгустки и лучше переваривается.

Если понос у теленка не прекращается, надо пропустить 1–2 поения молоком, а вместо него каждый раз давать по 1,5–2 л кипяченой воды. Кроме того, можно поить теленка отваром ромашки или льняных семян (1 часть семян на 20 частей воды). Когда теленок начинает выздоравливать, воду постепенно заменяют молоком, прибавляя его примерно по 0,5 л на каждое поение.

Уже в первые дни после рождения теленку надо давать воду, вначале кипяченую, а затем после 15-дневного возраста – сырую. Как правило, воду выпаивают из сосковых поилок через 2 ч после дачи молозива или молока. Лучше для поения использовать не чистую воду, а сенной (на 1 кг сухого вещества 5 л воды) или хвойный (на 1 кг хвойных веток 10 л воды) настои, они ускоряют рост телят и улучшают их аппетит. Телята, которые не получают воду или получают ее очень мало, становятся вялыми, малоактивными, замедляют и даже прекращают рост. Длительное водное голодание вызывает смерть телят.

Хорошие результаты дает использование сквашенного молозива, особенно если численность стада превышает 40 гол. Молозиво собирается от первых восьми доек и заливается в пластиковые ведра (только в пластиковые). Ведра закрывают крышками. Перед каждым добавлением новой порции старую аккуратно перемешивают. В результате от крупной коровы можно получить до 90–100 кг молозива для сквашивания. Время полной ферментации составляет 10 дней. Для ускорения процесса сквашивания к молозиву можно добавлять немного кислых сливок или, в крайнем случае, кефира. Добавление сливок ускоряет процесс сквашивания до 4–5 дней. Затем посуду переносят в прохладное место с температурой от 5 до 20 °С, где сквашенное молозиво можно хранить до 30 дней. Если температура выше, срок хранения сокращается до 10–15 дней. Сквашенное молоко включается в схему выпойки с четвертого дня даже в том случае, если его ферментация еще не завершена. Это позволяет адаптировать телят к ферментированному молозиву до достижения в нем максимальной кислотности. Для плавного перехода от выпойки молозива к молоку допускается частичное смешивание сквашенного

молозива с молоком. Для того чтобы довести содержание сухого вещества в выпаиваемом сквашенном молозиве до уровня его содержания в молоке и снизить кислотность, молозиво разводят теплой кипяченой водой в соотношении 3:1 или 2:1. Некоторые телята могут отказываться от сквашенного молозива. Таким животным сначала следует давать цельное молоко, а затем постепенно приучать к сквашенному молозиву. Суточная норма сквашенного молозива составляет 10 % от живой массы теленка. Наряду с молозивом телятам скармливают хорошее сено и комбикорма.

Уже через неделю теленка следует приучать к поеданию сена и концентратов в сухом виде. Это необходимо для нормального развития рубцового пищеварения. В течение первых четырех-шести недель жизни пищеварительная система теленка функционирует как у животного с однокамерным желудком. Хотя желудок имеет все четыре камеры, функционирует только одна – сычуг. Остальные камеры – рубец, сетка и книжка – остаются недоразвитыми и практически не функционируют. В результате этого молозиво, молоко и заменители молока являются единственными, хорошо усваиваемыми кормами. Другие виды корма в течение трех-четырех недель в желудке теленка не перевариваются.

Как только теленок начинает употреблять стартерные комбикорма и сено, начинаются рост и развитие остальных камер желудка, в первую очередь рубца. Процессы, протекающие в рубце под действием микроорганизмов, принято называть брожением. К 2–3 мес брожение развивается в такой степени, что теленок может потреблять значительное количество растительных кормов. У телят, рано приученных к растительным кормам, в возрасте 75–100 дней в сложном желудке переваривается до 36–40 % поступающих питательных веществ.

Поэтому с 5–6-го дня жизни теленку в дополнение к молозиву начинают скармливать концентраты. Вначале можно использовать овсяный кисель. Для приготовления киселя 1 кг несеяной овсянки заливают 2,5 л горячей воды, тщательно перемешивают и оставляют на 30 мин. Образовавшуюся болтушку отжимают через сито, подсаливают (0,5 чайной ложки соли на 1 л жидкости) и, постоянно помешивая, кипятят до загустения.

В фермерских хозяйствах, специализирующихся на производстве молока, выращивание телят обычно ведут до 21–30-дневного возраста, после чего их реализуют на специализированные предприятия по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота, оставляя в хозяйстве для дальнейшего выращивания небольшое количество телок от высокопродуктивных коров для саморемонта.

7.

Технологический процесс выращивания молодняка крупного рогатого скота принято делить на три производственных периода: **выращивание** до 4-месячного возраста, **доращивание** до 12-месячного возраста и заключительный **откорм**.

Выращивание. По завершении профилакторного периода телят переводят в помещение (отделение) для выращивания, их размещают в групповых станках по 18–20 гол. в каждой. В этот период наиболее перспективными

считаются различные варианты беспривязной групповой системы содержания (боксовая, комбибоксовая, на глубокой подстилке).

Интенсивное выращивание телят в этот период – основа получения высокой продуктивности при дальнейшем их доращивании и откорме. Отставший в этот период в росте молодняк в последующем даже при хорошем кормлении и надлежащем уходе не компенсирует отставание в росте. В период выращивания очень важно приучить молодняк к поеданию больших количеств грубых и сочных кормов, составляющих основу рациона на этом этапе. Если телят выращивать преимущественно на молочных и концентрированных кормах, то в период доращивания, особенно в первые месяцы, продуктивность их будет низкой. Такие животные чаще болеют, хуже привыкают к новым условиям, плохо используют корма.

По характеру кормления период выращивания принято делить на две фазы: первая – 70, вторая – 50 дней. В первой фазе выращивания телят кормят согласно разработанной в хозяйстве схеме подкормки (выпойки). Основными кормами в этот период являются цельное молоко или его заменители (ЗЦМ), свежий обрат, хорошего качества сено, сенаж и комбикорм, в состав которого входят легкопереваримые и хорошо усвояемые лактоза, сахароза, мальтоза, декстрин-деполимеризованный крахмал, а также другие полноценные компоненты, богатые белком (табл. 2).

Таблица 2. Примерная схема кормления телят в первом периоде

Продолжительность выращивания, дн.	Расход на 1 гол., кг							
	ЗЦМ (или молоко)		комбикорма		сена		сенажа	
	в день	за период	в день	за период	в день	за период	в день	за период
Первая фаза выращивания телят								
1–7	0,5	3,5	–	–	–	–	–	–
7–14	0,6	4,2	0,1	0,7	0,05	0,35	–	–
14–21	0,7	4,9	0,2	1,4	0,06	0,42	–	–
21–28	0,7	4,2	0,3	2,1	0,07	0,49	–	–
28–35	0,6	4,2	0,5	3,5	0,08	0,56	–	–
32–42	0,5	3,5	0,7	4,9	0,1	0,70	–	–
42–49	0,3	2,1	0,9	6,3	0,12	0,84	–	–
49–56	0,1	0,7	1,2	8,4	0,25	1,75	–	–
53–63	–	–	1,3	9,1	0,30	2,10	–	–
63–70	–	–	1,5	10,5	0,90	2,80	–	–
Всего за 70 дн.	–	27,3	–	46,9	–	10,01	–	–
Затраты кормов, к. ед.	–	60	–	50	–	5,1	–	–
Вторая фаза выращивания телят								
70–80	–	–	1,6	16,0	0,6	6,0	–	–
80–90	–	–	1,8	18,0	0,9	9,0	–	–
90–100	–	–	2,1	21,0	1,2	12,0	0,7	7,0
100–110	–	–	2,2	22,0	1,0	10,0	2,0	20,0
110–120	–	–	2,3	23,0	1,0	10,0	3,0	30,0
Всего за 70 дн.	–	–	–	100	–	47	–	57
Затраты кормов, к. ед.	–	–	–	106	–	23	–	17

Для каждой фазы периода программа кормления разрабатывается с учетом возраста, физиологического состояния и продуктивности молодняка.

При отсутствии ЗЦМ его заменяют цельным и обезжиренным молоком. При недостатке комбикорма-стартера применяются различные зерносмеси (табл. 3).

Таблица 3. Примерные рецепты зерносмесей для телят, %

Компоненты	Рецепты					
	1	2	3	4	5	6
Овсяная мука тонкого помола	20	30	30	40	5	—
Ячменная мука	14	15	15	10	15	19
Пшеничная мука	—	—	—	—	15	20
Кукурузная мука	10	—	15	—	22	10
Пшеничные отруби	12	10	10	12	5	15
Жмых	15	5	5	5	9,2	12,4
Дрожжи кормовые	15	15	15	15	—	—
Гороховая мука	—	15	—	15	10	3
Мясокостная мука	5	4	4	5	—	—
Травяная мука	6	3	3	5	16	18
Кормовой мел	2	2	2	2	—	—
Обесфторенный фосфат	—	—	—	—	2	1,8
Поваренная соль	1	1	1	1	0,8	0,8
В 1 кг зерносмеси содержится:	1,0	1,0	1,03	0,98	1,0	1,0
кормовых единиц сырого протеина, г	189	179	160	151	128	135

Вместо жмыха в зерносмесь можно включать размолотое льняное семя.

Дорацивание. Основная цель периода дорацивания – подготовка молодняка к дальнейшему откорму. Принято считать, что данный период длится до 12-месячного возраста. Однако практически продолжительность его сильно варьируется и зависит от уровня кормления и применяемой в хозяйстве технологии. При интенсивной технологии, когда молодняк реализуют на мясо в возрасте 13–16 мес, этот период сокращается до 6–8-месячного возраста, а при менее интенсивной и экстенсивной – увеличивается до 12 мес и более соответственно.

В период дорацивания скот целесообразно содержать без привязи, в групповых станках, теми же группами, которые были сформированы при постановке животных на выращивание, либо на привязи.

Оптимальным на дорацивании считают среднесуточный прирост 800 г. Такой прирост обеспечивает интенсивный рост мышечной и костной тканей. Обильное кормление в этот период нежелательно, так как оно вызывает излишнее образование в организме жира и ведет к преждевременному ожирению.

В данный период и при последующем откорме в фермерском хозяйстве целесообразно применять однотипное кормление молодняка в течение всего года. В большинстве коллективных хозяйств Беларуси, а также на промышленных комплексах по производству говядины в эти периоды выращи-

вания применяют сенажно-концентратный либо силосно-концентратный типы кормления молодняка.

При дорастивании телят наиболее приемлемой считается следующая структура рационов (%): комбикорм – 35–45, сенаж либо силос – 55–65. Корма лучше скармливать в виде кормосмесей.

В условиях высокоинтенсивного откорма уровень концентрированных кормов в этот период увеличивают до 70–75 %, такой тип кормления способствует получению больших приростов и обильному отложению жира в тушах.

Откорм. Принято считать, что он длится с 12 до 16–18-месячного возраста. В целом период откорма подразделяется на три стадии: подготовительную, основную и заключительную. Однако это деление условное, и связано оно с изменением в процессе откорма типа кормления. По мере откорма сокращается количество грубых кормов и увеличивается количество концентратов.

В период откорма в фермерских хозяйствах скот целесообразно содержать на привязи, это поможет ограничить движение животных и снизить непроизводительные затраты кормов, хотя увеличит затраты ручного труда.

Наиболее целесообразно в период откорма на протяжении всего календарного года применять сенажно-концентратный либо силосно-концентратный типы кормления молодняка с увеличением доли концентратов в рационе к концу откорма до 50–60, иногда до 80 %. В летний период времени сенаж либо силос в рационах откармливаемых животных можно заменять провяленной зеленой массой.

С целью сбалансированности рационов по переваримому протеину в кормосмеси для быков на откорме целесообразно вводить амидоминеральные премиксы МП-15 и МП-30, что будет способствовать увеличению среднесуточных приростов на 26 %, а также снижению затрат кормов на 1 кг прироста на 20 % и более.

8.

В Беларуси много хороших лугов и пастбищ, во многих районах сравнительно мягкий климат – значит есть все условия для развития мясного скотоводства. Перспективным является развитие мясного скотоводства в фермерских хозяйствах, особенно в отдаленных малонаселенных местах при наличии необходимых площадей пастбищных угодий. Зарубежный опыт показывает, что мясное скотоводство – преимущественно фермерская отрасль животноводства. Это объясняется рядом особенностей данной отрасли:

- крупный рогатый скот специализированных мясных пород отличается более высокой скороспелостью в сравнении с животными большинства молочных и комбинированных пород, т. е. достигает необходимых весовых кондиций в более раннем возрасте. К 1,5-годовалому возрасту бычки большинства мясных пород достигают массы 500–600 кг. Животные мясных пород лучше усваивают корма, тратят меньшее их количество на единицу прироста живой массы, отличаются высоким качеством мяса и кожевенного сырья;

- крупный рогатый скот специализированных мясных пород хорошо акклиматизируется, отличается высокой резистентностью, вынослив, неприхотлив к условиям кормления и содержания. Он хорошо использует в летнее время естественные кормовые угодья и пастбища, а зимой грубые корма с высоким содержанием клетчатки при небольшом потреблении концентратов. В рационы мясных коров можно включать значительно меньшее количество сочных и концентрированных кормов, что связано с низкой молочностью мясного скота;

- содержание мясного скота не требует капитальных помещений как в летний, так и в зимний периоды. Даже в зимнее время года мясной скот чувствует себя достаточно комфортно под трехстенными навесами или в помещениях облегченного типа (дощаниках). К началу зимы животные специализированных пород обрастают длинным волосным покровом, накапливают достаточно толстый слой подкожного жира, что позволяет им хорошо переносить холода (рис. 12).



Рис. 12. Содержание мясного скота

- на обслуживание мясного скота требуется значительно меньше трудовых ресурсов, чем в молочном скотоводстве. Это связано с тем, что мясных коров не нужно доить. Снижаются трудовые затраты по уходу за телятами, так как они до 6–8-месячного возраста находятся на подсосе;

- ведение мясного скотоводства возможно во всех зонах республики, даже в малонаселенных районах с неразвитой сетью автомобильных дорог, так как данная отрасль малозависима от близости транспортных магистралей и пунктов сбыта продукции. Однако одним из обязательных условий развития данной отрасли является наличие достаточного количества площадей естественных или искусственных кормовых угодий, травостой которых в летне-пастбищный период является для мясных животных основным кормом.

Мясной скот отличается высокими продуктивными качествами, и задачей будущего хозяина является не только создание условий для его содержания, но и правильный выбор породы.

Герефордская порода. Создана в Великобритании. По численности поголовья среди мясных пород занимает первое место в мире (рис. 13).

Для животных этой породы характерна крепкая конституция, гармоничное телосложение, хорошо выраженные мясные формы. У них небольшая широкая голова, короткая шея, широкая холка, спина и поясница, хорошо выраженные окорока, короткие прочные конечности, туловище бочкообразное. Животные приземистые, некрупные. Масть красная с разными оттенками, голова, холка, подгрудок, брюхо, нижняя часть ног и метелка хвоста белые, носовое зеркало розовое.

Герефордский скот обладает хорошей приспособленностью к различным природным и кормовым условиям, эффективно перерабатывает грубые и пастбищные корма в мясо при ограниченном использовании концентратов, устойчив к туберкулезу и ряду других заболеваний.



Рис. 13. Корова герефордской породы

Живая масса новорожденных бычков составляет 32–35 кг, телочек – 28–32 кг, в полуторалетнем возрасте – соответственно 430–480 и 350–400 кг, взрослых быков – 850–1000 кг, коров – 520–580 кг. Среднесуточный приrost телят на подсосе равен 900–1000 г, живая масса к отъему в возрасте 8 мес – 257–278 кг, живая масса к концу откорма в возрасте 16–17 мес – 510–540 кг. Убойный выход достигает 60–62 %. Молочность коров невысокая – 1 200–1 600 кг, жирность молока – 3,9–4,0 %.

Шароле́зская порода – одна из самых крупных среди всех мясных пород скота. Животные породы шароле белой, иногда с кремовым оттенком масти, без пятен. Голова небольшая, короткая и широкая, туловище длинное, глубокое, спина мускулистая, поясничная часть большая, крестец широкий, окорока хорошо развиты. Костяк грубоват (рис. 14).

Молодняк отличается от других пород исключительной способностью к продолжительному интенсивному росту и наращиванию мускулатуры без значительных отложений жира.



Рис. 14. Корова шароле́зской породы

Взрослые коровы в племенных стадах Франции – месте создания породы – в среднем имеют живую массу 700–800 кг, быки-производители – 1000–1200 кг. Лучшие животные достигают массы: быки – 1400–1500 кг, коровы – 1000–1100 кг, бычки в возрасте одного года – 400–450 кг.

Скот породы шароле был завезен в Беларусь из Франции в 1978–1979 гг. За это время он хорошо адаптировался. Если сразу были нарекания на трудные отелы, то сейчас они встречаются с частотой на уровне черно-пестрой породы. В условиях племязавода «Дружба» Кобринского района Беларуси живая масса новорожденных телят составляет 36–44 кг, взрослых коров – 650 кг. Выход молодняка на 100 маток – 86–92 %. Сохранность телят до отъема в 7–8-месячном возрасте – 88–90 %, а живая масса их в этом возрасте достигает 260–280 кг. Среднесуточные приросты бычков с 8-

до 15-месячного возраста – 1100–1200 г, на заключительном откорме – 1300–1400 г. К 15-месячному возрасту они достигают живой массы 460–470 кг. Убойный выход – 60–61 %, содержание в тушах мяса – 80–81 %, на 1 кг костей приходится до 6 кг мяса. Это очень хорошие показатели. Содержание в мясе жира составляет 8–11 %, протеина – 19–20 %. Мясо характеризуется высокими вкусовыми качествами.

Абердин-ангусская порода. Выведена в Шотландии в конце XVIII в. путем улучшения местного черного комолого скота (рис. 15).



Рис. 15. Корова абердин-ангусской породы

Животные ярко выраженного мясного типа. Характеризуются крепкой конституцией, тонким, но крепким костяком, хорошо развитой мускулатурой. Масть черная, без отметин. Основным экстерьерным признаком породы является комолость.

Среди английских мясных пород абердин-ангусы выделяются исключительно высокими мясными качествами. Живая масса взрослых коров достигает 500–550 кг, быков-производителей – 750–900 кг, телят при рождении – 22–28 кг. Низкая живая масса телят при рождении позволяет широко использовать данную породу для промышленного скрещивания с молочным скотом.

Порода отличается высокой скороспелостью. При интенсивном выращивании и откорме бычки-кастраты достигают к 15–16-месячному возрасту живой массы 450–460 кг. Убойный выход составляет 63–65 %. Молочная продуктивность коров достаточно высокая – около 1400 кг, жирность молока – 4 %.

Лимузинская порода создавалась на западе центрального района Франции в провинции Лимузин. Ей свыше 150 лет. Масть скота красная, от светлых тонов до темных. Вокруг носового зеркала и глаз волос светлый, в виде колец. Строение туловища гармоничное, с хорошо выраженными мясными формами. Животные этой породы ценятся за неприхотливость, выносливость, хорошее использование пастбищ, высокую плодовитость, превосходное качество туш и мяса (рис. 16).



Рис. 16. Корова лимузинской породы

Во Франции масса новорожденных бычков составляет 36–42 кг, телочек – 34–38 кг, быков-производителей – 1000–1150 кг, коров – 580–640 кг. Живая масса бычков к отъему в 7–8-месячном возрасте – 260–300 кг, телочек – 240–260 кг. Завезена порода одновременно с шароле-ской. В условиях племязавода «Приозерный» Барановичского района живая масса коров составляет 550–580 кг, новорожденных телят – 32–40 кг. Выход телят – 90–95 %. Живая масса телят к отъему в 7–8 мес – 220–240 кг. Среднесуточный прирост бычков с 8- до 15-месячного возраста составляет 1050–1100 г, а живая масса в 15 мес достигает 430–440 кг. На заключительном откорме приросты составляют 1100–1300 г. Уступая породе шароле по энергии роста, молодняк лимузинской породы имеет преимуще-

ства по убойным и мясным качествам. Убойный выход лимузинских бычков – 63–64 %. Содержание мяса в туше – 82–83 %. На 1 кг костей приходится до 6,5 кг мякоти. Содержание жира в мясе – 7–10 %, протеина – 19–20 %. Животные лимузинской породы по численности занимают второе место во Франции, успешно конкурируя с шаролеизской по распространению в мире. Обе породы широко используются в скрещиваниях с молочным скотом и при создании новых пород мясного скота.

9.

Организовать ферму по содержанию мясного скота в хозяйстве можно двумя способами: за счет покупки чистопородных животных специализированных мясных пород с их дальнейшим чистопородным разведением, а также на основе межпородного скрещивания коров молочных или комбинированных пород с быками-производителями специализированных мясных пород.

Учитывая ограниченные финансовые возможности хозяйств, наиболее быстрым и сравнительно дешевым способом создания стада мясного скота является второй из предложенных. Именно на нем мы и остановимся более подробно.

На начальном этапе создания стада мясного скота в хозяйстве необходимо внедрить строго контролируемую систему скрещивания пригодных к воспроизводству коров молочных или комбинированных пород, разводимых в хозяйстве, с быками мясных пород для получения помесей первого поколения. Именно из них впоследствии и формируют маточное стадо, которое используют для дальнейшего скрещивания с быками-производителями выбранной для разведения специализированной мясной породы до получения помесей желаемого типа по улучшающей породе (рис. 17).

К выбору мясной отцовской породы следует подходить дифференцированно, при этом обязательно необходимо учитывать весовые кондиции маточного поголовья, имеющегося в хозяйстве, возможности кормовой базы, особенности содержания скота в хозяйстве. Беларусь располагает определенной племенной базой мясных пород скота. Племенная база специализированных мясных пород в республике имеется на предприятиях РУСП «Племенной завод «Дружба» Кобринского района, РУСП «Приозерный» птицефабрики «Дружба» Барановичского района, ЧУАП «Молодово-Агро» и СПК «Достоево-Агро» Ивановского района, КСУП «Комаринский» Брагинского района. Помимо этого областные госплемпредприятия республики имеют достаточные запасы спермопродукции от быков различных специализированных мясных пород.

При разведении скота специализированных мясных пород необходимо знать, что белковый обмен в организме животных герефордской и абердин-ангусской пород преобладает над другими обменными процессами до 12–14-месячного возраста, поэтому они способны наращивать мышечную массу только до 14-месячного возраста, при более продолжительном откорме их в туше накапливаются избыточные жировые отложения. Животные французских пород (лимузинская, шаролеизская, мен-анжуйская) более позднеспелы,




Рис. 17. Схема получения животных желаемого типа

и в связи с этой особенностью они могут наращивать мышечную массу гораздо более продолжительный период, до 25–30-месячного возраста. Для животных этих пород характерна исключительно высокая скорость роста на протяжении длительного периода при сравнительно небольших затратах кормов на единицу прироста живой массы, они дают туши с небольшим отложением жира и пригодны к убою в более старшем возрасте в сравнении с породами английского происхождения.

Ведение мясного скотоводства должно основываться на применении ресурсосберегающих способов содержания и малоэнергозатратных технологий с использованием помещений упрощенной дешевой конструкции зимой и огороженных пастбищ в летний период. В хозяйстве необходимо постоянно поддерживать на высоком уровне воспроизводительную способность маточного поголовья, своевременно выбраковывать из основного стада коров, остающихся яловыми. Выход телят в расчете на 100 коров в стаде должен быть не ниже 90–95 %. В хозяйстве необходимо практиковать только сезонные отелы, обеспечивающие максимально продолжительное выращивание молодняка на дешевых пастбищных кормах. Продолжительность подсосного выращивания молодняка должна составлять не менее 6–8 мес с последующим его интенсивным доращиванием и откормом. В хозяйстве необходимо по возможности максимально использовать грубые и сочные растительные корма зимой, травостой пастбищ летом при минимальном количестве концентратов в рационе.

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКИХ (КРЕСТЬЯНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

1. Биологические особенности свиней.
2. Основные производственные группы свиней.
3. Особенности воспроизводства стада, комплектование поголовьем, выращивание свиней на малых фермах.
4. Породы свиней.
5. Системы производства поросят и особенности технологии производства свинины на малых фермах.
6. Проектные предложения и параметры объемно-планировочных решений малых ферм по производству свинины.

1.

Свиньи быстро адаптируются к изменяющимся факторам внешней среды. Их можно разводить в различных климатических и хозяйственно-технологических условиях.

Свиньи характеризуются полициклическостью, высокими многоплодием и плодовитостью, хорошей молочностью, коротким периодом супоросности и лактации, скороспелостью, высоким убойным выходом, хорошей оплатой корма продукцией, высокой продуктивностью, полноценностью свинины, всеядностью и широкими адаптационными возможностями.

Свиньи – полицикличные животные. Через каждые 18–21 день свиноматки приходят в охоту, могут быть оплодотворены и давать приплод в любое время года.

Многоплодие свиноматок, выражающееся в количестве живых поросят при рождении в гнезде, может колебаться в широких пределах. Свиноматки пород, разводимых в хозяйствах Беларуси, дают по 10–14 поросят за опорос. Иногда свиноматки белорусской крупной белой породы приносят более 30 поросят. Этот показатель бывает наиболее высоким до 4–5-го опороса, а затем снижается. Считается, что в гнезде свиноматок на долю родившихся поросят приходится 50–60 % созревших яйцеклеток. Это в значительной степени определяется полноценностью кормления, особенностями содержания, методами разведения, породными и индивидуальными особенностями свиней. Изучение влияния этих факторов на многоплодие имеет значение в связи с тем, что с увеличением выхода поросят от 6 до 10 на один опорос затраты средств и труда в расчете на одного поросенка снижаются в 1,5 раза. При дальнейшем увеличении многоплодия до 18–20 поросят получение 1 т свинины ускоряется в 1,6 раза, а себестоимость выращивания поросенка снижается на 48 %.

У свиней очень короткий период беременности (супоросности), продолжающийся до 102–128 суток, в среднем – 114 (как обычно говорят, 3 месяца 3 недели и 3 дня) и период лактации (или подсоса) – 26–60 суток. Это позволяет получать в год от каждой свиноматки два опороса, а плодовитость ее составляет 25–30 поросят. В странах с развитым свиноводством известна рекордная плодовитость свиней. В Венгрии одна свиноматка за 22 года жизни поросилась 46 раз, и от нее было получено 416 поросят. Приведенные данные свидетельствуют о далеко еще не использованных потенциальных возможностях свиноводства для увеличения производства мяса.

Важным показателем продуктивности подсосных свиноматок является молочность, от которой в значительной степени зависит продуктивность молодняка. У свиней вымя не имеет молочных цистерн в отличие от вымени коров, овец и лошадей. Свиное молоко по общей и белковой питательности превосходит коровье в 1,5–1,8 раза. В среднем за лактацию (60 дней) свиноматки выделяют 200–250 кг молока, а лучшие – до 400. В производственных условиях из-за особенностей образования и выделения молока трудно получить данные о фактическом его количестве, поэтому молочность определяют путем взвешивания в трехнедельном возрасте всех поросят, которых кормила свиноматка. В среднем этот показатель составляет 40–55 кг. Для представления о сумме продуцированного свиноматкой молока необходимо массу гнезда в 21-дневном возрасте умножить на коэффициент 3,5 (количество молока, необходимое для образования 1 кг живой массы приплода).

У свиней в отличие от других сельскохозяйственных животных выделяют три видовые особенности роста: низкая скорость роста до рождения и высокая после рождения, высокая интенсивность роста, сочетание большой продолжительности роста с высокой ее интенсивностью в период после рождения. Новорожденные поросята имеют живую массу в среднем 1,2–1,4 кг.

Благодаря высокой энергии роста животные за 1,5–2 года достигают живой массы 200–250 кг, а нередко – 400–500 кг.

Скороспелость характеризует возможность животных в короткий срок достигать необходимого развития, позволяющего их раньше использовать для воспроизводства полноценного потомства или для получения высококачественной свинины. У свиней в возрасте 5–6 месяцев наступает половая зрелость, а в 8–9-месячном возрасте их можно использовать для осеменения, т. е. к годовалому возрасту свинки могут принести первый приплод. Весовая скороспелость или возраст достижения живой массы 100 кг при сбалансированном кормлении у свиней районированных в хозяйствах Беларуси пород и типов составляет 160–200 дней при среднесуточных приростах живой массы на откорме 700–900 г. Наивысший зафиксированный среднесуточный прирост живой массы у свиней составляет более 1400 г.

Свиньи имеют высокий убойный выход продукции. Так, при беконном и мясном откорме молодняка до живой массы 100–120 кг убойный выход составляет 70–75 %, а при откорме до жирных кондиций (до 130–150 кг) – 80 % и выше. Высока калорийность и биологическая полноценность свиного мяса и сала. Так, в 1 кг мяса животных средней упитанности содержится около 3000 ккал, жирной – 4060 ккал, в 1 кг сала – более 8000 ккал. В свинине содержатся белки и жиры, экстрактивные и минеральные вещества, витамины и ферменты. Переваримость свиного мяса в организме человека составляет около 90–95 %, жира – 97–98 %.

Свиноводство является одной из главных отраслей. Кроме знаний биологии и физиологии свиней важно уметь кормить, содержать, в максимальной степени использовать наследственную способность эффективно превращать корма в продукты питания.

Весьма ценной особенностью свиней является их всеядность. Для кормления этих животных можно использовать самые разнообразные корма растительного и животного происхождения, как концентрированные, так и объемистые, сочные, пищевые остатки кухонь и столовых, различные отходы мясной, рыбной и пищевой промышленности.

Основное условие успешного выращивания свиней – составление биологически полноценного рациона (набор или количественное соотношение кормов), который обеспечивает животных всеми необходимыми питательными и биологическими веществами). Для каждой возрастной группы нормируется общая (энергетическая) потребность в корме, а также определяется количество переваримого протеина и содержащихся в нем аминокислот, количество минеральных веществ и витаминов. Корма состоят из углеводов, белков, жиров, имеющих разную энергетическую ценность. Поэтому общий уровень питания, выраженный в кормовых единицах, отражает наличие комплекса питательных веществ. В одной овсяной кормовой единице содержится 3000 килокалорий переваримой энергии. Так как в процессе жизнедеятельности теряется (выделяется) около 25 % энергии, в распоряжении организма от каждой кормовой единицы остается 2256 килокалорий обменной энергии, которая используется для роста и развития. При нормировании общего питания свиней в энергетических кормовых единицах важно помнить, что такая

единица содержит 2500 килокалорий обменной энергии. Весь комплекс азотистых веществ, входящий в состав кормов, называется протеином. Наибольшую долю группы протеинов составляют белки, содержащиеся во всех живых клетках. Протеин корма в пищеварительном тракте расщепляется до аминокислот и используется для синтеза белков животного. Этот синтез происходит лишь при наличии определенных аминокислот в соответствующем соотношении. Из наиболее распространенных 22 аминокислот обязательно должны поступать десять незаменимых: лизин, метионин, триптофан, аргинин, цистизин, лейтин, цистин, фенилаланин, треонин, валин, первые три из которых являются лимитирующими в питании свиней.

Рацион считают сбалансированным, если он полностью обеспечивает потребность животных в сухом веществе, энергии, переваримом протеине, аминокислотах, витаминных, минеральных и прочих веществах. Рацион считается несбалансированным, если в нем недостает хотя бы одного из указанных веществ. Важно не только достаточное их количество, но и правильное сочетание. Это достигается правильным сочетанием отдельных или групп кормов, т. е. правильным составом рациона.

Для удобства корма разделяют на две группы – растительного и животного происхождения. Корма растительного происхождения разделяют на следующие группы: зеленые – трава пастбищ и подножные; грубые – сено, сенная и травяная мука; сочные – корнеплоды, бахчевые, силос, зерно и семена; остатки технических производств – отруби, мука, жмыхи, шроты.

Кроме такой классификации, растительные корма разделяют на концентрированные и объемистые. В 1 кг концентрированных кормов содержится не менее 0,5 кг переваримых питательных веществ (0,65 к. ед.) и не более 19 % клетчатки или 40 % воды. Объемистые корма (грубые и сочные) – это такие корма, в которых мало (не более 0,5 кг) переваримых питательных веществ и много воды или клетчатки. В 1 кг объемистых кормов содержится не более 0,65 к. ед.

К кормам животного происхождения относятся молотые отходы: кровавая, мясная, мясокостная, рыбная мука, которые являются превосходным источником полноценного протеина.

Смесь кормовых средств подбирается с таким расчетом, чтобы недостаток аминокислот, минеральных веществ, витаминов в одном корме восполнялся за счет наличия их в других кормах – комбикормах. Большинство комбикормов обогащают различными питательными и биологически активными веществами. Эти микродобавки вводят в виде премиксов – смесь биологически активных веществ с наполнителем – в количестве 0,5–1,0 % от массы.

По сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных свиньи значительно меньше расходуют корма на единицу прироста продукции. При интенсивном откорме на 1 кг прироста живой массы затрачивается всего 4,0–4,5 к. ед. Часто затраты на 1 кг прироста живой массы не превышают 2,6–3,0 к. ед. У свиней высокий коэффициент полезного использования корма, т. е. той части, которая идет непосредственно на продукцию и под-

держание жизнедеятельности организма. Они используют на образование мяса 33 % поглощаемого корма.

2.

Успешное ведение фермером отрасли свиноводства во многом определяется правильной технологией воспроизводства стада свиней. В технологию этого процесса входит комплекс организационно-зоотехнических процессов по правильной организации кормления, ухода и содержания производителей и свиноматок, организация и проведение осеменения свиноматок, контроль за физиологическим состоянием маток и хряков, планирование и проведение опоросов, выращивание поросят.

В зависимости от типа хозяйства животные одного возраста, пола, физиологического состояния и производственного назначения объединяются в производственные группы: хряки-производители, проверяемые хряки, основные и проверяемые свиноматки, молодняк на доращивании и откорме.

Хряки-производители (основные хряки) – взрослые животные стада, полученные от высокопродуктивных родителей, проверенных по качеству потомства. Имеют крепкую конституцию, хорошо выраженную высокую половую активность и продуктивность. Они содержатся во всех племенных и репродукторных хозяйствах.

Проверяемые хряки – животные, содержащиеся в группе от времени первой случки до окончания их оценки (по массе поросят в 2- или 4-месячном возрасте). После оценки животных либо переводят в основное стадо, либо выбраковывают.

Хряки-пробники – молодые, не представляющие племенной ценности самцы, используемые для половой стимуляции и выявления свиноматок в охоте.

Основные матки – это лучшая часть животных маточного стада, проверенных по результатам предыдущих опоросов. Животные должны быть здоровыми, иметь крепкую конституцию и хорошие материнские качества.

Проверяемые матки – это свинки от времени установления первой супоросности до отъема поросят первого опороса. Лучшие проверяемые матки, отобранные от высокопродуктивных родителей, имеющие после первого опороса к отъему не менее девяти здоровых, крепких поросят (при 90–95 % сохранности), живую массу гнезда на 21-й день не менее 48, а в 2 месяца не менее 160 кг, переводятся в основное стадо. Все низкопродуктивные матки после отъема поросят выбраковываются из стада и поступают на откорм. Иногда встречается понятие «разовые матки», т. е. животные, выделенные из группы откармливаемого молодняка и использованные для получения поросят. Это мероприятие экономически не выгодно, а для практически вредно.

В зависимости от физиологического состояния и особенностей содержания матки подразделяются на следующие технологические группы:

- 1) холостые или подготавливаемые к осеменению;
- 2) условно-супоросные или с неустановленной супоросностью;
- 3) с установленной супоросностью;
- 4) заключительного периода супоросности;

5) подсосные.

Группа холостых маток формируется:

- 1) из ремонтных свинок 8–9-месячного возраста;
- 2) подсосных маток после отъема поросят;
- 3) маток после неплототворного первого осеменения, подлежащих осеменению.

В группе условно-супоросных маток находятся осемененные животные в течение 28–32 дней до установления оплодотворения. Если после этого матки не реагируют на хряка-пробника, то они переводятся в группу животных с установленной супоросностью. Наиболее целесообразная продолжительность их пребывания в этой группе – до 108-го дня супоросности, а за 6–7 дней до опороса они помещаются в маточники.

Подсосные свиноматки – матки с поросятами со дня опороса до отъема поросят.

В хозяйствах с законченным циклом производства, кроме маток и хряков, содержатся поросята-сосуны, отъемыши, ремонтный и откормочный молодняк.

Молодняк, находящийся вместе с подсосными матками со дня рождения и до отъема, относится к группе поросят-сосунов.

Группа поросят-отъемышей состоит из отнятого от матерей молодняка в возрасте от 26–60 до 106–120 дней (до перевода в группу ремонтного молодняка или откорма). В практике иногда эту группу называют группой доращивания или группой поросят в возрасте 2–4 мес.

Ремонтные хрячки или свинки – молодняк от отбора на выращивание до первой случки или установления первой супоросности, предназначенный для замены выбракованных взрослых животных основного стада. Возраст ремонтного молодняка колеблется от 3,5–4 до 8–12 мес.

К группе откорма относят весь товарный молодняк с 3,5–4 до 7–8-месячного возраста (до сдачи на мясокомбинат). Кроме того, здесь находятся выбракованные взрослые животные.

3.

В работе по комплектованию стада на свиноферме главной задачей является повышение скороспелости, снижение затрат кормов на единицу продукции, улучшение мясных качеств на откорме. Достижение высоких показателей по этим признакам должно базироваться на интенсификации использования племенной базы ремонта, повышения эффективности селекционного процесса, совершенствовании существующих и создании новых заводских типов пород свиней, широком использовании эффекта гетерозиса.

Основное внимание нужно уделять созданию высокопродуктивного маточного стада по многоплодию, крупноплодности, молочности свиноматок, жизнеспособности потомства, повышению интенсивности использования маток путем создания улучшенных условий кормления и содержания. Маточное стадо следует комплектовать свинками, приобретенными из племенных заводов и племенных ферм и частично за счет ремонтных свинок, выращенных в своем хозяйстве.

Лучшие проверяемые матки в стаде, давшие в первом опоросе 10–12 поросят и имеющие молочность не ниже 50 кг, оставляются и переводятся в группу основных свиноматок.

Лучшие опоросы по количеству и качеству приплода получают от свиноматок в период от 2 до 4 лет их жизни. В связи с этим следует использовать маток до 5–6 опоросов.

Соотношение основных и проверяемых свиноматок должно быть 1:1. На одну проверяемую следует отбирать 1,5–2 ремонтные свинки.

Маточное стадо должно быть укомплектовано свиноматками разного возраста в оптимальных соотношениях. До 2 лет – 25 %, от 2 до 3 лет – 55 %, от 3 лет и старше – 20 %. В течение года от каждой основной свиноматки должно быть получено не менее 1,8–2 опоросов, а на среднегодовую свиноматку – не менее 18 поросят.

Хряки-производители должны завозиться только из племенных предприятий.

Если фермер собирается заниматься производством поросят для племенных целей, необходимо работать с одной какой-либо породой – материнской или отцовской, применяя чистопородное разведение, не допуская близкородственного спаривания. При производстве поросят для откорма лучше прибегать к скрещиванию материнской породы свиней с отцовской или применять гибридизацию.

При выборе породы для разведения и выращивания в фермерском хозяйстве следует отдавать предпочтение тем, которые разводятся в данной зоне и наиболее приспособлены к местным климатическим условиям и кормам.

Привезенные из других зон свиньи будут чувствовать себя угнетенно, а это ведет к снижению продуктивности. Для выращивания на племя желательны свинки универсального направления продуктивности, которых в дальнейшем покрывают хряками специализированных мясных пород для получения потомства мясного типа. Откармливать выгодно не чистопородный, а помесный молодняк, полученный от спаривания хряков и маток разных пород, типов и линий.

Для ремонта стада отбирают поросят, в родословной которых были предки с высокими продуктивными качествами. Но даже «породистые» поросята значительно отличаются друг от друга. В связи с этим большое внимание следует уделять внешнему виду (конституция, экстерьер) и поведению животного. При внимательном осмотре можно определить состояние здоровья животного, его нрав (темперамент), способность к воспроизводству или откорму и качество будущей продукции.

Осмотр поросенка обычно начинают с оценки его внешнего вида и поведения. Поросенок должен быть подвижным, энергичным, быстро реагировать на окружающую обстановку, но не пугливым. Телосложение должно быть типичным для данной породы. У здоровых поросят хвостик (свиноводы называют его барометром настроения) обязательно загнут кверху веселым колечком. Если хвост вялый, свешивается вниз, то это свидетельствует о слабом здоровье. Кожа должна быть гладкой, мягкой, блестящей. Пятачок, сли-

зистая ротовой полости и глаз (а у белых поросят и вся кожа) должны иметь розовый цвет. Бледность и тем более синюшность пяточка и слизистых оболочек, а также тусклая взъерошенная щетина свидетельствуют о нездоровье, малокровии животного.

После общего осмотра обращают внимание на отдельные стати тела.

Наиболее желательны для воспроизводства и откорма животные, которые имеют нормально (средне) развитые стати: средней величины голову с умеренно вогнутым профилем, правильный прикус (хорошее смыкание верхней и нижней челюстей), длинное, особенно в средней части, умеренно широкое, глубокое туловище, прямую, слегка аркообразную спину, хорошо выполненные окорока, средней длины, крепкие, прямые, широко расставленные ноги и нормальную оброслость щетиной.

Большое внимание при выборе свинок и хрячков на племя следует также уделять количеству и качеству сосков. Должно быть не менее шести пар хорошо развитых, правильно расположенных сосков. Нельзя брать молодняк с вдавленными или «кратерными» сосками. Из таких сосков поросята не могут сосать молоко. У хрячков должны быть хорошо развитые, одинаковые по величине семенники, упругая и неотвислая мошонка. Еще до рождения семенники опускаются из брюшной полости через паховый канал в мошонку. Если они не выходят в мошонку, развивается так называемый крипторхизм. Образование спермы у крипторхов нарушается, так как температура в брюшной полости на 2–3 градуса выше, чем в мошонке, и такие самцы не способны к воспроизводству.

Отдельные стати свидетельствуют о позднеспелости животного: большая, длинная и узкая голова с прямым профилем, короткое горбатое туловище со спущенным крестцом, длинные узкопоставленные ноги, густая длинная щетина. Такие свиньи, хотя и выносливы, но малопродуктивны, плохо откармливаются, медленно растут. Их мясо бывает сухим, жестким.

Другие стати свидетельствуют об изнеженности животного, высокой требовательности к условиям кормления и содержания, а иногда и пониженной плодовитости: очень короткая, широкая и мопсовидная (курносая) голова, широкое длинное туловище, короткие, широко расставленные ноги, короткая редкая щетина. Такие свиньи обладают очень высокой скороспелостью, быстро растут, хорошо оплачивают корм приростом. Их мясо и сало сочные, но несколько водянистые и менее вкусные. Они быстро осаливаются и дают при убое большой выход подкожного и внутреннего жира.

Большими пороками экстерьера считают косолапость и иксообразность передних, саблистость задних ног, мягкие проступающие бабки, перехват за лопатками, провислые поясницу и спину, свислый, короткий, узкий крестец, «срезанные», слабовыполненные окорока, отвисшее брюхо. Эти недостатки свидетельствуют о слабости костяка, связок и конституции вообще, а следовательно, и здоровья. Не следует отбирать больных и травмированных животных.

4.

Животные **белорусской крупной белой породы** крепкой конституции. Голова средней величины, рыло умеренной длины, слегка вогнутое, уши небольшие, не нависающие на глаза, направлены вперед и вверх; туловище средней длины или длинное; грудь широкая и глубокая; поясница и крестец прямые и мясистые; окорока округлые, большие; ноги средней длины, крепкие, правильно поставленные; кожа плотная, эластичная, без складок; щетина густая, тонкая; масть белая, допускаются темные пятна на коже, покрытые белой щетиной. Живая масса взрослых хряков – 310–350 кг, свиноматок – 230–260 кг, длина туловища – 182–185 и 165–167 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 11,2 поросенка, молочность – 55 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 190 кг. Свиньи достигают живой массы 100 кг в 175 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 3,8 к. ед., толщина шпика – 28 мм, длина туши – 95 см, масса окорока – 10,5 кг. Свиньи белорусской крупной белой породы отличаются от крупной белой породы лучшей приспособленностью к условиям Беларуси и лучшей мясностью. Ведущие племенные заводы – ОАО «Западный» Брестского района, филиал «СПЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» Оршанского района, ОАО «Василишки» Щучинского района и др.

Свиньи **белорусской черно-пестрой породы** имеют крепкую конституцию. Голова облегченная, с прямым профилем и слегка нависающими ушами; туловище достаточно длинное и глубокое; спина прямая и широкая; окорока умеренно развитые; ноги прямые, правильно поставленные; масть черно-пестрая. Живая масса взрослых хряков – 300–360 кг, свиноматок – 220–260 кг, длина туловища – 170–184 и 155–165 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 10,3 поросенка, молочность – 54 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 180 кг. Скороспелость молодняка – 180 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 3,54 к. ед., толщина шпика – 28–30 мм, длина туши – 95 см, масса окорока – 10,6 кг. Животные отличаются повышенной устойчивостью к заболеваниям и стрессам. Порода районирована во всех областях Беларуси и используется в качестве отцовской и материнской форм в системах скрещивания и гибридизации. Ведущие племенные заводы – ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района, ОАО «СПЦ Заречье» Рогачевского района.

Животные **белорусской мясной породы** крепкой конституции. Голова небольшая с прямым профилем и полусвислыми ушами средней длины; туловище удлинненное, относительно широкое с прямой линией спины и крестца; окорока хорошо выполнены; ноги крепкие с прочными копытами, масть белая. Живая масса взрослых хряков – 310–360 кг, свиноматок – 240–270 кг, длина туловища – 180–190 и 165–170 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 10,9–12,2 поросенка, молочность – 49–58 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 160–177 кг, скороспелость животных – 182 дня, среднесуточный прирост молодняка – 757 г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,43 к. ед., длина туши – 99 см, толщина шпика – 25,7 мм, масса окорока – 11 кг, площадь «мышечного глазка» – 35,9 см², выход мяса при убое в 100 кг – 62 % при незначительном его изменении при убое в 120 и 140 кг, что

дает возможность откармливать свиней мясными до более высоких весовых кондиций. Базовые хозяйства – ОАО «Западный» Брестского района, филиал «СПЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» Оршанского района, ОАО «Василишки» Щучинского района и др. Животные используются в качестве отцовских и материнских форм в системах скрещивания и гибридизации. Селекционная работа с породой направлена на повышение мясных и откормочных качеств путем внутрипородной селекции и прилития крови зарубежных пород сходной модели и направления продуктивности.

Свиньи **эстонской беконной породы** имеют крепкую конституцию. Голова средней величины с прямым или вогнутым профилем; уши большие, направленные вперед, свисающие; туловище длинное; грудь широкая, глубокая; спина длинная, широкая; масть белая, кожа имеет розоватый оттенок, иногда с мелкими пигментными пятнами. Живая масса взрослых хряков – 320–350 кг, свиноматок – 220–240, длина туловища – 180–188 и 160–168 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 11,2 поросят, молочность – 56 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 176 кг. Возраст достижения подсосниками живой массы 100 кг – 180 дней, среднесуточный прирост – 734 г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,4 к. ед., толщина шпика – 25 мм, длина туши – 97 см, масса окорока – 10,5 кг. Разведение и совершенствование свиней эстонской беконной породы проводится в ОАО «СПЦ Заречье» Рогачевского района, в Эстонии – в племенных заводах «Лунгу», «Пяриведе» и др. Порода используется в системе скрещивания и гибридизации в качестве отцовской формы. Совершенствование свиней этой породы ведется по мясным и откормочным качествам.

Животные **породы ландрас** беконного направления продуктивности. Голова легкая, профиль почти прямой; уши тонкие, длинные, нависающие на глаза; туловище растянутое, достаточно широкое; плечи легкие; окорок широкий, но довольно плоский; ноги сухие, крепкие; кожа тонкая, эластичная, без складок; масть белая. По показателям развития и продуктивности существенно не отличаются от свиней крупной белой породы. Живая масса взрослых хряков – 290–310 кг, длина туловища – 185–190 см, свиноматок – 245–255 кг и 165–170 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 11,2 поросят, молочность – 57,8 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 180 кг.

Скороспелость животных – 185 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 3,9 к. ед., длина туши – 98 см, толщина шпика – 28 мм, масса окорока – 10,9 кг. Порода весьма распространена в мире. В Республике Беларусь разведение этой породы проводится в ОАО «Василишки» Щучинского района, КФХ «Тодрика Б.С.» Гродненского района и др. Животные требовательны к условиям кормления и содержания. Хряки породы ландрас широко используются для скрещивания в товарном свиноводстве и получения синтетических линий для создания пород и типов мясного направления.

Животные **породы дюрок** крепкой конституции. Голова широкая с легким изгибом профиля; кончики ушей имеют изгиб вперед и вниз; грудь широкая и глубокая; туловище длинное; спина аркообразная; окорока хорошо выполненные; ноги длинные с торцовой постановкой; масть красная с оттенками от темного до светло-красного и золотисто-рыжего. Животные от-

личаются спокойным нравом, высокими мясными и откормочными качествами. Живая масса взрослых хряков – 340–430 кг, свиноматок – 250–330 кг, длина туловища хряков – 170–185 см, свиноматок – 170–180 см. Многоплодие свиноматок – 9,5 поросят, молочность – 44–50 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 160–170 кг. Скороспелость – 184 дня, среднесуточный прирост молодняка – 753 г, расход кормов на 1 кг прироста – 3,5 корм. ед., толщина шпика – 22–25 мм, площадь «мышечного глазка» – 39–40 см², содержание мяса в туше – 62–65 %. В Беларусь завезена в 1987 г. из Чехословакии. Используется для скрещивания с породами, районированными в республике, а также для разведения в чистоте. Разводят свиней породы дюрок в ОАО «Западный» Брестского района, филиале «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» Оршанского района, ОАО «Василишки» Щучинского района и других хозяйствах. Проводится работа по акклиматизации животных этой породы в Республике Беларусь, повышению их репродуктивных качеств.

Животные **породы пьетрен** имеют прекрасные мясные формы и пышное развитие мускулатуры. Туловище у них компактное, широкое, цилиндрической формы, на коротких ногах; голова легкая, с прямым профилем; уши короткие, направлены почти горизонтально; грудь широкая, но не очень глубокая; спина широкая, мускулатура вдоль хребта образует желоб; бока округлые, ребра круто изогнутые; окорока хорошо выполненные, спускающиеся до скакательного сустава; ноги укороченные, постановка конечностей правильная; кожа довольно толстая, без черных пятен; щетина жесткая и короткая, цвет щетины бело-сероватый с темными пятнами неправильной формы. Живая масса взрослых хряков – 240–260 кг, свиноматок – 200–220 кг, многоплодие свиноматок – 8–10 поросят, молочность – 50 кг. Скороспелость животных – 200 дней при среднесуточных приростах 550–650 г и затратах корма 4,1 к. ед., выход постного мяса в туше – 67 %. В условиях Беларуси и России свиньи этой породы плохо акклиматизируются, поэтому разведение их ограничено. Предусмотренное использование животных породы пьетрен для скрещивания с крупными белыми и белорусскими черно-пестрыми свиньями для получения мясных типов и линий позволило повысить у помесей на 5–8 % выход мяса по сравнению с животными крупной белой и белорусской черно-пестрой пород. Сперму хряков можно приобрести в Брестском и Гродненском ЦСГЦ, а животных – на племенной ферме «Нуклеус» РСУП «Заречье» Смолевичского района.

Свиньи **белорусского заводского типа породы йоркшир «Днепробугский»** имеют крепкую конституцию, мясное направление продуктивности, хорошо адаптированы к условиям промышленной технологии. Голова средней величины с прямым профилем, со средними, стоячими, направленными вперед и вверх ушами; грудь широкая и глубокая; спина и поясница ровные и прямые; крестец широкий; окорока большие или средние, хорошо выполненные; ноги прямые, крепкие; масть белая. Живая масса взрослых хряков – 330–360 кг, свиноматок – 240–250 кг, длина туловища 180–185 и 167–172 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 11,8 поросят, молочность – 66 кг, скороспелость животных – 166 дней, среднесуточный при-

рост молодняка – 880 г, затраты корма на 1 кг прироста – 2,9–3,1 к. ед., длина туши – 99 см, толщина шпика – 18–22 мм, масса окорока – 11,2 кг, площадь «мышечного глазка» – 42–46 см², выход мяса в туше – 62–63 %. Базовые хозяйства – ОАО «Западный» Брестского района, филиал «СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский КХП» Оршанского района, ОАО «Василишки» Щучинского района и др. Используется в качестве отцовских и материнских форм в системах скрещивания и гибридизации.

5.

В настоящее время в зависимости от объема производства свинины, специализации хозяйств, наличия помещений, кормовой базы, рабочей силы и других причин применяются следующие основные приемы производства поросят: сезонная, круглогодовая и ритмичная. При этом опоросы свиноматок бывают туровыми и растянутыми. Наиболее прогрессивной является туровая система получения поросят. При этой системе свиновод обслуживает животных одинакового физиологического состояния, одновременно получает определенное количество поросят одного возраста для последующего откорма и реализации. Это облегчает труд, способствует созданию необходимых условий для получения поросят.

Сезонные опоросы применяются в тех случаях, когда хозяйство не располагает большим поголовьем свиноматок, специализированными свинарниками, оборудованными системами микроклимата для проведения опоросов и выращивания поросят-сосунов и отъемышей, не обеспечено постоянно достаточным количеством кормов для различных половозрастных групп и т. д. Туровая система воспроизводства в этом случае предусматривает получение поросят в наиболее благоприятные для выращивания или продажи населению сроки. Опоросы основных свиноматок обычно планируют на декабрь-январь, июль-август. Опоросы проверяемых и разовых маток проходят с мая по июнь, в основном в летних лагерях. При сезонных опоросах возможно раздельно-цеховое размещение животных с использованием помещений по принципу «пусто-занято», однако неинтенсивно используются свиноматки, свинарники-маточники, продукция производится неравномерно, свинару вынуждены одновременно или в разные периоды года обслуживать различные половозрастные группы свиней.

Равномерные круглогодовые опоросы организуются в хозяйствах, располагающих необходимыми производственными помещениями для проведения опоросов, выращивания поросят разного возраста и содержания остальных производственных групп свиней.

При круглогодовой непоточной системе матки поступают на осеменение и опорос бессистемно, разрозненно, по 1–2 гол. в день или через несколько дней. Такая система позволяет получать свинину равномерно в течение года с максимальным количеством опоросов, но исключает возможность раздельно-цехового размещения и обслуживания животных.

Частично объединяет преимущества круглогодовой непоточной и сезонно-туровой прерывно-поточная круглогодовая система производства поросят. При ней более интенсивно используются свиноматки, свинарники-

маточники, правильно используется рабочая сила, наиболее равномерно по периодам года получают поросят. Осеменение и опоросы маток происходят за 7–10 дней с перерывами 14–28 и более дней, т. е. в зависимости от продолжительности занятости свинарника-маточника.

Ритмичное, непрерывно-поточное или конвейерное производство поросят объединяет преимущества и исключает недостатки всех других систем воспроизводства. При этой системе можно четко планировать производство поросят и готовой продукции за строго определенные периоды. В течение года создаются благоприятные условия для правильного использования маточного поголовья, производственных помещений и рабочей силы. Опоросы и осеменение маток происходят непрерывно с 1-, 2- и 7-дневным ритмом.

Таким образом, с учетом наличия маточного стада, обеспеченности специализированными помещениями, кормами, рабочей силой фермер должен определиться в выборе системы производства поросят.

Планирование производства поросят даже при сезонной системе опоросов свиноматок должно основываться на правильном использовании маточного поголовья и производственных помещений. В зимних свинарниках-маточниках поросят только основные свиноматки, поэтому расчет основных свиноматок необходимо вести с учетом наличия свинарников-маточников. Опоросы проверяемых свиноматок нужно планировать только на весенне-летний период при условии содержания их в дешевых летних лагерях.

Например, в хозяйстве за год нужно получить 600 поросят при наличии 15 станко-мест для проведения опоросов в свинарниках-маточниках. Исходя из конкретных особенностей хозяйства устанавливается плановый выход поросят на один опорос основной и проверяемой свиноматки. Допустим, за опорос от основной свиноматки получают 10 поросят, а от проверяемой – 8. Одновременно в хозяйстве могут опороситься 15 основных свиноматок, и будет получено 150 поросят. Второй раз эти же свиноматки опоросятся через полгода (60 дней – период подсоса, 114 – период супоросности и 7 дней – период от отъема поросят до осеменения свиноматок) и принесут еще 150 поросят. При указанном количестве основных свиноматок и станко-мест в свинарниках-маточниках за год можно получить 300 поросят. Остальных поросят для выполнения плана можно получить от проверяемых свиноматок: $600 - 300 = 300$. Так как плановый выход поросят на опорос от проверяемых маток равен 8, поголовье проверяемых свиноматок составит 38 гол. Значит, в летнем лагере следует установить соответствующее количество станков для опоросов и содержания подсосных свиноматок с поросятами.

Но вычисленное поголовье основных и проверяемых маток является продуктивным, т. е. от него обязательно нужно получить поросят. Истинное поголовье основных и проверяемых свиноматок будет больше на планируемый процент прохолоста. Если последний составляет 20 %, то поголовье основных и проверяемых свиноматок должно также увеличиться на такую величину. Количество ремонтных свинок рассчитывают по поголовью проверяемых свиноматок. При отборе свинок после отъема поголовье их должно быть в 1,5–2 раза больше продуктивного поголовья проверяемых свиноматок.

Ко времени случки ремонтных свиноматок должно быть больше продуктивных проверяемых свиноматок на 20–30 %, т. е. на планируемый их проход.

Поголовье хряков-производителей устанавливают путем деления общего поголовья свиноматок на показатель нагрузки свиноматок на хряка в год. При сезонном производстве поросят и ручной случке нагрузка свиноматок на хряка составляет 15–25 гол. Соотношение основных и ремонтных хряков при указанной системе опоросов должно составлять от 1:0,5 до 1:1. Аналогично рассчитываются и другие производственные группы, потребность их в станках.

Производство свинины и организация труда на малой ферме с элементами промышленной технологии основаны на принципе «все свободно – все занято», круглогодичном равномерном циклическом производстве продукции.

При поточной системе объемы производства должны быть постоянными в течение всего периода эксплуатации предприятия. Основным показателем при расчете технологии при такой системе является мощность фермы, которая определяет потребность в различных половозрастных группах животных, а основной технологической и производственной единицей, определяющей цикличность процесса и получение определенного количества поросят, принимается группа подсосных свиноматок. Основные технологические параметры производства свинины определяются с учетом кормовой базы, наличия помещений, рабочей силы и т. д.

Потребность в поросятах для хозяйства рассчитывается по формуле

$$T = \frac{\left(\frac{П}{В} + Н\right) 100}{К},$$

где Т – потребность в поросятах для хозяйства, гол.;

П – план реализации свинины государству, ц;

В – живая масса одной головы при реализации, ц;

Н – количество поросят для внутрихозяйственных нужд, гол.;

К – сохранность поросят, %.

Потребность в основных свиноматках рассчитывают по формуле

$$A = \frac{T}{O \cdot C + C_1 \cdot Y},$$

где А – необходимое количество основных свиноматок, гол.;

О – количество опоросов от основной свиноматки в год, получаемое путем деления дней в году на репродуктивный период (продолжительность супоросного, подсосного периодов и времени от отъема поросят до очередной случки);

С – многоплодие основной матки, гол.;

С₁ – многоплодие проверяемой матки, гол.;

Y – количество проверяемых маток в расчете на одну основную, которое может колебаться от 0,8 до 2,5 гол.

Зная нужное количество основных свиноматок, по принятому соотношению находят количество проверяемых.

Потребность в ремонтных свинках должна составлять 150–200 % от числа проверяемых маток.

Потребность в хряках-производителях определяют исходя из общепринятых зоотехнических норм: один хряк на 15 основных и 20 проверяемых маток при естественной случке или на 100 маток при искусственном осеменении.

Ремонтных хряков оставляют из расчета 2–4 гол. на одного выбракованного из основного стада хряка.

Выход поросят в среднем на одну свиноматку за опорос находят путем деления всех поросят на общее число опоросов в году от основных и проверяемых свиноматок.

Для организации поточного производства свинины рассчитывают количество производственных циклов (время прохождения всего процесса производства свинины, включая случку, супоросность, опорос и подсосный период, холостой период маток, время на доращивание и откорм) в году путем деления количества всех опоросов от основных и проверяемых маток на размер групп подсосных свиноматок (исходя из наличия станко-мест в одной секции свинарника-маточника), а затем – шаг ритма (время, в течение которого формируется производственная группа случных маток одного производственного цикла, включая время санитарного периода) путем деления числа дней в году на количество циклов.

Зная размер группы подсосных маток, находят размер группы супоросных. Он должен быть больше размера группы подсосных на 10–15 %. Размер случной группы маток (условно-супоросных, у которых еще не установлено оплодотворение) должен быть больше супоросных на 20–25 %. Случная группа формируется из резервной (буферной) группы маток, в состав которой входят свиноматки после отъема поросят, аварийного опороса, прохолостевшие не выбракованные матки и ремонтные свинки, предназначенные для случки.

Размер резервной группы определяют по формуле

$$Б = \frac{21 \cdot X_A}{Ш},$$

где Б – резервная группа маток, гол.;

X_A – размер группы случных маток в одном цикле, гол.;

Ш – шаг ритма, дн.

Если шаг ритма более 15 дней, то время случки ограничивается 7–15 днями. В основное время делается пауза. Количество поросят на потоке в одном ритме определяют умножением подсосных маток на среднее многоплодие свиноматки.

Количество поросят-отъемышей и молодняка на откорме находят путем умножения их количества на коэффициент сохранности за минусом поголовья для внутривольевых нужд и переведенных в группу ремонта.

Взрослые свиноматки на откорме определяются согласно коэффициенту выбраковки. Вместо выбракованных вводится такое же количество молодых маток.

Выход продукции в одном ритме определяют путем умножения поголовья, снятого с откорма, на среднюю массу одной головы, а за год – путем умножения рассчитанного показателя на количество циклов в году.

Постоянное количество производственных групп на потоке рассчитывают путем деления времени пребывания животных в каждой из них на шаг ритма.

Время пребывания на потоке хряков-производителей составляет 365 дней, холостых свиноматок – 21, осемененных и легкосупоросных (условно-супоросных) – 25–32, с установленной супоросностью – 75–86, глубокосупоросных – 3–7, подсосных (в зависимости от времени отъема поросят) – 26–60 дней. Поросята-отъемыши находятся в группе на дорацивании со дня отъема до постановки на откорм (с 26–60 до 90–120 дней). Время пребывания молодняка на откорме определяется уровнем среднесуточных приростов и планируемой живой массы при снятии с откорма. Время пребывания взрослых свиней на откорме составляет 60 дней, ремонтного молодняка – 180 дней.

Постоянное поголовье хряков на ферме рассчитывают путем деления поголовья свиноматок на норму нагрузки. Это и будет среднегодовое поголовье хряков.

Среднегодовое поголовье остальных животных рассчитывают путем умножения найденного количества производственных групп на число животных в группе.

Расчет потребности в станко-местах, станках, секциях, помещениях проводится в зависимости от технологии содержания животных. Хряки-производители содержатся индивидуально или группами по 3–5 гол.; холостые матки – индивидуально или группами по 10–30 гол.; матки, пришедшие в охоту и после осеменения, в течение 2–32 дней – в индивидуальных станках; супоросные свиноматки – группами по 11–14 гол.; подсосные – в индивидуальных станках; поросята-отъемыши и откормочное поголовье – группами по 25–28 гол.

Хряков-производителей, холостых, условно-супоросных и супоросных маток можно содержать в одном помещении. Выделяются отдельные секции для содержания подсосных маток, поросят-отъемышей и откормочного поголовья. Одну секцию станков на потоке полностью занимают шаговой группой маток или молодняка. После освобождения секция в течение 2–7 дней подвергается уборке, чистке, дезинфекции, после чего ее снова заполняют очередной группой животных.

Для расчета потребности в секциях время ее занятости (время пребывания каждой производственной группы на потоке в секции и санитарного периода) делят на шаг ритма (в днях). Количество станко-мест для единовременного содержания шаговой группы на потоке рассчитывают путем умножения найденного количества секций на количество голов в одной секции. Для расчета потребности в помещениях делят потребность в станко-местах на вместимость одного помещения.

Пример годовой производственной программы фермы с элементами промышленной технологии представлен в табл. 3.

Таблица 3. Годовая производственная программа свиноводческой фермы

Показатели	Количество
Получить поросят за год, гол.	663
Передать на доращивание, гол.	583
Передать на откорм, гол.	548
Снять с откорма: гол.	537
живая масса, ц	580
Кроме того, сдать на мясо выбракованных: основных свиноматок: гол.	18
живая масса, ц	36
ремонтных и проверяемых свинок: гол.	18
живая масса, ц	18
Всего реализовать: гол.	573
живая масса, ц	634
Вырастить ремонтных свинок: гол.	36
живая масса, ц	36
Купить ремонтных хряков: гол.	8
живая масса, ц	6
Получить опоросов в год от одной свиноматки: основных	2
проверяемых	1
Получить поросят в среднем на 1 свиноматку за опорос, шт.	8,5
Среднесуточный прирост живой массы, г: подсосный период	270
период доращивания	480
период выращивания и откорма	700
Продолжительность периодов, дн.: подсосного	45
доращивания	112
выращивания и откорма	112
Среднегодовое поголовье – всего, гол.	504
В т. ч.: свиноматки	45
из них продуктивные	39
хряки-производители (спаривание естественное)	6
хряки ремонтные и проверяемые	3
поросята-сосуны	102
поросята на доращивании	180
выращивание ремонтного молодняка и откорм	168
Сохранность поголовья по периодам, %: подсосный	88
доращивания	94
выращивания ремонтного молодняка и откорма	98
Репродуктивный период свиноматки, дн.	181

Основной технологической и производственной единицей, определяющей получение определенного количества поросят и цикличность всего производственного процесса на этой ферме, принята группа из 6 подсосных свиноматок. Продолжительность цикла – 28 дней. За один цикл должно опороситься 6 свиноматок, получен 51 поросенок, из них 45 гол. в возрасте 45 дней и живой массой одной головы не менее 10 кг должны поступить в секцию на доращивание, 42 поросенка в возрасте 157 дней живой массой одной головы 52 кг передано на откорм и 41 животное в возрасте 269 дней средней живой массой одной головы 108 кг снято с откорма.

Кроме того, на откорм поступает в течение года выбракованных 18 основных свиноматок средней живой массой одной головы 200 кг и 18 ремонтных и проверяемых свинок средней живой массой одной головы 100 кг.

Для того чтобы опоросились 6 свиноматок, необходимо сформировать группу из 9 свиноматок, подготовленных к спариванию с хряками. В эту группу поступает 5 свиноматок, пригодных к воспроизводству после отъема поросят, 3 оставшиеся неоплодотворенными от предыдущей группы и 1 ремонтная свинка, достигшая случного возраста и живой массы не менее 110 кг (оплодотворяемость свиноматок принята 70 %).

Содержание на ферме хряков, холостых, супоросных свиноматок и ремонтного молодняка станково-выгульное, остального поголовья – безвыгульное. Все половозрастные группы свиней содержатся на сплошных полах с применением подстилки. Основные технологические параметры содержания свиней на ферме представлены в табл. 4.

Таблица 4. Основные технологические параметры содержания свиней на ферме

Производственные группы свиней	Количество животных в станке, гол.	Полезная площадь станка, м ² /гол.	Фронт кормления на 1 гол., см	Количество станков, шт.
Подсосные свиноматки с приплодом	1/10	6,45	45/144	16
Поросята на доращивании	23	0,56	26	8
Ремонтный молодняк и откорм	7	0,92	42	24
Хряки-производители	1	6,45	45	6
Хряки проверяемые	3	2,15	45	1
Свиноматки холостые и осемененные	3/1	2,15	45	2/4
Свиноматки условно-супоросные	3	2,15	45	3
Свиноматки супоросные	3	2,15	45	6

Исходя из конкретных условий на свинофермах может применяться трехфазная или двухфазная система выращивания и откорма молодняка. При трехфазной системе отнятых от маток поросят переводят в специализирован-

ные помещения (секции), где их размещают в групповых станках по 14–28 гол. По достижении поросятами живой массы 32–35 кг их переводят в помещение (секцию) для откорма и откармливают там в групповых станках также по 14–28 гол. или содержат большими группами на глубокой подстилке.

При двухфазной системе поросят после завершения подсосного периода оставляют в тех же станках и доращивают там гнездами до 90–120-дневного возраста. За этот период подвинки достигают живой массы соответственно 24–35 кг и переводятся в помещение для откорма. Откармливаемый молодняк содержится гнездами как в маточных станках по 8–10 гол., так и большими группами в групповых станках или на глубокой подстилке. Выращивание поросят по двухфазной системе повышает сохранность молодняка, снижает стрессы и заболеваемость животных.

6.

Для организации производства свинины на малых фермах разработаны технологические проекты (т. п.) на 100, 300, 500 (т. п. 802–01–21.33.86, 802–01–17.86), 1000 (т. п. 802–01–24.86, 802–01–14.84), 1500 (т. п. 802–02–22.33.86, 802–01–18.86), 2000 (т. п. 802–01–25.86), 3000 гол. (т. п. 802–01–23.33.86) годового выращивания, откорма или с законченным циклом производства и др.

Технологические параметры содержания свиней представлены в табл. 5.

Таблица 5. Технологические параметры содержания 500 свиней на ферме

Половозрастные группы	Поголовье, гол.	Количество станков, шт.	Вместимость станка, гол.	Площадь станка на 1 гол., м ²	Фронт кормления, см/гол.
Подсосные свиноматки	30	30	1	5,3	45
Поросята-отъемыши	300	30	10	0,53	20
Хряки-производители	10	10	1	7	45
Ремонтные хряки	6	2	3	2,3	40
Хряки-пробники	2	1	2	5,2	50
Свиноматки холостые и супоросные	32	3	10–11	2,2	50
Откормочный молодняк	210	16	15–16	0,9	37
Ремонтный молодняк	44	4	11	1,25	40

При планировке возможного объема производства свинины на малой ферме, выборе размера предприятия, проектных решений свиноводческих помещений учитываются зоотехнические требования к содержанию животных, рекомендуемые параметры объемно-планировочных решений, имеющие-

еся системы машин и оборудования по раздаче кормов, обеспечению микроклимата и удалению навоза.

При новом строительстве или реконструкции ферм используются типовые и нетиповые здания, сооружаемые из местных строительных материалов (кирпич, дерево, некондиционный металл и т. д.).

Свиноводческая ферма по выращиванию и откорму 500 свиней в год может размещаться в здании шириной 18 м, длиной 84 м (рис. 18).




Рис. 18. Свиноферма по выращиванию и откорму 500 гол. в год:

а) план; б) разрез;

I – секция подсосных свиноматок с поросятами; II – секция репродукции;

III – секция откорма; IV – кормоцех;

1 – станок для свиноматок с поросятами; 2 – канал навозоудаления;

3 – станок для откорма; 4 – станок для холостых и супоросных свиноматок;

5 – станок для хряков; 6 – кормовой проход; 7 – венткамера;

8 – электрощитовая; 9 – комната обслуживающего персонала

Здание разделено пополам перегородкой по продольной оси. В одной половине размещены в два ряда станки для откормочного поголовья, во второй – станки для подсосных свиноматок и взрослого поголовья свиней секции воспроизводства. Причем во второй половине здания секции подсосных

маток и воспроизводства отделены одна от другой поперечной перегородкой. В одном торце свинарника расположен кормоцех, в другом – подсобные помещения.

Свиноферма по выращиванию и откорму 1000 гол. в год может размещаться в одном здании шириной 18 м, длиной 108 м (рис. 19).




Рис. 19. Свиноферма по выращиванию и откорму 1000 гол. в год:

а) план; б) разрез;

I – секция подсосных свиноматок с поросятами; *II* – секция репродукции;

III – секция откорма;

1 – станок для свиноматок с поросятами; 2 – канал навозоудаления; 3 – станок для откорма; 4 – станок для холостых и супоросных свиноматок; 5 – станок для ремонтного молодняка; 6 – станки для хряков; 7 – кормовой проход; 8 – венткамера

Здание поперечным коридором разделено на две равновеликие части, каждая из которых дополнительно разделена осевой продольной перегородкой пополам. В двух смежных больших секциях размещены отдельно подсосные матки (то же поросята-отъемыши) и откормочное поголовье, а в двух малых – супоросные свиноматки с ремонтным молодняком и хряки. Технологические параметры содержания свиней представлены в табл. 5.

Таблица 5. Технологические параметры содержания 1000 свиней на ферме

Половозрастные группы	Поголовье, гол.	Количество станков, шт.	Вместимость станка, гол.	Площадь станка на 1 гол., м ²	Фронт кормления, см/гол.
Подсосные свиноматки	60	60	1	5,2	45
Поросята-отъемыши	600	60	10	0,52	20
Хряки-производители	20	20	1	7,7	50
Ремонтные хряки	12	4	3	4,2	40
Хряки-пробники	2	1	2	9,1	50
Свиноматки холостые и супоросные	64	6	10–11	21,7	45
Откормочный молодняк	420	26	16	13	30
Ремонтный молодняк	88	8	10–11	21,7	30

Свиноводческая ферма по выращиванию и откорму 2000 гол. в год может располагаться в двух свиноводческих зданиях шириной 18 м и длиной соответственно 102 и 66 м. В свинарнике 18×102 м размещено репродукторное поголовье. Здание осевой продольной перегородкой разделено на две половины: одну половину занимают станки для подсосных маток и поросят-отъемышей, другую – холостые, супоросные матки с ремонтным молодняком и поголовьем хряков, которое отгорожено поперечной перегородкой. В свинарнике размером 66×18 м размещено откормочное поголовье свиней. Здание поперечным коридором разделено на две одинаковые секции вместимостью по 342 гол.

Размещение станков в обеих секциях шестирядное, с образованием трех кормослужебных проходов шириной по 1,8 м. Размеры станков 2,1×5,6 м, ширина щелевых полов – 1 м. Репродуктор и откормочник соединены между собой технологической галереей, в которой расположен кормоцех. Технологические параметры содержания свиней на ферме представлены в табл. 6.

В технологических решениях малых ферм предусмотрены варианты содержания подсосных маток с поросятами в станках с приподнятыми щелевыми полами или на сплошных полах с подстилкой, поросят-отъемышей – погнестно на щелевых полах или в отдельных секциях на частично щелевых полах, свиней на откорме – в отдельных секциях, частично или полностью на щелевых полах или на глубокой подстилке.

Таблица 6. Технологические параметры содержания 2000 свиней на ферме

Половозрастные группы	Поголовье, гол.	Количество станков, шт.	Вместимость станка, гол.	Площадь станка на 1 гол., м ²	Фронт кормления, см/гол.
Подсосные свиноматки	80	80	1	5,2	50
Поросята-отъемыши	800	80	10	0,52	20
Хряки-производители	18	18	1	7,0	50
Ремонтные хряки	6	2	3	7,5	40
Хряки-пробники	2	2	1	7	50
Свиноматки холостые и супоросные	132	11	12	25	45
Откормочный молодняк	864	60	16	11,76	30
Ремонтный молодняк	75	8	10	13	30

Основные технологические параметры, которые рекомендуется выдерживать при содержании свиней на малой ферме, представлены в табл. 7.

Таблица 7. Технологические параметры содержания свиней на малой ферме

Производственные группы свиней	Максимальное число голов в станке	Площадь станка на 1 гол., м ²	Фронт кормления на 1 гол., см*	Площадь выгульной площадки на 1 гол., м ²
Хряки-производители	2	7	45	10,0 или активный моцион
Ремонтные хряки	5	2,5	30	5,0
Свиноматки: холостые	12	1,8	45	5,0
осемененные и условно-супоросные	1	1,5	45	—
супоросные	12	1,8	45	10,0
подсосные	1	От 3,5 до 6,5	45	10 с маткой
Поросята-сосуны	Гнездом	0,2	15	—
Поросята-отъемыши	20 или гнездом	0,35	20	—
Ремонтные свинки	10	0,8	30	1,5 или активный моцион
Откармливаемый молодняк	25	0,8	30	—

*Для всех групп свиней на одно животное предусмотрено одно кормоместо.

Для малых ферм семейного типа проектными организациями разработаны станки: ОСМ-1м и ОСМ-Ф-2 – для проведения опоросов маток и содержания приплода; ОСТ-Ф-1-1, УС-2 – для содержания откормочного поголовья; ОСГ-Ф-1-2 – для холостых и супоросных свиноматок; ОСГ-Ф-1-3 – для поросят-отъемышей; ОСГ-Ф-1-4 – для ремонтного молодняка; ОСГ-Ф-1-6 – для хряков-производителей и др.

В помещениях могут устанавливаться и нетиповые станки упрощенной конструкции собственного производства для содержания животных на глубокой подстилке.

При реконструкции помещений можно использовать также опыт зарубежных фермеров, содержащих некоторые половозрастные группы свиней на глубокой подстилке и осуществляющих кормление свиней из автокормушек с компьютерным управлением (рис. 19).




Рис. 19. Самокормушка с накопителем

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ОВЦЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКИХ (КРЕСТЬЯНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

1. Биологические особенности овец.
2. Породы овец и их классификация.
3. Организация воспроизводства стада овец в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств.
4. Технология интенсивного выращивания и откорма ягнят в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств.
5. Кормление овец.
6. Содержание овец в фермерских хозяйствах.

В Республике Беларусь овцеводство является дополнительной отраслью сельского хозяйства. Данная отрасль поставляет сырье для текстильной, меховой и кожевенной промышленности, а также дает ценные продукты питания – мясо, жир, молоко. Из тонкого кишечника овец изготавливают кетгут – незаменимый шовный хирургический материал. Из шерстного жира получа-

ют ланолин, который используют в медицинской и парфюмерной промышленности.

В условиях фермерских (крестьянских) хозяйств следует применять прогрессивную, безотходную, энерго- и ресурсосберегающую технологию интенсивного производства продукции овцеводства, которая, во-первых, учитывает биологические особенности и предусматривает максимальную реализацию потенциала разводимых овец и более полное и эффективное использование всех видов получаемой продукции. Во-вторых, необходим рациональный выбор технологических решений процесса производства в конкретном хозяйстве, учитывающий природно-климатические и экономические условия. Это позволит получить конкурентоспособную и экологически чистую продукцию высокого качества.

В настоящее время овец содержат, главным образом, для производства мяса и занятости сельских граждан. В соответствии с зональной специализацией рекомендуется разводить тонкорунных и полутонкорунных овец мясошерстного направления продуктивности, а также грубошерстных овец мясoszубного направления.

1.

Биологические особенности – это комплекс морфофизиологических свойств, определяющих характерную продуктивность и особенности реакции организма на условия окружающей среды. Чтобы полнее реализовывать генетический потенциал продуктивности животных, необходимо с учетом этих особенностей их кормить, содержать, эксплуатировать.

К самым основным и существенным биологическими особенностями овец относят:

1. Высокая пластичность, т. е. высокая приспособляемость к различным условиям разведения. Овцы хорошо переносят холодный и жаркий климат, быстро приспосабливаются к пастбищному содержанию, находят себе корм даже на самых скудных пастбищах. Овцы не боятся холода, благодаря прекрасно развитому шерстяному покрову и могут кормиться на пастбищах круглый год, однако очень плохо переносят повышенную влажность и сырые пастбища. Одной из приспособительных особенностей к высокой температуре служит способность овец отдавать тепло за счет учащения дыхания.

2. У овец крепкие конечности с прочными копытами благодаря своей подвижности и выносливости способны в случае необходимости к быстрой и мобильной смене пастбищ. Переносят длительные перегоны до 18 км.

3. Голова овцы имеет заостренную лицевую часть, тонкие, чрезвычайно подвижные губы и острые изогнутые резцы, что позволяет этим животным поедать любые пастбищные корма, в том числе и недоступные крупному рогатому скоту, например, низкорослую пастбищную траву, также легко они подбирают с земли рассыпанные зерна.

4. Поедают огромное количество растений различных видов, в том числе и многие сорняки. Употребляют в пищу более 520 видов растений. Пищеварительный аппарат овец хорошо приспособлен к перевариванию различных, в том числе и грубых кормов, а также продуктивному усвоению из

них питательных веществ. При перебоях в кормлении и поении многие породы способны расходовать жир, отложенный в теле.

5. Стадная форма существования. Так как овцы – животные стадные, то и содержать их желательно большими группами. При этом овец можно содержать вместе с любыми другими домашними животными, так как они со всеми прекрасно ладят, что позволяет хозяину с максимальной пользой использовать имеющиеся помещения для скота и пастбища.

6. Продолжительность жизни овец – 12–14 лет, а продолжительность хозяйственного использования – 6–7 лет. К этому времени у овец стираются и выпадают зубы, и использование животных становится экономически невыгодным.

7. Скороспелость. Овцы по скорости развития относятся к скороспелым животным. Половая зрелость наступает в 6–7-месячном возрасте, но в первую случку их пускают в возрасте 1,5 года. Если хотят случить молодых ярок раньше, то к этому времени они обязательно должны иметь живую массу не менее 75–80 % от массы взрослых маток. Половой цикл (периодичность прихода в охоту) у овец составляет в среднем 17 дней (колебания от 15 до 20 дней).

8. Плодовитость. Период суягности в среднем 150 дней (колебания от 140 до 155 дней в зависимости от породы, возраста и упитанности маток), что позволяет получать два ягнения в год. Одна овцематка за один окот может принести 1–2 ягненка, а матки романовской породы за ягнение приносят, как правило, 2–3 ягненка.

9. Живая масса ягнят при рождении зависит от породы и количества ягнят в помете. Одины весят 3–4,5 кг, ягнята из многоплодных пометов – как правило, меньше. При нормальных условиях кормления и содержания маток ягнята развиваются быстро. К 15–20-дневному возрасту они удваивают живую массу. Суточный прирост до 4 месяцев составляет 200–400 г в зависимости от породы и уровня кормления. К 4-месячному возрасту ягнята достигают 45–50 % живой массы родителей, а к годовалому возрасту – 80–90 %.

10. Сезонность в размножении (с августа по октябрь) характерна для овец большинства пород. Однако среди овец встречаются породы, которые могут приходить в охоту и осеменяться в любое время года, что позволяет получать от них потомство в любой сезон (романовская и др.). Поэтому от романовских овец обычно получают три ягнения за два года, а часть маток ягнятся даже дважды в год.

11. Овцы очень пугливы. Резкий крик или шум могут вызвать у них испуг и давку. Весьма чувствительны овцы и ко многим стрессовым факторам. Так, в первые 10 дней после стрижки они сильно реагируют на снижение температуры и легко простужаются. Из-за этого в период стрижки овец надо содержать вблизи овчарен, и в случае похолодания или дождя их сразу нужно загнать в помещение.

12. У овец хорошие слух, обоняние и зрение, но острота зрения резко снижается при недостаточном освещении, вследствие чего при проектировании и строительстве овчарни необходимо предусматривать хорошее освещение, особенно в помещениях для маток с ягнятами.

2.

В мире насчитывается свыше 600 пород и генетически обособленных групп овец: от животных с однородной тонкой и полутонкой шерстью до неоднородной с грубой и полугрубой, от короткотощехвостых до длинножирнохвостых и курдючных, от специализированных на производстве одного вида продукции (шерсть) до пород тройного направления продуктивности (шерсть, мясо, молоко).

Породы овец разделены на классификационные группы, что дает возможность лучше организовать племенную работу. В овцеводстве существует две системы классификации: зоологическая и производственная.

В основу зоологической классификации овец положены форма и длина хвоста. Форма хвоста зависит от количества хвостовых позвонков и степени отложения в нем жира. Эта классификация подразделяет овец на 5 групп: короткотощехвостые, длиннотощехвостые, короткожирнохвостые, длинножирнохвостые и курдючные. Производственная классификация овец отражает направление основной продуктивности, в основу положена группа шерсти и продуктивный тип овец. Согласно производственной классификации породы овец делят на четыре группы: тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные и грубошерстные.

Для разведения в условиях Республики Беларусь рекомендуются следующие породы овец: прекос, тексель, суффольк, иль-де-франс, латвийская темноголовая, романовская и другие.

Прекос. Порода скороспелых тонкорунных овец мясошерстного направления продуктивности. Выведена во Франции во второй половине XIX в., усовершенствована в Германии. Животные крупные, характеризуются пропорциональным телосложением, крепким, хорошо развитым костяком и широкой постановкой конечностей. Туловище глубокое, округлой бочкообразной формы, относительно длинное, грудная клетка и холка широкие, спина и поясница ровные, ляжки хорошо выполнены. Рунная шерсть на голове растет только до глаз, на конечностях – до запястных и скакательных суставов. Живая масса баранов – 100–130 кг, маток 60–70 кг. Настриг шерсти с баранов составляет 8–10 кг, с маток 3,5–4,5 кг. Шерсть белого цвета. Длина шерсти составляет 7–10 см. Выход мытой шерсти достигает 50 %. От 100 маток получают 125–135 ягнят.

Латвийская темноголовая. Полутонкорунная порода мясошерстного направления продуктивности. Выведена в Латвии. Овцы имеют крепкий и тонкий костяк, плотную кожу и хорошо выраженные мясные формы. Шерсть на туловище белая, однородная. Голова и ноги у большинства животных темные. Живая масса баранов 100–105 кг, маток – 55–60 кг. Длина шерсти у баранов 10–12 см, у маток – 8–10 см. Настриг шерсти с баранов 4–6 кг, с маток – 3–3,5 кг. Выход чистой шерсти около 55 %. Плодовитость 140–160 ягнят на 100 маток.

Тексель. Полутонкорунная мясошерстная порода овец создана в XIX в. в Нидерландах. Тело пропорциональное, мощное, среднего размера. Голова белого цвета с черным носом и иногда черными пятнами на коротких, широко расставленных ушах или веках. Лоб широкий, рога отсутствуют. Живая

масса баранов – 90–100 кг, маток – 60–70 кг. Длина шерсти – 10–15 см, настриг шерсти – 4,5–5,0 кг, выход чистого волокна 60–70 %. Убойный выход составляет 55–60 %. Плодовитость – 150–160 ягнят на 100 маток.

Иль-де-франс. Порода мясошерстного направления продуктивности, созданная во Франции. Животные крупные. Голова с широким профилем, короткая и толстая шея, грудь широкая и круглая, поясница и крестец широкие с хорошо развитой мускулатурой, ноги крепкие. Живая масса баранов – 90–100 кг, маток – 65–70 кг. Шерсть белая, однородная, длиной 10–15 см. Нاستриг шерсти с баранов составляет 5–6 кг, с маток 4–5 кг. Выход мытой шерсти – до 50 %. Средняя плодовитость – 130 ягнят на 100 маток.

Суффолк. Полутонкорунная короткошерстная мясошерстная порода овец создана в Великобритании, во второй половине XVIII в. Признана самостоятельной породой в 1859 г. Животные характеризуются крепким пропорциональным телосложением. Рунная шерсть белого цвета, длиной 7–8 см. Матки и бараны комолые. Живая масса баранов – 90–110 кг, маток – 65–80 кг. Шерсть белого цвета, настриг шерсти с баранов – 4–4,5 кг, с маток – 3–3,5 кг. Выход мытой шерсти – около 60 %. Плодовитость – 130–140 ягнят на 100 маток.

Романовская. Грубошерстная порода овчинно-шубного направления продуктивности. Выведена в XVIII в. в Ярославской губернии. Животные обладают округлым бочкообразным туловищем, крепким костяком, небольшой удлиненной, сухой головой. Шерстный покров слойный, пуховые волокна длиннее остевых. Окраска шерсти различная – пух белый, а ость черная. Живая масса баранов 65–75 кг, маток – 48–55 кг. Нاستриг шерсти с барана составляет 2,5–3,5 кг, с матки – 1,4–1,7. Выход чистой шерсти – около 70 %. Ценной особенностью романовских маток является их полиэстричность и многоплодие – 230–250 ягнят на 100 маток.

В данный момент в республике остро стоит вопрос по увеличению поголовья овец в общественных хозяйствах, в том числе и для того, чтобы население могло беспрепятственно приобретать породистых и высокопродуктивных животных.

3.

Одним из главнейших факторов, повышающих эффективность овцеводства, является правильная организация воспроизводства стада, важнейшего производственного процесса, обеспечивающего увеличение численности овец и выхода продукции. Разрабатывая технологию производства продукции овцеводства в своем хозяйстве, фермер должен принимать во внимание, что в современных условиях отрасль может успешно развиваться только при интенсивном использовании маток для получения и выращивания молодняка.

Воспроизводство стада состоит из трех взаимосвязанных технологических процессов: осеменения овец, ягнения маток и выращивания ягнят. Чтобы правильно разработать и спланировать технологию воспроизводства стада овец, фермер должен ознакомиться с физиологическими особенностями, связанными с размножением и половым поведением баранов и маток.

Воспроизводительные особенности баранов. Половая зрелость – биологическое свойство овец, обусловлено породными особенностями, уровнем кормления и другими факторами внешней среды. Баранчики способны к спариванию с 3–4-месячного возраста. У баранчиков романовской породы нарастание половой активности идет очень интенсивно и достигает высокой формы уже к 9–10-месячному возрасту. Целесообразно использование в случке хорошо развитых 6–7-месячных баранчиков с целью ранней оценки их по качеству потомства.

Именно с этого возраста необходимо начинать готовить будущих производителей к их дальнейшему интенсивному использованию. В это время при щадящем режиме (1–2 раза в месяц) нужно допускать молодых баранов к матке в охоте (при применении ручной случки). Совместное их содержание в одной кошаре с взрослыми баранами и матками, приходящими в охоту, стимулирует половую активность. Ремонтные баранчики постоянно находятся в сильном возбуждении, многие из них не поедают корма, непрерывно передвигаются, делают попытки и производят садку друг на друга. У многих животных (особенно с легковозбудимым типом нервной системы) появляются в дальнейшем стойкие нарушения половых рефлексов, и нормально развитые бараны вообще не реагируют на маток в охоте. В этом – одна из причин ранней выбраковки молодых, ценных в племенном отношении баранов. Учитывая эту особенность, необходимо при отборе ремонтного молодняка отдавать предпочтение животным с уравновешенным типом нервной системы. При выращивании баранчиков необходимо отводить им изолированные участки в кошаре с меньшим воздействием стрессовых факторов.

Более активная и целенаправленная работа по использованию баранов для осеменения маток начинается с 12–15-месячного возраста при их живой массе не менее 50–55 кг. В это время бараны делают по одной садке в неделю, постепенно к 1,5–2-летнему возрасту нагрузку увеличивают до 2–3 садок.

Воспроизводительные способности маток. При изучении воспроизводительных качеств маток в первую очередь учитываются такие факторы, как возраст, сроки случки и ягнения, отъема ягнят, живая масса, упитанность, особенности проявления репродуктивного поведения.

У ярок половое созревание начинается в возрасте 4–5 месяцев, и половой зрелости они, как правило, достигают быстрее, чем баранчики. Половая зрелость у них наступает значительно раньше, чем окончательно сформируется весь организм. Раннее осеменение и последующая беременность обычно задерживают физиологическое формирование и развитие ярок, так как все питательные вещества идут на рост плода. У таких самок происходят осложнения с окотом, и от них получают мелкий, слабый и малопродуктивный приплод. Кроме того, осеменение недоразвитых животных может привести к нарушению у них половой функции в последующие годы. Фермеру (крестьянину) необходимо всегда помнить, что ранняя случка особенно сильно нарушает рост и развитие организма при неудовлетворительных условиях кормления и содержания.

Традиционно принято в первый раз овец пускать в случку не раньше 18-месячного возраста, т. е. во вторую осень их жизни. Яркие скороспелых мясошерстных пород могут достигать физиологической зрелости в возрасте 9–10 месяцев. При этом их живая масса должна составлять не менее 80–85 % от массы взрослой особи, или 40–45 кг. Романовских ярок обычно рекомендуется пускать в случку в возрасте 10–12 месяцев при живой массе 41–43 кг.

Осеменение овец в более раннем возрасте с тем, чтобы максимально использовать маточную часть стада, играет очень важную роль не только в деле воспроизводства стада, но и способствует более быстрой смене поколений, т. е. ускорению улучшения стад по продуктивным качествам.

При определении возраста случки ярок необходимо также учитывать время года и их половой статус в этот период. Фермеру следует знать, что на проявление признаков первой половой охоты у растущих романовских ярок влияет не только возраст, но и сезон года. Наибольшее проявление охоты происходит в весенний и осенний периоды.

Выбор оптимальных сроков случки овец и ягнения маток. Сроки осеменения овец устанавливают с учетом особенностей их размножения и хозяйственных интересов фермеров. При определении оптимальных сроков случки исходят из условий случного периода, сезона ягнения и выращивания молодняка. При выборе оптимальных сроков случки и ягнения овец следует учитывать возможность максимального использования потенциальной плодовитости маток. При планировании сроков ягнения маток принимают во внимание также и тот факт, что в дальнейшем необходимо будет использовать высокую энергию роста ягнят при интенсивном откорме. Это позволит реализовать их на мясо в год рождения. Важно также рационально использовать кормовые угодья и дешевые кормовые средства, имеющиеся в хозяйстве у фермера (крестьянина).

Сезон года оказывает решающее влияние на состояние воспроизводительной функции овец. Установлено, что главным фактором внешней среды, влияющим на функции размножения овец, является сезонное изменение продолжительности дневного освещения, т. е. половой сезон у овец регулируется фотопериодически. Это означает, что секреция гормонов, обуславливающих половую активность, зависит от длины светлой части суток. Как только продолжительность дня заметно уменьшается, овцы начинают приходить в охоту и, наоборот, когда светлая часть суток увеличивается, наступает период полового покоя (анэструс). У овец различных пород чувствительность к изменению продолжительности дня различна.

Выбор оптимальных сроков случки в скороспелом мясошерстном овцеводстве заключается в том, что фермеру целесообразно начинать случную компанию в первых числах августа и заканчивать в последних числах сентября. Следует учитывать, что использование наиболее благоприятных сроков случки приводит к ягнению в зимние месяцы (январь–февраль). Преимущество зимних сроков ягнения определяются тем, что выход ягнят в расчете на 100 маток увеличивается на 25–40 %. Зимние окоты целесообразны еще и потому, что осеменение маток и их суягность приходятся на те периоды, когда они находятся в состоянии хорошей упитанности. Первая треть, а

нередко и половина суягности приходится на пастбищный период. Полноценный пастбищный корм, пребывание на свежем воздухе, солнечное облучение оздоравливающе действуют на маток и обуславливают нормальное течение всех процессов воспроизводства.

Ягнята зимних сроков ягнения к началу пастбищного сезона достигнут возраста 4–5 месяцев, когда они уже способны потреблять большое количество объемистых кормов и эффективно использовать подножный корм. Кроме того, при зимнем ягнении молодняк может быть хорошо откормлен за летний период, поэтому к осени он достигает высоких убойных кондиций и может быть реализован на мясо в 7–8-месячном возрасте.

Случку романовских овец рекомендуется проводить: при двухкратном ягнении в году – в феврале–марте и августе–сентябре, а при трехкратном ягнении в два года – в июле–августе, марте–апреле и ноябре–декабре. Ягнение будет проходить соответственно в следующие сроки: при первом, наиболее интенсивном варианте использования маток – в июле–августе и январе–феврале, а во втором случае – в декабре–январе, августе–сентябре и апреле–мае.

Отмечается повышение плодовитости маток, ягнившихся в зимнее (декабрь–февраль) и весеннее (март–май) время, по сравнению с летним и, особенно, осенним периодами. Это объясняется худшим состоянием репродуктивной функции маток в первую половину года и наименьшей оплодотворяемостью после длительного стойлового периода, когда кормление и содержание маток хуже, чем в пастбищный период, что отражается на общем физиологическом тонусе их организма.

Наименее желательным сроком ягнения маток следует признать период с 15–20 апреля по 10–15 июня, а период осеменения – соответственно с 10 ноября по 5 января. В весенний период организм матки значительно ослаблен влиянием неблагоприятных условий длительного стойлового содержания, что отражается на жизнеспособности молодняка.

Фермер должен помнить, что в зимний период хорошие результаты получают, если ягнение маток проходит в благоустроенных помещениях при оптимальных условиях для сохранения и нормального развития ягнят. Если хозяйства не обеспечены кормами и теплыми помещениями, тогда фермер (крестьянин) вынужден планировать ягнение в начале весны.

Половой цикл овцематки. Все половые поведенческие реакции овцематок проявляются комплексом полевых рефлексов: течки, половой охоты, овуляции, отыскивания самца, неподвижности, осеменения и образования желтого тела.

Продолжительность полового цикла (время от начала одной охоты до другой) составляет в среднем (с колебаниями) от 12 до 23 дней. Половой цикл делят по поведению самки на две основные стадии: одна –течка и половая охота и другая – половой покой. Охота у маток длится в среднем 24–38 ч (иногда до 3 суток).

У маток половое возбуждение может характеризоваться повышенной двигательной активностью, беспокойством, блеянием, снижением потребления корма. Однако часто отмечается и слабое проявление внешних половых

реакций. Рефлекс течки также может быть кратковременным (20 ч) и слабо выраженным. Этологическое отличие самок в охоте – положительная половая доминанта на барана. При этом у маток проявляется рефлекс отыскивания полового характера. Пришедшие в охоту матки группируются возле баранов, бегают за ними, допускают ухаживание и обнюхивание их самцами, проявляют рефлекс неподвижности и допускают садку. Половая охота имеет определенный суточный режим: в ранние утренние часы и вечером она наиболее выражена. Поэтому наиболее благоприятным моментом отбора и осеменения овец является утро или вечер.

Организация случки (осеменения) овец. Фермеру необходимо организовать процесс воспроизводства таким образом, чтобы продолжительность случки в отаре проходила в течение не более 35–40 дней. Это даст возможность провести ягнения в сжатые сроки, что значительно облегчит в дальнейшем выращивание молодняка и уход за взрослыми животными.

Подготовку маток и баранов начинают за 1,5–2 месяца до случки. Животные, подготовленные к случке, должны иметь заводскую упитанность. Матки высокой упитанности интенсивно приходят в охоту, лучше оплодотворяются и приносят более крупных и здоровых ягнят, у них больше двоен и троен. У маток низкой упитанности наблюдается недружное проявление охоты, повышается эмбриональная смертность, в результате чего выход ягнят снижается на 15–20 %, а яловость маток повышается в два и более раз.

В овцеводстве применяют искусственное осеменение и естественную случку. На крупных фермах (более 500 маток) основной вид случки – искусственное осеменение. Это самый совершенный способ оплодотворения овец, обеспечивающий более эффективное использование племенных ресурсов. Спермой, полученной от барана за одну садку, осеменяют 20–30 овец и более, а средняя норма нагрузки на барана за случной сезон 300–500 маток, а нередко и более.

Естественную случку подразделяют на классную, гаремную, ручную и вольную.

При классной случке в отару маток определенного класса на 35–40 дней пускают баранов, предварительно проверенных по качеству спермы, из расчета 2–3 на 100 маток. Днем животных содержат вместе, а на ночь баранов обычно отделяют от маток для отдыха и дополнительного подкармливания концентрированными кормами. Для лучшей оплодотворяемости маток баранов, участвующих в случке, целесообразно разделить на две группы и пускать к маткам через день или через неделю.

Гаремная случка занимает промежуточное положение между классной и вольной. В группу маток – гарем (30–40, но не более 50 самок в зависимости от возраста барана) – пускают специально подобранного производителя, на ночь его отделяют от маток и подкармливают концентратами. Гаремы, а количество их в хозяйстве может достигать до 10–15, содержат отдельно. Состав гаремов остается неизменным на протяжении всего случного периода. Такая случка применяется в племенных стадах, и происхождение ягнят по отцу становится известным.

Ручная случка применяется на фермах с небольшим поголовьем (200–300 маток). Внешние признаки охоты у овец могут быть выражены слабо. Наиболее яркое проявление половых рефлексов у самок всех видов животных бывает в присутствии самца. В связи с этим выявляют овец в состоянии охоты с помощью пробников, т. е. энергичных, но не используемых для покрытия маток, баранов. Их применяют к отаре из расчета один баран на 80–100 маток. Матку считают в охоте, если при попытке пробника покрыть ее она стоит спокойно. Чтобы пробники не смогли осеменить овец, им подвязывают фартук, сшитый из мягкой материи. Ручная случка позволяет организовать правильную племенную работу и вести индивидуальный подбор в стаде. При этом можно точно знать время покрытия каждой матки, а следовательно, и время ягнения.

Вольная случка состоит в том, что баранов содержат совместно с матками, поэтому ягнение их продолжается в течение длительного времени. Многие матки остаются яловыми, а среди ягнят наблюдается большей отход. При вольной случке невозможна никакая плановая работа по разведению овец.

Суягность овцы продолжается около 5 месяцев (от 144 до 155 дней, средний, наиболее вероятный срок – 152 дня).

Плодовитость разводимых в Республике Беларусь мясошерстных пород достаточно высокая – в среднем не менее 120 ягнят на 100 овцематок, а фактическая реализация потенциала составляет часто лишь 60–70 %.

Организация ягнения маток. Перед началом ягнения в наиболее теплой, защищенной от сквозняков части овчарни устраивают тепляк с родильным отделением: оборудуют специальные клетки для проведения ягнения и санитарной обработки маток, а также отделение с индивидуальными клетками-кучками размером 1×1 м, которые огораживаются деревянными щитами или решетками высотой 1–1,25 м, а при необходимости обогреваются подвешенными сверху лампами-термоизлучателями. Количество приемных родильных клеток должно быть рассчитано на 1–2 % от общего количества маток. Индивидуальных клеток-кучек сооружают столько, сколько необходимо для размещения в них всех маток, обьягнившихся за 2–3 дня, т. е. примерно 10–15 % от поголовья маток.

При уходе за суягными матками необходимо соблюдать большую осторожность, не допускать резких движений и грубых окриков. За неделю до наступления ягнений устанавливают круглосуточное дежурство в кошаре. Постоянное наблюдение за овцами в этот период позволяет определить время наступления родов, чтобы оказать квалифицированную помощь маткам при ягнении.

Поведение маток во время окота и новорожденных ягнят. Элементы материнского поведения начинают проявляться во второй половине суягности, ближе к родам. Матки в этот момент становятся медлительными и осторожными. За несколько часов до ягнения они становятся беспокойными, плохо поедают корм, отказываются от воды, ложатся, встают, часто оглядываются назад, тщательно обнюхивают подстилку, разгребают ее ногами. Изменяется и внешний вид овец. Молочная железа увеличивается в объеме, при

доеении из сосков выделяются капли молозива. Живот опускается, голодные ямки резко обозначаются, наружные половые органы сильно припухают, увеличиваясь в размерах, краснеют. Самки тихо блеют, часто мочатся и испражняются. Они отделяются от других животных, подыскивая наиболее удобное место.

Овцы ягнятся в любое время суток, но чаще всего вечером, ночью и рано утром. При полноценном кормлении и правильном содержании маток в период суягности ягнение в большинстве случаев протекает легко и продолжается от 20 до 50 мин., при этом они не нуждаются в посторонней помощи. Взрослые матки обычно быстрее ягнятся, чем первоокотки. Задержка родов сверх указанного времени означает, что они неблагополучны, и надо быть готовым к оказанию помощи матке, чаще всего это бывает при неправильном положении плода.

При ягнении сначала появляется плодный пузырь, наполненный жидкостью, который обычно разрывается до выхода ягненка из половых путей. Если ягненок рождается в наполненных жидкостью околоплодных оболочках, то их немедленно разрывают чистыми руками, иначе ягненок может задохнуться. При правильном положении плода сначала показываются передние ножки, потом лежащая на них головка и затем весь ягненок выходит наружу. При неправильном положении плода необходимо оказать помощь матке.

У родившегося ягненка сразу же очищают от слизи нос, рот и дают матке облизать его. Это требуется для усвоения маткой специфического запаха своих ягнят, способствует установлению прочной связи мать–ягненок и ведет к перестройке работы нервной системы самки.

В норме послед должен отделиться через 1–2 часа после ягнения. Нельзя допустить, чтобы плод был съеден маткой, так как это приводит к расстройству пищеварения у животного и ухудшает качество молока, что неблагоприятно сказывается на здоровье ягнят. Всю грязную подстилку и послед сразу же убирают в специальный ящик и выносят из кошары для утилизации. Пол клетки очищают, дезинфицируют и застилают чистой соломой. Если у матки в течение 4–5 часов после родов не отделится послед, то ей необходимо оказать ветеринарную помощь.

После отделения последа заднюю часть туловища и вымя овцы обмывают теплой водой и обтирают чистым полотенцем. Одновременно проверяют состояние вымени. Первые струйки молозива сдаивают в специальную посуду, так как, находясь в выводных протоках молочной доли, оно может подвергаться бактериальному загрязнению, а это способствует возникновению расстройства пищеварения у ягнят.

Важно, чтобы ягнята после рождения получили молозиво не позднее чем через 30–40 минут после родов, так как от этого зависит выживаемость молодняка. Несоблюдение этого правила часто приводит к гибели ягнят.

Фермер (крестьянин) должен знать, что получение ягненком достаточного количества молозива с последующим ранним скармливанием сена высокого качества и прогулками на свежем воздухе способствует развитию терморегуляции, постэмбрионального кроветворения и минерализации ко-

стяка. Организуя выращивание молодняка, также следует принимать во внимание то, что практически у новорожденного ягненка хватает энергии на 10–16 часов жизни. Если за это время он не получит молоко матери и не начнет его нормальное питание, то новорожденный может погибнуть от истощения.

В течение молозивного периода его состав постепенно изменяется, уменьшается количество жира и белка, исчезают лейкоциты, а содержание сахара возрастает. Химический состав молозива овечьего молока приведен в табл. 7.

Таблица 7. Химический состав молозива овец, %

Время анализа после ягнения, ч	Сухое вещество	Жир	Протеин	Лактоза	Зола
0–3	39,0	17,2	19,5	1,6	0,82
3–6	33,9	15,4	15,0	2,4	0,81
6–12	30,6	14,0	12,5	3,5	0,84
12–24	28,6	12,3	11,8	3,5	0,87
24–28	22,5	10,7	7,1	4,0	0,92

После ягнения (приблизительно через час) у матки появляется жажда и ей необходимо дать немного чистой теплой воды. Через каждые 2 часа матке дают 1–1,5 литра теплой воды.

В первый день после окота маткам дают мелкостебельчатое сено хорошего качества. На полный рацион, включающий (кроме сена) сочные корма и концентраты, подсосных маток следует переводить на четвертый-пятый день после ягнения.

Поведение ягнят в подсосный период зависит главным образом от лактационного поведения маток (молочности) и технологии выращивания молодняка. В первые 20 суток онтогенеза развитие ягнят идет очень интенсивно, а увеличение живой массы ягнят прямо пропорционально молочности маток. В первые три недели жизни ягнята обладают интенсивным энергетическим обменом и повышенной энергией роста. В этом возрасте их живая масса увеличивается в 2 раза. При нормальном и полноценном кормлении подсосных маток ягнята получают ежедневно более 1 кг молока, в результате чего среднесуточный прирост живой массы составляет 200–250 г. В этот период жизни у молодняка проявляется рефлекс подражания. Они начинают подражать друг другу, матерям, ориентируясь на их поведенческие реакции. Опытные фермеры умело используют этот врожденный безусловный рефлекс для раннего приучения ягнят к поеданию грубых и концентрированных кормов. Для этого с 10-суточного возраста ягнятам устраивают «столовые», куда они свободно заходят через лазы шириной 20–25 см и высотой 30–40 см. В столовых они получают сено хорошего качества, концентраты и минеральную подкормку.

4.

Мясо взрослых овец называется бараниной, а мясо ягнят, убитых в год их рождения – ягнятиной. Баранина обладает специфическим запахом, который зависит от содержания гирсиновой кислоты. Ягнятина, а также мясо скороспелых мясошерстных полутонкорунных и романовских овец не имеет неприятного запаха. В баранине содержится от 48 до 65 % воды, от 12,8 до 18,6 % белков, от 13 до 37 % жира, и 0,8–0,9 % минеральных веществ в сырой ткани. Ценным свойством бараньего жира является небольшое содержание холестерина – 29 мг % (против 75 мг % в говяжьем и 74,5–126 мг % в свином).

Жир баранины состоит из пальмитиновой, стеариновой, пальмоолеиновой, олеиновой, линоленовой, арахидоновой и линолевой кислот. Усвояемость бараньего жира составляет от 68 до 80 %, свиного – 95–98 %.

Наилучшими диетическими качествами обладает молодая баранина (мясо от ягнят в возрасте 6–9 месяцев). Ее мясо отличается нежностью мышечной ткани и оптимальным содержанием жира и белка. У ягнятины на 16–17 % массовой доли белка в мякоти приходится от 12 до 20 % жира.

Баранина – хороший источник минеральных элементов. В ней содержится (мг %): калия – 278; фосфора – 133–213; магния – 19; кальция – 9–10; алюминия – 4,3; меди – 4,2; железа – 2,2–2,7. Потери микроэлементов составляют при жарении с жиром 3,1 %, при варке – 20–67 %,

В баранине содержатся витамины (мг %): тиамин (B1) – 0,13–0,16; рибофлавин (B2) – 0,18–0,22; никотиновая кислота (PP, витамин B5) – 4,3–5,2; пантотеновая кислота (B3) – 0,58; фолиевая кислота (BC, или B9) – 0,07–0,09; биотин (B7) – 5,9; пиридоксин (B6) – 0,29; цианкобала-мин (B12) – 2,5. Большая часть витаминов устойчива при обработке мяса и мало разрушается.

Выращивание ягнят до отъема. В условиях фермерских (крестьянских) хозяйствах и личных подворий граждан наиболее доступным, оптимальным и прогрессивным является способ крупногруппового выращивания ягнят, отличительной особенностью которого является то, что группа маток с ягнятами формируется вскоре после рождения и состав ее не меняется вплоть до отбивки ягнят от матерей. Из клеток-одиночек маток с ягнятами переводят в групповой станок (сакман) площадью 20–30 м, рассчитанный на содержание 15–20 маток мясошерстных пород или 10–15 романовских. Рядом устраивают подкормочные отделения (столовые) площадью 9–10 м (из расчета 0,5 м на ягненок). Сакман огораживают от подкормочного отделения щитом с узким лазом для ягнят. Сакманы обычно формируются за 1–3 дня, что дает возможность выращивать в группах ягнят одинакового возраста. Как только станок заполняется, выгораживается следующий и так далее до конца ягнения. Такая технология выращивания ягнят до отбивки наиболее полно отвечает биологическим особенностям овец, так как способствует лучшему проявлению материнского инстинкта и установлению прочной связи мать–ягненок, а это значительно повышает сохранность молодняка.

Фермер должен также иметь представление и о традиционной системе выращивания ягнят, которая основана на постепенном увеличении размеров сакманов (группы маток с ягнятами). Сразу после родов маток с ягнятами

помещают в одиночную клетку, а через 1–3 дня их объединяют уже в небольшие группы (сакманы) по 3–5 маток с ягнятами, затем по 10–15, 20–30, а к 2–4-месячному возрасту размер группы доводят до 150–200 маток (через каждые 8–10 суток сакманы укрупняются в два раза). Данные рекомендации пригодны для выращивания двойневых ягнят. Формируя и укрупняя сакманы, фермер обязательно должен принимать во внимание то, что все ягнята в сакмане должны быть примерно одинакового возраста и развития. Маток со слабыми ягнятами включают в сакманы небольших размеров, так как в крупных группах такие ягнята могут потерять матерей, их труднее отыскать для подкормки, вследствие чего они быстро худеют и могут погибнуть. Маток с двойневыми ягнятами выделяют в особые сакманы, размеры которых также должны быть небольшими. Укрупнение (объединение) двух или нескольких сакманов осуществляют только после того, как подавляющее большинство ягнят начинает быстро находить матерей и характеризуется нормальным для своего роста развитием.

Техника отбивки ягнят от маток. Отъем (отбивку) ягнят от маток осуществляют в различные сроки – от 5 до 120 дней – в зависимости от применяемой технологии и наличия в хозяйстве высокобелковых концентрированных смесей для подкормки ягнят.

Экстенсивное ведение овцеводства с длительным содержанием маток и ягнят на пастбищах, а также разведение тонкорунных овец для производства шерсти предопределяет отбивку ягнят в возрасте 4 месяцев и практикуется в том случае, если в качестве кормовой базы служат естественные кормовые угодья, а матки приносят по одному ягненку в год (редко по два).

В условиях фермерских (крестьянских) хозяйств отъем от маток ягнят мясошерстных пород целесообразно проводить в 2-месячном возрасте, а романовских ягнят можно традиционно оставлять с матками до 3 месяцев. Отбивку производят посакманно, когда средний возраст ягнят в группе достигнет 55–60 дней.

Отбитых ягнят до 4-месячного возраста оставляют в сакмане, а маток переводят в общее стадо. В 4-месячном возрасте ягнят разделяют на 2 группы – ярочки и баранчики и в дальнейшем содержат раздельно. Если нет возможности выращивать ягнят до 4-месячного возраста в прежних сакманах, то их хотя бы в течение 10 дней оставляют на прежнем месте и в привычных условиях.

После отъема лучшим источником обеспечения ягнят питательными веществами являются легкопереваримые концентратные смеси, основными компонентами которых являются пшеница, овес, ячмень, пшеничные отруби, а в качестве дополнительных источников протеина в таких смесях используют сухое молоко, подсолнечниковый или льняной жмых и шроты. После отъема ягнят количество концентратных смесей в их рационах должно составлять 45 %, сена – 20 %, корнеклубнеплодов, сенажа и силоса хорошего качества – 35 %. Содержание клетчатки в смесях для ягнят до 6 месяцев не должно превышать 8–10 % и старше 6 месяцев – 22 % от сухого вещества рациона. При более высоком содержании клетчатки (свыше 25 %) ягнята плохо переваривают корма и используют питательные вещества рационов. Концентра-

ция крахмала и сахара в рационах интенсивно выращиваемых ягнят должна равняться 23–40 %. Общий уровень минеральных добавок в концентратных смесях для растущего рано отнятого молодняка овец не должен превышать 1–1,5 %, а оптимальное соотношение кальция к фосфору – 1,5:4,6.

Особенности выращивания ягнят-сирот и ягнят из многоплодных окотов. Значительным резервом увеличения выхода ягнят и, следовательно, овцеводческой продукции являются многоплодные окоты, которые у разводимых в Республике Беларусь пород овец составляют от 40–50 % (мясошерстные породы) до 70–100 % (романовская). Однако сохранение ягнят из многоплодных окотов осложнено целым рядом факторов, главными из которых являются: низкая живая масса таких ягнят при рождении (2–3 кг и менее) по сравнению с одиночками (3,5–4,5 кг), недостаток молока у матерей для всего приплода, пониженная устойчивость новорожденных к болезням и переохлаждению, а также повышенная требовательность к условиям содержания (температуре, составу воздуха и др.). Поэтому при несоблюдении технологических требований падеж ягнят из многоплодных окотов может быть высоким, особенно в первые дни и недели жизни, когда гибель их может достигнуть до 30–40 %. Полная реализация многоплодия овец и выживаемость ягнят зависят в значительной мере от состояния маток в период случки, суягности и лактации, их материнских качеств, а также уровня и полноценности кормления. От маток, получающих скудный рацион, рождаются мелкие, с пониженной резистентностью ягнята, и их отход в первые дни жизни непосредственно связан с недокормом овцематок.

Для обеспечения резистентности организма новорожденных ягнят к внешним условиям в первый период достаточно такого количества молозива, которое они получают в течение первых суток жизни. При искусственном выращивании ягнят наиболее целесообразно отъем их проводить не позднее 48 часов после рождения при условии, что за это время они получили достаточное количество молозива.

Традиционно ягнят-сирот и ягнят от маломолочных маток выращивают, подсаживая к обильномолочным маткам, или им дополнительно дают коровье молоко.

На искусственное выращивание рекомендуется переводить ягнят из многоплодных пометов, а также ягнят-сирот и ягнят от маломолочных и заболевших матерей. Из многоплодных пометов отнимают в первую очередь баранчиков, а потом ярок, так как всех ягнят-искусственников в основном выращивают на мясо. Ремонтный молодняк следует выращивать только под матками.

Лучшим временем для начала выпойки заменителя являются первые-третьи сутки после рождения. Ягнят поят теплым заменителем (36–38 °C) из бутылочек с сосками через каждые 3 часа (6 раз в день) по 125–135 г. После 6–8 принудительных кормлений, когда ягнята научатся сосать через соски, их приучают к пользованию групповой сосковой поилкой.

Группы молодняка формируют в течение не более 7–8 дней, содержат их в клетках на соломенной подстилке (из расчета 0,30–0,35 м² площади на голову) по 10–12 ягнят до 2-недельного возраста, а затем по 20–25. Ягнят

сортируют по их развитию и активности (сильных отбирают в отдельную группу). Разница в возрасте между ягнятами в группе должна быть не более недели, чтобы маленький ягненок не принял более старшего за овцематку. В больших группах ягнята часто сосут пуповину, уши, препуций, а также просто шерсть, которую потом заглатывают, что приводит к закупорке желудка и их гибели. Иногда в группе появляются 1–2 очень активных ягненка. Они быстро съедают свою порцию молока и начинают отталкивать от сосок остальных ягнят. Таких ягнят, также как и очень слабых, необходимо отсадить в отдельные клетки.

Очень важной деталью выращивания ягнят на заменителях молока является режим их кормления. Применяют нормированную выпойку и выпойку вволю. При нормированной выпойке ягнятам до 2-недельного возраста выпаивают заменитель овечьего молока 5–6 раз в сутки из расчета по 200–300 г на одну голову при температуре 36–38 °С. С 2-недельного возраста заменитель дают 4 раза в день по 400–500 г при температуре 25–30 °С. Количество сосков в поилке должно соответствовать количеству ягнят в группе.

В молочный период необходимо также приучить ягнят к поеданию тех кормов, которыми их будут кормить в послемолочный период. Позже приучить молодняк к новому корму бывает очень трудно.

5.

Кормление баранов-производителей

Баранов необходимо кормить в соответствии с потребностями их организма, а также правильно содержать, обязательно предоставляя моцион в стойловый период. Половые железы, как и все другие органы, находятся во взаимосвязи с остальными органами и тканями организма, а условия питания усиливают или тормозят их функциональную деятельность и влияют на качество семени. Показателями нормального состояния баранов служат их подвижность, высокая половая активность, хороший аппетит, быстрое и полное поедание задаваемых концентратов. Появление у баранов признаков вялости и истощения или ожирения указывает на неправильное кормление и содержание.

В рацион баранов нужно включать грубые, сочные, концентрированные корма и минеральную подкормку. Из грубых объемистых кормов лучшим считается своевременно убранное, тонкостебельное, мелкотравное, хорошо облиственное сено (бобовое, бобово-злаковое и злаково-бобовое), из сочных – зеленая пастбищная трава и корнеплоды (особенно красная морковь), из концентрированных – смесь овса, ячменя, кукурузы, проса, пшеничных отрубей, подсолнечникового жмыха или шрота. В частности, на жизнеспособность и количество спермиев положительно влияет скармливание баранам-производителям кормов животного происхождения (снятого молока, творога свежего, сухого обезжиренного молока, мясокостной, рыбной, кровяной муки), кормовых дрожжей, куриных яиц, а также витаминных кормовых средств. Из минеральных подкормок обязательно нужно давать поваренную соль, лучше в виде лизунца, но можно и в размолотом виде, а также мел и костную муку.

В течение неслучного периода бараны-производители должны быть здоровыми, подвижными, иметь хорошую, но не жирную упитанность.

Полноценное кормление баранов в стойловый период может быть обеспечено рационами, включающими 35–40 % сена, 20–25 % сочных и 40–45 % концентрированных кормов от общей питательности, соответствующей нормам кормления.

В неслучный период количество сена в рационе баранов должно составлять от 1–1,2 до 1,5–2 кг. Смеси концентратов рекомендуется скармливать в количестве от 0,6 до 0,8–0,9 кг, а сочных кормов (силос, корне- и клубнеплоды) – от 1,5 до 2–2,5 кг.

В пастбищный период потребность баранов в питательных веществах в полной мере обеспечивается при пастьбе их на хороших естественных и искусственных (сеяных) пастбищах и подкормкой концентратами в количестве от 0,5 до 0,8 кг в сутки на голову.

При составлении рационов для баранов-производителей на случной период в летнее время рекомендуется следующее соотношение кормов (% по питательности): сено – 15–20 %, зеленые корма – 15–20, концентраты – 40–50, корма животного происхождения – 5–10 и сочные корма – 4–5; а в стойловый период: сено – 30–40, концентраты – 40–50, корма животного происхождения и сочные – по 5–10 %.

Рационы баранов-производителей в период усиленного использования должны состоять из зеленой травы и сена хорошего качества (вволю), 1,2–1,5 кг смеси дробленых концентрированных кормов (в том числе 0,2 кг жмыхов и 0,1–0,2 кг пшеничных отрубей), 0,2–0,5 кг моркови, 1–3 л снятого молока, 0,2–0,25 кг свежего обезжиренного творога или 1–3 куриных яйца и 15–20 г поваренной соли. При плохих пастбищах необходимо дополнительно включать корнеплоды (морковь, витаминные сорта тыквы, свеклу кормовую и сахарную и др.) в количестве 1–1,5 кг.

Если случка приходится на период стойлового содержания, примерный рацион баранов-производителей при живой массе 100 кг и нагрузки три садки в сутки должен включать 1,2 кг сена злаково-разнотравного, 0,5 – сена люцернового, 0,4 – дробленого ячменя, 0,4 – плющеного овса, 0,2 – гороха, 1,0 – свеклы кормовой и 0,5 кг моркови. В рационе содержится 2,4 кормовой единицы, 27 МДж обменной энергии, 2,8 кг сухого вещества, 287 г переваримого протеина, 19 г кальция, 11 г фосфора и 9 г серы.

Рационы должны быть полностью сбалансированы по минеральным веществам. При недостатке тех или иных элементов, особенно кальция и фосфора, необходимо использовать соответствующие подкормки.

Баранов-пробников выделяют, как правило, из первоклассных животных (желательно с живой массой 70–80 кг). Чтобы поддерживать у таких животных хорошую упитанность, питательность их рационов должна быть равной 1,3–1,7 кормовой единицы и 115–155 г переваримого протеина.

В стойловый период баранам-пробникам скармливают по 1,5–2 кг хорошего сена, 2,5–3 кг силоса и 0,6–0,7 кг концентратов. В пастбищный период их выпасают на естественных и сеяных травах и дополнительно подкармливают концентратами (примерно 0,5–0,6 кг на голову). В период проведения

осеменения, кроме пастбищ, им следует давать вволю сена и по 0,8–1 кг концентратов. При использовании пробников для вольного покрытия маток их кормят, как и баранов-производителей.

Кормление суягных маток

У суягных овец потребность в питательных веществах складывается из расхода на физиологические отправления организма (на поддержание жизни), рост шерсти и эмбриональное развитие плодов. От состояния здоровья, упитанности и уровня кормления суягных маток зависят молочность их после ягнения, рост и развитие ягнят в утробный период и, в конечном счете, во многом определяется будущая продуктивность молодняка. Фермеру (крестьянину) всегда следует помнить, что нет ничего более разорительного и убыточного для хозяйства, чем недокорм суягных животных, который ведет к снижению плодовитости и продуктивности, рождению ими нежизнеспособного приплода или слабых ягнят, что значительно усложняет в дальнейшем их выращивание, вызывает дополнительные расходы корма и затраты рабочей силы, сильно ухудшает качество шерстного покрова. При временном недостатке корма материнский организм питает плод за счет своего тела, но если суягная матка долго недополучает нужного ей количества питательных веществ, это отрицательно сказывается на ее здоровье, развитии плода и благополучии родов.

Нормы кормления суягных маток разграничивают по периодам: первая половина (1–3-й месяцы) и вторая половина (4–5-й месяцы).

Задачей рационального кормления маток в первый период (1–3-й месяцы) суягности является поддержание овец в состоянии той упитанности, которую они достигли к случному сезону. Надо учитывать, что резкие перемены в кормлении, особенно в качестве и составе кормов, отрицательно влияют на развитие зародыша, а иногда даже приводят к его отмиранию и выкидышу. Однако, если упитанность маток снижается, то норму кормления следует увеличить на 0,3–0,4 корм. ед., чтобы привести их в состояние средней упитанности.

Если у маток в первую треть суягности заметных сдвигов в обмене веществ не наблюдается, то во второй и, особенно, в последней трети суягности в связи с бурным ростом и развитием плода резко повышается обмен веществ в сторону ассимиляции со значительным увеличением потребности в кормах. Так, у маток в последнюю треть беременности в зависимости от их многоплодия потребность в корме повышается примерно следующим образом: по общей питательности (в корм. ед.) – от 30 до 50 %, по переваримому протеину – от 40 до 70 % по сравнению с потребностью в первом периоде суягности. В этот период необходимо больше витаминов и минеральных веществ, особенно кальция и фосфора. У суягных овец потребность в кальции и фосфоре возрастает в два с лишним раза. Это связано с повышением фосфорно-кальциевого обмена. У маток в первый период суягности в сутки откладывается в среднем 2,5–3,5 г кальция и 1,6–2,7 г фосфора, а во второй период соответственно 3,5–5,6 и 2,2–2,8 г.

Суягные овцы должны быть обеспечены в достаточной мере витаминами, в том числе кальциферолом (витамин D), токоферолом (витамин E), ретинолом (витамином A) и др.

При установлении норм кормления суягным маткам учитывают и климатические условия региона, где находится фермерское хозяйство, а также количество и качество имеющихся кормов. Приведенные нормы кормления рассчитаны на овец средней упитанности. Молодым маткам, еще не достигшим полного развития, а также животным ниже средней упитанности суточный рацион требуется увеличить на 0,2–0,3 корм. ед. (15–25 %) выше рекомендуемых норм, высокопродуктивным элитным маткам рекомендуется максимальные нормы увеличить на 10–12 % как в первый, так и во второй период суягности.

Учитывая, что в условиях Республики Беларусь начало суягности, как правило, совпадает с осенними месяцами, поэтому уровень кормления маток в первый период ее в значительной мере зависит от наличия и качества естественных и сеяных пастбищ. В этот период можно использовать пожнивные остатки, отавы сенокосов, естественных и культурных пастбищ, посевы озимых культур на выпас. Фермеру (крестьянину) следует знать, что хорошие зеленые пастбища, богатые протеином, минеральными веществами и витаминами, в полной мере могут обеспечить потребность суягных овец в питательных веществах, и, наоборот, на плохих пастбищах у маток снижаются упитанность, воспроизводительная способность и продуктивность. Следует помнить, что даже хорошим кормлением в последующий период суягности не всегда удастся наверстать потерянную упитанность. В связи с этим, если осень сухая и на пастбище овцы не наедаются, их надо подкармливать сеном, силосом или концентратами. Размер подкормки определяется качеством и обилием травостоя на пастбище, а также возрастом, продуктивностью и племенными достоинствами овец.

При использовании осенних пастбищ нельзя допускать поедания животными травы, покрытой инеем, особенно на голодный желудок, что часто является причиной аборт, а также выпасать овец во время гололедицы.

В районах с высокой распаханностью земель при отсутствии достаточного количества пастбищ полноценное кормление маток в первый период суягности организуют за счет скармливания им сена, силоса и концентратов.

Для фермерских (крестьянских) хозяйств можно рекомендовать оптимальную структуру кормовой базы, отличительной особенностью которой является высокая массовая доля (до 90 %) дешевого зеленого корма в летних рационах, а в зимних рационах – до 70 % объемистых кормов (сена, силоса, сенажа, соломы).

Кормление подсосных маток

Потребность в корме лактирующих (подсосных) маток значительно выше, чем суягных, так как должна обеспечить высокую молочность, необходимую для сохранения и нормального развития приплода. Молочность маток зависит от возраста, индивидуальных наследственных особенностей, породы и числа ягнят в помете, но решающее значение в этом имеет упитан-

ность животных и уровень кормления. При организации кормления лакирующих маток учитывают, что рост и развитие ягнят в первые месяцы жизни находятся в прямой зависимости от молочности матерей. Молочность маток с двумя ягнятами обычно на 20–25 % выше, чем у овец с одним ягненком. Чем выше молочность, тем интенсивнее протекают обменные процессы в организме и тем лучше надо кормить таких самок.

Фермеру (крестьянину) необходимо также учитывать, что кормление подсосных маток должно обеспечивать не только высокую молочность, но и сохранение их упитанности, а также нормальный рост шерсти. Если же кормление недостаточное, то лактирующие самки быстро худеют, поскольку на образование молока они вынуждены расходовать питательные вещества своих органов и тканей. При этом молочность маток уменьшается, что отрицательно отражается на росте и сохранности ягнят. Кроме того, при плохом кормлении у маток замедляется рост шерсти и образуется так называемая «голодная тонина», при которой резко снижается крепость и другие технологические свойства шерсти.

У лактирующих самок отмечается наиболее напряженный обмен веществ, который на 23–40 % выше, чем у холостых. Таким образом, становится очевидным необходимость обеспечения лактирующих самок энергией, протеином, углеводами, жиром, минеральными веществами и витаминами в соответствии с существующими нормами, так как при недостаточном поступлении органических веществ, а следовательно, переваримой и обменной энергии у животных прежде всего снижаются удои, задерживается рост шерсти, а в дальнейшем – живая масса.

Необходимо обратить внимание фермера (крестьянина) на то, что молочная продуктивность тесно связана с уровнем протеинового питания. При недостаточном поступлении с кормом азотистых веществ вследствие снижения молочности маток плохо развиваются подсосные ягнята. Лактирующим маткам необходимо давать корма, в которых содержалось бы жира в количестве от 3 до 5 % от сухого вещества рациона. Оптимальный уровень сахара в рационах овец составляет от 2 до 4 г в расчете на 1 кг живой массы при сахаро-протеиновом отношении, равном 0,7–0,9.

Наряду с потребностью в органических веществах лактирующие овцы нуждаются в доставке минеральных веществ. Значение минеральных веществ определяется не только потребностью для нормальной жизнедеятельности организма, но и значительным количеством выделяемых зольных элементов вместе с молоком. Так, лактирующая самка при удое 1,2–1,6 л ежедневно с молоком выделяет около 12–16 г золы. В золе молока овец преобладают кальций (в среднем 0,174 %), фосфор (0,129 %), калий (0,031 %) и натрий (0,064 %). Таким образом, среднемолочная матка выделяет с молоком 2,1–2,6 г кальция, 1,5–2,0 г фосфора, 1,0–1,5 г калия и 0,8–1,0 г натрия. Считается, что при молокообразовании самки используют до половины минеральных веществ, поступающих с кормом. Следовательно, только для молокообразования лактирующим овцам необходимо дать в корме от 4,2 до 7,8 г кальция и от 3 до 6 г фосфора. Недостаток минеральных солей приводит к истощению их запасов в организме, ухудшению физиологического состояния и сказыва-

ется на продуктивности животных. Так, установлено, что недостаточное снабжение мелкого рогатого скота кальцием и фосфором в течение двух месяцев приводит к снижению удоев и содержанию жира примерно на 30 %. Недостаток железа, меди и кобальта приводит к возникновению анемии, а в конечном итоге уменьшает молокообразование.

Организуя кормление овец, необходимо учитывать, что особенно большое значение в питании лактирующих самок придается обеспечению их минеральными веществами и витаминами.

Кормление молодняка

Основной целью организации всей технологии выращивания ягнят является получение высокопродуктивных, здоровых, выносливых, хорошо оплачивающих корм и приспособленных к местным условиям животных.

Правильное кормление заключается в наиболее полном удовлетворении молодого организма в питательных веществах для его максимального роста. Важно, что при интенсивном росте меньше затрачивается кормов в расчете на единицу прироста живой массы. Ускоряя рост лучшим питанием, имеется возможность получить во взрослом состоянии наиболее крупных особей, которые отличаются высокой продуктивностью. Кроме того, в этом случае скороспелые животные значительно раньше вступают в период продуктивного использования, снижая затраты на содержание молодняка ремонтной группы.

Периоды развития ягнят от рождения до взрослого состояния разделяют условно на подсосный, или молочный (до отъема от маток) и период роста и полового созревания (от отъема до 1,5-летнего возраста).

В подсосный период существует три способа выращивания ягнят, отличающиеся сроками отъема от матерей: традиционный (отъем в 3–4,5 мес.), ранний (отъем в 60-, 45- и 14-дневном возрасте) и искусственное выращивание (с 3-дневного возраста). При всех способах выращивания новорожденные ягнята обязательно должны получить молозиво, первое кормление которым рекомендуется проводить не позже чем через 30 мин после рождения. Установлено, что естественная резистентность организма ягнят и их выживаемость тем выше, чем быстрее после рождения они получают первые порции молозива и чем чаще в первые часы сосут мать. Даже при сверхраннем отъеме ягнят и выращивании их на заменителях овечьего молока желательно, чтобы в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств они находились с матками не менее 2–3 дней, т. е. пока длится молозивный период.

Переваримость корма и обмен веществ у растущих ягнят соответствует морфологическим изменениям пищеварительного тракта. У новорожденных ягнят преобладает тип кишечного пищеварения. Основная масса принятого корма у них поступает в кишечник значительно быстрее, чем у взрослых. Это определяет необходимость скармливать суточный рацион небольшими порциями, чтобы избежать переполнения кишечника.

При переходе с молочного питания на растительные корма процесс пищеварения у ягнят постепенно изменяется: кишечный тип пищеварения заменяется желудочно-кишечным, свойственным для взрослых овец. Перева-

римось и использование питательных веществ растительных кормов к 2-месячному возрасту достигают уровня годовалых овец. Наиболее высокий обмен веществ отмечается в первые 4–5 мес. постнатального периода, когда в теле протекает интенсивный синтез веществ и активная минерализация костяка. Поэтому кормление молодняка должно соответствовать уровню развития функций системы пищеварения.

Лучшим кормовым средством для первой подкормки ягнят является овсянка (молотый овес), а затем смесь из овсянки и жмыха. Молодняку рекомендуется также скармливать смесь концентратов (овсянка, отруби пшеничные, шроты и др.). Хорошо поедается ягнятами плющенный овес, ячмень и кукуруза, а также гранулированная смесь комбикормов. В первый месяц жизни ягнята потребляют в среднем 30–50 г концентратов на голову в сутки. Концентрированные корма постепенно увеличивают от 10–20 г до 150–200 г, а племенным – до 300–400 г на голову в сутки. Одновременно с концентратами ягням дают хорошее нежное луговое сено, затем рано убранное и хорошо облиственное люцерновое и клеверное и начинают приучать к поеданию листочков веточного корма. С 2–3-недельного возраста ягнята дополнительно должны получать также подкормку из других растительных кормовых средств – травяной муки, силоса, сенажа, корнеклубнеплодов.

Впоследствии общая питательность подкормки должна примерно составлять (корм. ед.): на втором месяце жизни – 0,2–0,25, на третьем – 0,35–0,40, на четвертом – 0,6–0,65, а протеиновая питательность – соответственно 25–30; 50–60 и 65–70 г. В связи с этим ягням следует скармливать концентратов 150–250; 300 и 300–400 г соответственно, сена – 0,15–0,2; 0,2–0,35 и 0,4–0,5 кг, силоса хорошего качества – 0,2; 0,3 и 0,5 кг. Высококачественные зеленые корма включают в рацион ягнят с 8-недельного возраста. К 4-месячному возрасту хорошо развитые ягнята поедают до 2 кг зеленой массы в сутки.

Следует помнить, что при кормлении ягнят и маток сеном невысокого качества у молодняка развивается А-гиповитаминоз. Вследствие этого происходит ороговение слизистых оболочек, снижается их защитная функция, появляется усиленное слезотечение, а также истечение из ноздрей гнойных выделений; развивается ночная слепота, кератит, легочные и желудочно-кишечные заболевания. Смертность бывает высокой в результате вторичных инфекций на фоне пониженной резистентности.

В подсосный период ягням обязательно дают минеральную подкормку: с 3-недельного возраста соль в виде лизунца, а позднее размолотую соль можно смешивать с концентратами.

При выращивании молодняка овец важное значение имеет поддержание у них хорошего аппетита. Для этого необходимо использовать подкормки только высокого качества. Желательно также, чтобы максимальная продолжительность перерывов между кормлениями не превышала 6 часов. При более длительном перерыве сильно проголодавшиеся ягнята едят с большой жадностью, а переизбыток часто является причиной расстройств пищеварения у молодых животных. Чтобы избежать этого, надо строго соблюдать режим кормления.

Кормление ремонтного молодняка

Кормление молодняка после отъема от маток имеет важное значение. Особое внимание уделяют кормлению племенных баранчиков, для которых нормы на 15–20 % выше, чем для ярок. Эта разница в питательности рационов может быть покрыта преимущественно за счет концентрированных кормов, количество которых в рационах баранчиков в некоторых случаях может достигать 45–50 % по питательности.

У ягнят, полученных в зимнее время, переходный период и высокая потребность в энергии и питательных веществах после отъема от маток совпадают с началом пастбищного сезона. В условиях фермерских (крестьянских) хозяйств при выращивании племенного молодняка овец с 4-х до 8-месячного возраста рекомендуется применять пастбищное содержание, а с 8-и до 12-месячного возраста приходится на период стойлового содержания. Условия кормления и содержания должны обеспечивать получение среднесуточных приростов животных в эти периоды соответственно не ниже 150 и 100–120 г. В летний период это достигается при использовании пастбищ с обязательной подкормкой концентрированными кормами. В рационы племенных баранчиков необходимо включать 0,4–0,5 кг концентратов, а в рацион ярок – 0,2–0,3 кг на голову в сутки.

Если в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств по каким-либо уважительным причинам не представляется возможным организовать выпас ремонтного молодняка, а также при отсутствии высокопродуктивных пастбищ животных вынужденно переводят на стойлово-пастбищное содержание. При этом не реже двух раз в день им раздают свежескошенную зеленую массу и подкармливают концентратами. Суточная норма зеленого корма для ярок составляет 3–4 кг и для баранчиков – 4–5 кг, а концентрированных кормов – соответственно не менее 0,2–0,3 и 0,3–0,4 кг.

Полноценность кормления молодняка в зимний период достигается путем использования высококачественного сена, силоса, сенажа, концентрированных кормов с протеиновыми и минеральными добавками. В зимний период достижение вышеуказанных приростов обеспечивается при скормливании молодняку 0,8–1,2 кг высококачественного сена, 2–2,5 – хорошего силоса, 0,25–0,3 – концентратов для ярок и 0,4–0,5 кг для племенных баранчиков.

Необходимо обратить внимание на то, что протеиновое и минеральное питание должно быть предметом особого внимания при организации кормления племенного молодняка. При интенсивном выращивании племенных ягнят в период от 4-х до 6-и месяцев содержание переваримого протеина в рационах в расчете на 1 кормовую единицу должно составлять 120–130 г, а в годовалом возрасте – около 110 г.

Эффективность выращивания ремонтного молодняка повышается при использовании гранулированных или брикетированных кормосмесей, которые рекомендуется скормливать в сочетании с натуральными сочными и грубыми кормами.

В условиях Республики Беларусь для фермерских (крестьянских) хозяйств оптимальной является следующая структура рациона для ремонтного

молодняка: в зимний период концентраты должны составлять по питательности 25 %, сочные корма – 30–35, сено – 30–35, солома яровая – 10; в летний период: зеленые корма – 90–100, а концентрированные – 0–10 %.

6.

В приусадебных хозяйствах животных содержат в специально приспособленных помещениях различного типа. Их сооружают с учетом местных климатических условий и имеющихся строительных материалов.

В овчарнях должно быть светло, сухо, просторно. На одну овцу (с учетом зимнего ягнения, установки яслей, кормушек, поилок) площадь пола должна составлять 2,5–3 м². Исходя из возможностей, пол делают деревянным, глинобитным или земляным. Над уровнем земли он должен быть приподнят на 20–30 см. Температура в помещении не должна быть ниже 5–8 °С, а при ягнении 15–18 °С. Овцы плохо переносят сырость, поэтому в помещении постоянно должна быть сухая подстилка (солома, опилки и др.). На зиму для подстилки рекомендуется заготавливать 100–120 кг соломы в расчете на одну овцу. Окна следует располагать на высоте не ниже 1,2 м от уровня пола, необходимо предусмотреть дежурное ночное освещение.

В помещении для овец должны быть установлены кормушки, водопойные корыта и щиты для устройства временных перегородок как внутри помещения, так и в базу. Кормушки и корыта для поения должны быть такой длины, чтобы на одну овцу приходилось 30–40 см.

В зимний период в хорошую погоду целесообразно овец выгонять в оборудованный кормушкой выгульный дворик. Пребывание животных на свежем воздухе способствует повышению обмена веществ и сопротивляемости организма болезням, лучшему использованию кормов.

Овец кормят в помещениях только в непогоду (обильный снегопад, сильный мороз). Раздача кормов по кормушкам производится с помощью ручной тележки. Доступ овец к кормам свободный. Кормление поголовья осуществляется сеном, силосом, соломой и комбикормами.

В производственном здании размещаются овцематки, бараны-производители, ремонтные ярки, откормочный молодняк. Содержание животных – стойлово-пастбищное, в овчарне – на глубокой подстилке. Покрытие полов внутри овчарен твердое. Продолжительность стойлового периода – 240 дней. Продолжительность пастбищного периода – 125 дней. Случка овец проводится один раз, в августе, ягнения проходят в январе – феврале.

Для ягнения на овцеферме имеется тепляк. Ягнята вместе с матками находятся до 4-месячного возраста (период подсоса), после чего их отбивают от матерей и переводят в отдельную секцию. К отбивке ягнята весят 30–35 кг. Ежегодная выбраковка маток составляет 20%. В марте месяце проводят первую стрижку. Реализуют молодняк в возрасте 8 месяцев.

Поение животных – из групповых поилок. Уборка навоза из овчарен осуществляется 1–2 раза в год погрузчиком-бульдозером с погрузкой в самосвальные транспортные средства и вывозом в места хранения. С выгульных площадок навоз по мере накопления сгребается бульдозером, навеской и погрузчиком грузится в транспортные средства. Летом овец размещают в по-

стройках облегченного типа и пасут на пастбищах. Перед выгоном на пастбище их подкармливают грубыми кормами, дают поваренную соль, поят.

В целях лучшего использования овцами зеленой массы, предохранения ее от вытаптывания, предупреждения глистных заболеваний животных, пастбище разбивают на загоны. Площадь загона на 100 овец – 3–4 га, в каждом загоне овец пасут 5–6 дней, а затем переводят на другие места. Для профилактики пастбищных инвазий используют загонную систему пастбы с заменой пастбищных участков через 5–6 дней.

Продолжительность пастбы овец в летний период составляет 12–14, а осенью 8–9 ч. В летнюю жару в середине дня овцы плохо пасутся, поэтому в период с 10–11 и до 16–17 ч их содержат на тырле под навесами или в тени зеленых насаждений. Поят овец дважды: перед выгоном на пастбище и вечером по возвращении с него. Нельзя поить овец из стоячих источников и тем более из болот, так как это ведет к заражению глистами.

5. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КОЗОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКИХ (КРЕСТЬЯНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

1. Биологические особенности коз.
2. Молочные породы коз.
3. Правила выбора коз.
4. Доеение коз. Особенности использования козьего молока.
5. Техника разведения коз.
6. Способы выращивания козлят.
7. Кормление коз.
8. Содержание коз.

От козоводства как отрасли продуктивного животноводства народное хозяйство получает ценную продукцию. От коз получают пищевые продукты – молоко и мясо, а также сырье для промышленности – пух, шерсть, шкуры. По объему производимого пуха и шерсти козоводство занимает второе место после овцеводства.

В Республике Беларусь козоводство в промышленных масштабах не развито, в основном разведением коз занимаются только в личных подсобных хозяйствах.

1.

Среди сельскохозяйственных животных козы вместе с овцами выделяются в группу мелкого рогатого скота. Как представители одного подсемейства, козы и овцы сходны между собой по величине, живой массе, строению зубных аркад и их возрастной изменчивости, продолжительности жизни, срокам плодоношения, общей морфологии кожно-волосного покрова, пастбищному образу жизни и некоторым другим признакам.

Козы отличаются от овец по ряду биологических особенностей. Главнейшим из них является различие диких родичей и нескрещиваемость между собой овец и коз в естественных условиях. Искусственное осеменение, а

также введение чужеродной спермы в воронку яйцевода оперативным путем не приводит к получению гибридов.

В клетках коз содержится 60 хромосом, а у овец – 54. Дикие родичи у коз и овец разные; неодинаковы у них свойства белковой сыворотки крови, а также различен состав молока.

Козы отличаются от овец по ряду анатомических признаков. У козлов рога более плоские и сближенные у основания, спирально закручиваются вокруг вертикальной оси, а в поперечном сечении имеют форму треугольника с острой передней гранью. У баранов рога более квадратной формы, а закручиваются они вокруг горизонтальной оси. Лоб коз выпуклый, носовые кости прямые. Лоб овец более плоский, а носовые кости выпуклые. У коз на черепе нет слезных ямок, а на конечностях – межкопытных железок. К отличительным признакам коз относятся: специфический голос, наличие у обоих полов бороды, короткий голый с нижней стороны хвост и сережки, часто имеющиеся на шее.

Козы отличаются от овец более крепким телосложением, сухим и угловатым складом экстерьера. По-разному происходит у них и жиротложение. Если для овец характерно хорошее развитие мышечной и подкожной жировой ткани, то у коз даже жирной и вышесредней упитанности они развиты значительно слабее. При этом у коз на внутренних органах отлагается значительно больше жира чем у овец. Скелет, мышцы и сухожильно-связочный аппарат коз, как типично горных животных, приспособлены к быстрому передвижению по крутым скалистым пастбищам. Экстерьер овец, обитающих преимущественно на степных просторах, специализирован в направлении быстрого бега на плоскости.

Козы превосходят овец по степени приспособляемости к различным климатическим условиям. Они способны акклиматизироваться в разнообразных, в том числе суровых экологических условиях. Козы отличаются высокой резистентностью: они мало восприимчивы к заболеванию туберкулезом, оспой и чумой. Если у овец сильно развит инстинкт стадности, то козы могут пастись как группами, так и поодиночке, а в отарах овец они всегда идут впереди. Козы отличаются от овец более высокой половой потенцией, энергичным темпераментом.

Козы неприхотливы и относительно нетребовательны к условиям кормления и содержания. Как и у овец, у них голова с заостренной мордой, подвижными губами и тонкими долотообразными острыми резцами. Это позволяет им низко скусывать траву и подбирать нежные листья и стебельки на пастбище. Козы более подвижны, поэтому поедают значительно больше различных растений и находят корм в любых условиях. Кишечник у козы в 27 раз длиннее ее туловища, а отделы желудка относительно лучше развиты, чем у овцы. Благодаря более мощному и хорошо развитому пищеварительному тракту козы хорошо используют кустарниковый и древесный корм, содержащий большое количество полисахаридов. В частности, они обладают возможностью переваривать кормовые средства, содержащие до 64 % клетчатки.

Козы отличаются от крупного рогатого скота более высоким уровнем обмена веществ. Они поедают в сутки от 6 до 10 % сухого вещества корма по отношению к собственной массе тела, а коровы лишь 2,5–3 %. Характерно также, что удой коз в 8–15 раз превышает их живую массу, а у коров обычно в 5–8 раз, т.е. интенсивность молокообразовательного процесса в расчете на единицу живой массы у мелкого рогатого скота выше, чем у крупного рогатого.

Видовой ассортимент козьей шерсти беднее овечьей. Существенные морфологические различия наблюдаются и в кожно-волосном покрове сравниваемых родов. Шерсть коз менее жиропотна, весной за редким исключением, линяет, тогда как овцы тонкорунных и полутонкорунных пород не подвержены линьке. Не существует пород коз с руном подобно мериновому, состоящему из одного пуха. Козий пух отличается от овечьего прочностью, тониной и прядильными свойствами, он лучше удерживает краситель. Энергия роста шерсти у коз специализированных шерстных пород выше, чем у кроссбредных овец. Кожа коз более подвижна и эластична. Козлины характеризуются повышенными физико-технологическими свойствами и по качеству превосходят овчины.

Козы – удивительные домашние животные, которые в жизни крестьянина занимают особое место. По своей сообразительности они недалеко отстают от собак. Козы любят своих хозяев и трогательно к ним привязываются. Они узнают их по голосу, издали громко приветствуют дружным блеянием. Коза больше симпатизирует тому, кто ее кормит и ухаживает за ней, но при этом она хорошо знает и других членов семьи хозяина.

Козы хорошо пасутся как небольшими группами, так и в одиночку, на небольших участках. Пасутся они обычно недалеко от дома. Однако встречаются и очень смелые особи, которые могут уйти довольно далеко. В основном это своенравные и бодливые животные. Таких приходится постоянно держать на привязи, чтобы долго не разыскивать. Козы хорошо используют пастбища на привязи, для чего используют длинную веревку, один конец которой крепится на стальном штыре, вбиваемом в землю, а второй привязывается за ошейник козы. В таком положении коза может пастись в течение нескольких дней в зависимости от продуктивности пастбищного участка.

После пастьбы козы обычно отдыхают на возвышенности, чтобы хорошо видеть местность и вовремя заметить приближающуюся опасность и спастись бегством. Почти все козы панически боятся собак.

Козы не любят одиночества, поэтому целесообразно содержать не менее двух коз. Вместе им спокойнее, смелее и веселее, они больше дают молока при совместном содержании. Козы очень любят, когда их пасет человек. Между тем, козы достаточно своенравные животные, они любят свободу и самостоятельность. Постоянная неволя угнетает этих животных, делает упрямыми и даже злобными.

Домашние козы – любопытные и темпераментные животные. Однако они склонны к различным вредным привычкам и плохим действиям – перелезают через ограждения, обгладывают декоративные деревья и кусты. Но к наиболее часто встречающимся нежелательным действиям относится выса-

сывание молока из собственного вымени или друг у друга. Обнаружив такую привычку, козе на вымя надевают воздухонепроницаемый мешок, фиксируя его через поясницу. Против самовысасывания молока применяют также оголовье с намордником, снабженное острыми зубчиками, которые колют вымя при соприкосновении с ним, вызывая боль, что препятствует сосанию. У козлов иногда встречается дурная привычка высасывать собственный эякулят. Это приводит к снижению оплодотворяющей способности или даже к полной непригодности самца как производителя. При отборе коз для разведения учитывают все недостатки и плохие привычки у предков. Наличие их служит причиной выбраковки потомства и убоя на мясо.

Козы очень чистоплотные и брезгливые; при нескученном содержании и наличии достаточной площади они обычно выбирают одно место и постоянно там оправляются, а то место, где они постоянно лежат и отдыхают, всегда у них сухое и чистое. У коз отлично развито обоняние. Неприятно или необычно пахнущий корм они пробовать не станут. Сено, упавшее даже на чистую подстилку, коза есть не станет. Откажется она и от сена, полежавшего в кормушке, так как оно пропиталось запахами сарая. Грязную, плохо пахнущую воду коза тоже пить не захочет, даже если будет испытывать сильную жажду. У коз очень чувствительные губы, ими они тщательно перебирают еду, поэтому проглотить посторонний предмет практически не могут в отличие от крупного рогатого скота, который глотает практически непережеванный корм, поэтому может «съесть» гвоздь, проволоку, веревку или другой предмет.

В Республике Беларусь наиболее распространены молочные породы коз как зааненская, русская белая, тоггенбургская, нубийская.

2.

Зааненская порода. Выведена в Швейцарии в конце 19 века. Зааненские козы самые крупные в мире. Высота в холке 77–95 см. Живая масса козлов 70–80 кг, коз – 50–60 кг. Голова сухая, средней величины, комолые, с ушами стоящими «рожкой». На шее имеются кожные выросты-сережки. Туловище длинное, глубокое и широкое. Костяк крепкий. Кожа плотная тонкая. Вымя большое, развитое, шаро- или грушеобразное с двумя крупными сосками. Масть белая. Шерсть короткая, слаборазвитая. Нрав спокойный, кроткий. Лактационный период длится 10–11 месяцев, удои – 700–800 кг молока жирностью 3,8–4,5 %. В хороших условиях разведения могут давать 1000–1200 кг в год. Рекордные удои 2500–3000 кг. На 100 маток получают от 180 до 250 козлят.

Русская белая порода. Выведена в России. Имеет небольшие размеры туловища. Высота в холке 65–80 см. Живая масса козлов 60–80 кг, коз – 40–50 кг. Телосложение пропорциональное, крепкое. Голова небольших размеров, легкая. Уши средней длины, стоячие. Рога крупные, серповидной формы. У всех представителей породы имеется борода. Туловище удлиненное, бочкообразное.

Грудь широкая, выпуклая. Спина прямая, круп без отвисания. Брюхо объемное. Ноги тонкие с хорошо развитыми суставами. Вымя объемистое

грушевидной или круглой формы с небольшими сосками. Масть белая. Шерстный покров состоит из грубой, короткой ости, подшерстка почти нет. Лактационный период длится 7–8 месяцев, удои – 600–700 кг молока жирностью 4–5 %. Плодовитость высокая: на 100 маток получают 190–200 козлят.

Тоггенбургская порода выведена на северо-востоке Швейцарии в 18 веке. Тоггенбургская коза отличается небольшими размерами. Высота в холке 60–80 см. Живая масса козлов 60–80 кг, коз – 40–55 кг. Животные имеют крепкую конституцию и гармонично сложенное туловище. Голова длинная, профиль прямой. Уши небольшие, стоячие, узкие. Козы комолые, козлы встречаются с рожками. Шея длинная, ребра выпуклые, спина прямая. Вымя большое. Шерсть насыщенно коричневого цвета, ноги и уши – белого. На морде проходят две параллельные белые полосы. Лактационный период длится 9–10 месяцев, удои – 400–1000 кг молока жирностью 3–4 %. На 100 маток получают от 200 до 250 козлят.

Нубийская порода. Выведена в республике Намибии Южной Африки. Козы крупные, туловище длинное и узкое. Высота в холке 75–90 см. Голова короткая, нос горбатый. Уши большие, плоские, широкие, длинные, висячие. Шея тонкая, длинная. Вымя большое, соски длинные. Конечности тонкие, длинные и прямые. Шерсть короткая, шелковистая и тонкая. Козы комолые. У козлов рога небольшие, короткие, загнутые назад. Масть разнообразная: белая, черная, кремовая, коричневая, бурая с черными или белыми пятнами. Живая масса козлов 55–70 кг, коз – 40–55 кг. Лактационный период длится 10–12 месяцев, удой составляет 700–900 кг молока жирностью 5–8 %. Козы многоплодны, приносят по 3 козленка за козление. На 100 маток получают от 180 до 250 козлят.

3.

В зависимости от ведущего направления продуктивности коз отбирают по специфическим признакам. Коза должна иметь внешний вид, присущий животным только данной породы. Прежде всего следует обратить внимание на то, как выглядит животное. Так, угнетение козы, безразличие к окружающим может быть связано с болезнью. У здорового животного бодрый вид, а шерсть должна быть гладкой и блестящей, ровно покрывающей все тело. Взъерошенная, тусклая и клочковатая шерсть свидетельствует о болезни или плохом кормлении. Глаза должны быть с характерным блеском, без изъязнов и истечений, особенно гнойных, так как это признак простудного заболевания. Нос должен быть чистым, дыхание ровное, легкое, бесшумное. Во время вдоха и выдоха коза не должна испытывать затруднений. Здоровая коза свободно ходит и бежит. Скованность, излишняя осторожность и хромота указывают на болезненность конечностей. Причиной может служить несвоевременная расчистка копыт, что вполне устранимо, но может быть и заразное гнилостное заболевание – копытная гниль. Микроб, вызывающий это заболевание, способствует развитию некроза копытного рога. Поражение копыт начинается с межкопытной щели, при этом исходит очень неприятный гнилостный запах. В тяжелых случаях, если не проводят срочного лечения, копыта могут полностью разрушиться. В этом случае животных срочно вы-

браковывают, так как они являются источником распространения инфекции. Хромота может быть вызвана и поражением суставов, тогда легко заметить припухлость, довольно болезненную при прощупывании.

У правильно выращенного животного спина ровная. Если коза горбится, то можно предположить, что у нее что-нибудь болит или ей холодно. Поэтому лучше осматривать ее в теплом месте. У рахитичной и старой козы часто наблюдается провислая спина. Искривление (Х-образное или О-образное) конечностей указывают на недостаточное питание, нехватку минеральных веществ, рахит. От такого животного не следует ожидать высокой продуктивности.

Фермеру (крестьянину) можно посоветовать: отправляясь приобретать козу, захватить с собой сухарики, которые козы очень любят. Аппетит является одним из показателей поведения животных. Надо угостить животное и посмотреть, как оно будет есть. Если у козы нет болезненности десен, языка, зубов, то сухарики будут быстро съедены. Если же есть какие-то поражения, то она долго будет катать сухарик во рту, перекладывая его то на одну, то на другую сторону челюсти.

При покупке козы лучше выбирать животное покрупнее, так как оно более сильное, а следовательно, и продуктивность будет выше.

По конституции и экстерьеру судят о принадлежности коз к породе, правильности сложения и приспособленности к конкретным условиям разведения, отличают пороки. Животных осматривают как в неподвижном состоянии, так и во время движения – спереди, сбоку и сзади, чтобы определить форму рогов, глубину груди, правильность постановки конечностей. Оценивают и другие экстерьерные стати – линию спины, крестца, развитие вымени, сосков и зубов. Осмотр животных в движении позволяет не только лучше рассмотреть и уточнить их морфологические особенности, но и сделать ряд наблюдений физиологического характера. Кроме того, желательно выяснить качество матери осматриваемой козы – продуктивность, плодовитость, поведение, способность поедать те или иные корма. При покупке животного, помимо указанных признаков, необходимо также узнать о его поведении, привычках и вкусах. Все это поможет избежать ошибок и неудач при приобретении козы.

Выбор коз молочного направления продуктивности. Козы данного направления продуктивности должны иметь высокую молочность. Опытный козовод может по внешнему виду животного определить в той или иной степени его молочные качества. Так, для молочных коз характерны общие признаки.

Особое внимание при выборе козы надо обратить на вымя. Оно должно быть гладким, необросшим (без грубого волоса), с тонкой эластичной кожей, хорошо развитым, объемистым, иметь конусообразную или грушевидную форму, равномерно развитые молочные железы, хороший передний и задний запас. У полностью выдоенного животного, когда вымя от молока совсем опорожнено, образуется обширный запас, представленный многочисленными тонкими складками кожи кожного мешка, в котором находится мо-

лочная железа. Чем запас объемистее, мягче и нежнее, тем коза считается молочнее.

Молочное вымя должно быть на ощупь настолько упругим, что с трудом сдавливается руками, а немолочное – рыхлое и вялое, тестообразное. У козы с низкой молочной продуктивностью вымя небольшого размера и после выдаивания мало изменяет свою форму и размер. Вымя большое, но не спадающее после дойки, считается жировым, а коза с такой молочной железой не будет давать большого количества молока. Вымя не должно быть мешкообразным и низкоопущенным. Отвислое и болтающееся при ходьбе вымя будет очень легко травмироваться и мешать при быстром движении козы. Постоянные травмы, даже незначительные, могут привести к маститу и ранней выбраковке животного. Вымя должно иметь хорошее прикрепление к туловищу, а срединная связка, поддерживающая его, быть достаточно прочной; оно должно располагаться высоко и быть широким у основания. Изъяном считается вымя, разделенное бороздкой на две доли, с маленькими, короткими сосками.

Кожа у молочных коз обычно плотная, но тонкая, подвижная и легко оттягивающаяся на бедрах, покрытая нежной блестящей шерстью. Окраска или масть козы не может быть признаком молочности, но она должна соответствовать той породе, к которой животное принадлежит. Комолость также не является признаком высокой продуктивности.

О молочности козы можно судить по молочным венам и молочным колодцам. Молочные вены начинаются от вымени и переходят на брюхо, а там, где они входят в полость тела, образуются молочные колодцы. Чем крупнее молочные вены и шире колодцы, тем молочнее считается коза.

Когда вымя выдоено, оно должно быть мягким и эластичным, без излишней мясистости, а при прощупывании не должно наблюдаться болезненности, затвердения или припухлости, так как это указывает на воспаление вымени – мастит. Нужно также проверить, нет ли в долях крепких утолщений, которые могут быть признаком прошлых маститов.

Необходимо также обращать внимание на форму сосков и их состояние. На них не должно быть трещин и бородавок. Соски должны быть упругими, хорошо развитыми (средней величины или довольно объемистыми) и удобными для доения, направленными несколько вперед и в стороны. Следует помнить, что слишком длинные соски оказываются тугодойками. После выдаивания на сосках должны образовываться складки в виде запаса кожи.

Если у маленькой козочки еще не развито вымя, требуется посмотреть ее ближайших родственников для того, чтобы можно было спрогнозировать ожидаемую продуктивность. Чтобы риск был наименьшим, для разведения лучше покупать молодняк, происходящий от высокопродуктивной молочной матери. У молодых козочек вымя должно быть хорошо заметным, размером с небольшой кулачок.

Цвет вымени может быть белым (розовым) или темным (черным), что зависит от масти животного.

У коз довольно часто около основных сосков встречаются рудиментарные. Молока в них нет и они обычно не мешают дойке. Существует оши-

бочное мнение, что коза с лишними сосками дает мало молока. Это неверно: научно доказано, что добавочные рудиментарные соски не влияют на продуктивность козы. Единственный недостаток этого заключается в том, что козлята могут рассосать их. Именно по этой причине лишние соски обычно считают достаточно серьезным дефектом. Однако может быть и другое решение данной проблемы – не держать козлят на подсосе.

При покупке козленка следует придерживаться тех же принципов, что и при выборе взрослого животного. Здоровая козочка обычно живая, бойкая, веселая. Если же она безучастно лежит, ей нездоровится. В таком случае следует сразу установить наличие или отсутствие поноса. Для этого следует обратить внимание на хвост и шерсть в области заднепроходного отверстия. Они не должны быть мокрыми и грязными, что свидетельствует о поносе, а для коз он просто губителен (особенно это относится к молодняку). Козлята часто погибают от диспепсии, так как это заболевание у них практически не поддается лечению.

У маленьких козлят следует внимательно осмотреть пуповину, так как она может нагнаиваться из-за попадания инфекции с загрязненной подстилки. При этом будет видна увеличенная в размерах пуповина, заметна болезненность, могут наблюдаться истечения с неприятным гнилостным запахом.

Обращают также внимание на живот козленка. Он должен соответствовать размерам малыша. Если же живот надут, то у малыша расстройство пищеварения, которое нормализовать очень сложно. Большой, плотный живот говорит о значительной глистной инвазии, от которой необходимо как можно скорее избавиться.

Покупая животных, необходимо помнить, что резкая смена корма, особенно у маленьких козлят, вызывает расстройство пищеварения. Переводить коз с одного корма на другой нужно в течение недели, добавляя к привычному корму немного нового, постепенно увеличивая его долю в рационе.

В новой обстановке коза первое время будет скучать и даже может резко снизить продуктивность. Но через 7–10 дней она, как правило, забывает своих прежних владельцев и привыкает к новым. Привыкание пойдет быстрее, если животное будет не одно. Фермеру (крестьянину) следует помнить, что коза не любит одиночества. Так что предпочтительнее сразу приобрести двух коз, козу и козла, или матку с козлятами. А еще лучше купить пару молоденьких козочек. Маленькие козочки быстрее привыкают к новому владельцу.

Молоко у коз иногда может иметь специфический запах, и пить его не очень приятно. Чтобы определить, будет пахнуть молоко или нет, следует понюхать морду козы. Молоко плохо пахнет у животных, от морды которых исходит запах, напоминающий чесночный. У козы с хорошим молоком от морды исходит легкий специфический запах, не вызывающий неприятных ощущений. Кроме того, при покупке козы следует попробовать молоко, лучше холодное (например, вчерашнее), так как в нем все запахи становятся сильнее, а в парном их можно не заметить. Пробу молока нужно снять и для того, чтобы узнать его вкус: оно может быть сладковатым, солоноватым или почти безвкусным.

4.

Молочная продуктивность коз зависит от многих факторов, и, прежде всего, от их породных особенностей, условий кормления и содержания, способов и сроков доения, возраста животных и методов выращивания козлят в молочный период. Козы специализированных молочных пород отличаются продолжительностью лактационного периода (9–10 месяцев) и постепенно понижающейся кривой удоев.

Крестьяне (фермеры) обычно начинают доить обильномолочных коз сразу после рождения козлят. Приплод с первых дней жизни содержат отдельно, выпаивая ему материнское молоко. Такой метод выращивания молодняка трудоемок, но он дает возможность получить от коз максимум молочной продукции.



Рис.20. Станок для доения коз

На фермах козоводческих хозяйств, производящих молоко для потребительских целей, самок традиционно начинают доить после отбивки от них козлят в 3,5–4,5-месячном возрасте. Сначала их доят 2 раза в сутки, а в конце лактации – однократно. В некоторых хозяйствах практикуется поддаивание подсосных маток. В этом случае приплод ежедневно на некоторое время отделяют от матерей, а после поддоя опять подпускают к ним. Такой метод выращивания козлят в молочный период называется

подсосно-поддойным. Отчуждать часть молока от козлят допустимо лишь при условии, что это отрицательно не повлияет на их рост. В частности, можно поддаивать раз в сутки лишь обильномолочных взрослых самок с одним козленком. При этом начинают поддой не ранее достижения молодняком 8–10-недельного возраста, когда он может хорошо поедать растительные корма. Козлят подкармливают концентратами. Если они начинают отставать в развитии, поддаивать их матерей прекращают.

Ручное доение. Доение лучше всего осуществлять при помощи специального станка, обладающего фиксирующим устройством. Его конструкция довольно проста: из досок делается небольшой помост с ограждением, а чтобы животное не слишком волновалось и спокойно стояло в станке, впереди устанавливают кормушку. Сзади устраивают фиксирующее приспособление, один конец которого должен быть укреплен шарнирно, а другой свободно двигаться между планками.

Непосредственно перед доением козу заводят на помост и ставят в клетку таким образом, чтобы животное не могло двигаться назад или вперед. С целью фиксации животного в планках (между которыми передвигается рейка) делают для штыря отверстия. Чтобы коза во время дойки стояла спокойно, в кормушку нужно положить корм (любимое лакомство). Козы быстро привыкают к станку и охотно туда идут, часто даже отдыхают в нем. Козы, которые доятся всегда в определенном месте, никогда не загрязняют его экскрементами. Однако место доения всегда следует очищать от случайно попавшего туда навоза и другого мусора.

В пастбищных условиях, когда животные все время передвигаются, коз для доения привязывают за шею к натянутой на колья шерстяной веревке с петлями, которую называют коган.

Для доения коз следует отводить специальное место, расположенное на удалении от стада. Это должно быть спокойное место, чтобы никакие отвлекающие факторы не мешали процессу доения. Доить, а также содержать коз следует в чистом помещении, так как молоко быстро воспринимает различные посторонние запахи. С этой же целью нужно постоянно заботиться о чистоте стойла (в нем не должен копиться навоз и другие отходы) и помещения, которое перед и после дойки необходимо проветривать. При опрятном содержании дойных коз их молоко не обладает каким-либо неприятным привкусом или специфическим запахом.

Молочная продуктивность коз в значительной степени зависит от соблюдения правил доения, его кратности, а также от умелого ухода за выменем.

Зимой молочных коз необходимо доить дважды в день – в 8 и 20 ч, летом – трижды – в 7, 14 и 22 ч, причем при двухразовой дойке интервалы должны быть 12 ч, а при трехкратной – 8 ч. Молодых коз рекомендуется доить 3 – 4 раза в сутки, так как это способствует разработке альвеолярного отдела вымени.

Массаж вымени перед дойкой в течение 1–2 минут способствует лучшей молокоотдаче козы. Каждую половину вымени лучше массировать поочередно. Для этого обеими руками захватывают одну половину вымени и растирают его со всех сторон, приподнимая при этом молочную железу слегка вверх и немного сжимая, затем, продолжая массировать, опускают вымя вниз. Такие приемы массажа повторяют 4–5 раз с каждой половиной молочной железы. Во время массажа возбуждается рецепторный аппарат и разрабатывается железистая ткань вымени. Проводят его обычно после обмывания вымени теплой водой с температурой 36–38°С и обсушивания полотенцем. Значительные отклонения в температуре воды могут вызвать обратную реакцию у козы и снизить рефлекс молокоотдачи. Обмывание и массаж улучшают кровообращение, увеличивая продуктивность.

Доить козу лучше в определенное время – так вырабатывается инстинкт молокоотдачи. Большие перерывы между дойками отрицательно влияют на продуктивность. Частота доения коз зависит от уровня продуктивности. Если самка дает 2,5 кг молока в сутки, ее можно доить 2 раза, а при более высоком удое – 3 раза. Практика убедительно показала, что трехкратная дойка увеличивает количество молока иногда на 20 %.

Дойку хорошо сочетать с кормлением животного концентратами, так как в этом случае коза будет спокойнее стоять, меньше беспокоиться и лучше отдавать молоко. Во время доения на козу нельзя кричать и наказывать ее. Это может вызвать полное прекращение молокоотдачи, а большое скопление молока приводит к разрыву альвеол молочной железы, маститу или разрастанию соединительной ткани вымени. В итоге снизится продуктивность, а козу придется преждевременно выбраковать. Во время доения с козой нужно об-

ращаться ласково, разговаривать с ней, часто произносить ее кличку. Ногти доярки должны быть коротко острижены, а руки чисто вымыты.

Доярка садиться сбоку животного. Однако прежде чем приступить к доению, нужно тщательно обмыть вымя теплой водой и насухо вытереть его чистым полотенцем. Затем каждая доля вымени поочередно массируется. Доят коз так же, как коров, т. е. сбоку. Первые струйки молока сдаивают в отдельную посуду, так как в них могут содержаться бактерии. Доить козу предпочтительно кулаком. Такой способ дойки используется при больших, хорошо развитых сосках. Щипком доят в том случае, если соски маленькие. Однако можно использовать комбинированный способ доения: основное молоко извлекать кулаком, а остатки – щипком. Доить козу можно двумя руками и поочередно – одной.

Техника доения кулаком такова: сначала каждый сосок захватывают у основания большим и указательным пальцами, передавливая его как лигатуру, и равномерно сжимают несколько раз до появления струек молока. Затем выдавливают молоко из вымени последовательным ритмичным сжатием сосков пальцами – указательным, средним, безымянным и мизинцем. Дойку следует проводить по возможности быстро, спокойно и без перерывов. Выдаивать коз нужно до конца, полностью, так как последние струйки молока содержат больше жира. Доение козы заканчивается массажем вымени со всех сторон мягкими круговыми движениями сверху с небольшим усилием к низу. Затем вымя вытирают полотенцем насухо. Во избежание трещин соски необходимо смазать вазелином, ланолином, сливочным маслом или детским кремом. Нельзя применять мази, имеющие сильный запах, который впитывается в молоко.

Машинное доение. Для достижения лучшего результата необходимо использовать доильные аппараты, предназначенные специально для коз, иначе возможны проблемы с надоем и со здоровьем животных.

Во время доения нужно следить за каждым соском – делать это позволяют специальные прозрачные вставки в стаканах. При прекращении поступления молока в один из стаканов, необходимо перегнуть шланг и снять его с соска. Перегибом шланга предотвращается засос воздуха и попадание вместе с ним в молоко пыли, запахов и бактерий. Для этого должны быть подготовлены специальные пробки, которыми можно заткнуть доильный стакан, пока остальные еще находятся на сосках.

Машинное доение требует определенного навыка, так как неправильное расположение стаканов на сосках, или неправильные настройки пульсаций и степени вакуума могут нанести вред животному. Так что здесь всегда необходимо следить за оборудованием, ведь от его работы зависит качество молока, здоровье коз и, в конечном счете – эффективность работы всей фермы.

Полученное молоко обязательно нужно процедить через несколько слоев марли или пропустить через другие фильтры. Затем его охлаждают до температуры не выше 10–15 °С и доставляют на молокоприемный пункт или перерабатывают на месте. Чем раньше и сильнее охлаждено молоко после дойки, тем дольше оно сохранит свои бактерицидные свойства.

5.

Воспроизводство потомства у коз обусловливается тремя взаимосвязанными между собой физиологическими процессами – половой охотой, течкой и овуляцией.

У коз средняя продолжительность полового цикла составляет 24–48 ч с возможными колебаниями от 12 до 72 ч. Внешними признаками течки у коз служат покраснение и припухание наружной части влагалища и выделения из него тягучей жидкости. Овуляция обычно происходит через 32–34 ч после наступления охоты. Если во время половой охоты коза не была покрыта или оплодотворение не произошло, то охота у нее вновь возникает через 3 недели.

Возраст первой случки. Половая зрелость у коз наступает в 5–6-месячном возрасте. Однако у козочек первая охота может наступить в возрасте 4 месяцев. Но при такой ранней случке последующее развитие животных, особенно козочек, задерживается, а приплод рождается мелкий и слабый. В связи с этим традиционно рекомендуется пускать их в первую случку только в 16–18 месяцев. К этому времени организм козочек полностью формируется и готов приносить лучшее потомство.

В случку козлик может идти уже в 6-месячном возрасте. Традиционно молодого козла рекомендуется начать интенсивно использовать для размножения в возрасте от 10 до 12 месяцев. Воспроизводительная способность самца длится приблизительно 10 лет. Однако с 6-летнего возраста половая активность козла обычно начинает уменьшаться, а, следовательно, снижаются оплодотворенность самок и качество приплода.

Сроки проведения случки. Как правило, коз случают сезонно. На проявление охоты у коз влияет свет: она обычно наиболее интенсивно проявляется на 10-й неделе после наиболее длинного дня года. В Республике Беларусь в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств случку коз целесообразно проводить в период с августа до середины ноября. Однако лучше всего покрывать козу в августе–сентябре, тогда окот произойдет в январе–феврале.

В зимнее время матки приносят наиболее крепкое и жизнеспособное потомство. Если необходимо получить приплод на племя, то коз случают именно осенью, чтобы молодняк выращивать летом. К началу лета козлята зимнего окота успевают хорошо подрасти и окрепнуть, они уже хорошо поедают пастбищную траву и быстро прибавляют массу тела. Но выращивать козлят зимнего окота надо в теплом помещении, чтобы уберечь их от простуды. Кроме того, надо иметь запас хороших кормов, чтобы обильно кормить матку после окота и получить от нее много молока. Если таких условий у фермера (крестьянина) нет, то покрывать коз следует в ноябре–декабре, чтобы окот приходился на теплое время года (апрель–май), когда нет потребности в теплом помещении, а для маток появляется подножный корм. Несмотря на то, что козлята весеннего окота обычно уступают по развитию молодняку зимнего и ранневесеннего окотов, но при правильном выращивании они хорошо растут и развиваются и обычно к осени догоняют козлят более раннего срока рождения.

Проведение случки коз. Подготовку животных начинают не позднее чем за 1,5 месяца до начала случной кампании. Коз следует пускать в случку

в состоянии заводской упитанности. Козы недостаточно упитанные и ожиревшие, плохо приходят в охоту и не все оплодотворяются, поэтому менее плодовиты и чаще остаются яловыми. В предслучной и случной периоды им вводят достаточное количество разнообразных зеленых, сочных и концентрированных кормов. Недостаточно упитанных коз выделяют отдельно для усиленной подкормки концентратами.

Созревание половых клеток у козлов длится 45–50 дней, их начинают подготавливать к случной кампании за 2 месяца до ее начала. В состав рационов козлов-производителей в предслучной и случной периоды вводят достаточное количество высокопротеиновых кормов. К стимулирующим сперматогенез кормам относятся овес и другие зерновые, отруби, жмых, сено бобовых трав. При усиленном племенном использовании козлам дают молоко, обрат и куриные яйца.

В условиях фермерских (крестьянских) хозяйств, а также личных подворий граждан обычно прибегают к естественной случке коз. Племенные козлы в таком случае используются менее эффективно. На средних и мелких фермах распространена ручная случка, при которой племенной козел может покрыть ограниченное количество коз. Так, нагрузка за случной сезон на молодого производителя обычно не превышает 30–40 маток, а на взрослого – от 50 до 75–80 (при 3–4 садках в день). Нагрузку на козлов в течение дня следует распределять равномерно. После каждой садки делают перерыв. В первый половине дня производителю дают возможность сделать 2–3 садки, а затем ему предоставляют 2–3-часовой отдых для кормления и прогулки.

Основные признаки охоты. Первыми признаками наступающей половой охоты является общее возбуждение, что определяется по изменению поведения коз. В это время самки ведут себя необычно и беспокойно: у них происходит частое мочеиспускание и беспрестанное блеяние, а также отказ от корма или поедание его без аппетита. Коз привлекает запах козла, поэтому они постоянно принюхиваются и стремятся к самцу, а также без устали трясут и виляют хвостиками. Самки, у которых начинается половая охота, могут спровоцировать других коз к беспокойному поведению и вызвать вскакивание на себя. У коз, пришедших в охоту, наружные половые органы отекают и припухают, становятся розовыми или даже красными и из них истекает слизь. Влагалищные выделения в начале охоты обычно густые и непрозрачные, в течение охоты они жидкие и чистые, а в конце охоты – опять густые и мутноватые. Козы допускают прыжки на себя козлов, проявляя при этом рефлекс спокойного состояния.

Уход за сукозными матками, подготовка помещения и проведения козления. Наиболее простым и дешевым методом контроля за беременностью служит наблюдение за проявлением охоты. Так, если коза не приходит в охоту в течение 3-х недель после случки, то она оплодотворена.

Обильномолочных коз, в период сукозности часто продолжают доить. За 8 недель до предполагаемого козления их прекращают доить, т. е. запускают на сухостой, так как плод в этот период очень интенсивно растет и требует много питательных веществ. Кроме того, дойка в последние месяцы сукозности истощает матку и ее последующая молочная продуктивность сни-

жается (вплоть до следующей беременности и нормального запуска). В этом случае козлята рождаются слабыми, плохо растут из-за нехватки питательных веществ, которые затрачивались на продуцирование молока. При несвоевременном или запоздалом запуске, особенно если это неоднократно повторяется, у коз наблюдаются выкидыши, а иногда наступает даже бесплодие.

За 2 недели до родов количество концентратов в рационе самок снижают на 50 %, а за 5–6 дней их дают совсем мало.

Для проведения козления и выращивания молодняка используют обычные кошары, которые должны быть светлыми, сухими, чистыми, без сквозняков, но с хорошей вентиляцией; при содержании животных в них должна поддерживаться положительная температура (8–120 С). В кошаре оборудуют клетки (кучки) для индивидуального содержания маток с родившимся приплодом площадью от 1,5–1,8 до 2,2–2,5 м². В расчете на 100 маток таких клеток должно быть 10–15. В каждой клетке устраивают ясли, кормушку и водопойное корытце. Часть кошары разгораживают на оцарки площадью 6–8 м², предназначенные для группового содержания маток с козлятами, куда их переводят из клеток-кучек. Кроме того, отгораживают клетку площадью от 8 до 12 м², используемую в качестве родильного отделения, а в дальнейшем – также для группового содержания маток с козлятами.

Между оцарками устраивают подкормочные площадки для молодняка. В стенках двух смежных оцарков делают отверстия (лазы) такой величины, чтобы через них на подкормочную площадку свободно проходили козлята, но не могли проникнуть матки. У стенок клеток, обращенных к проходу, устраивают комбинированные кормушки для грубых, концентрированных и минеральных кормов и водопойные корыта.

Подготовка помещения и инвентаря должна начинаться за месяц до начала козления маток. Помещение, где оно будет проводиться, клетки подкормочные площадки и инвентарь дезинфицируют. Пол устилают соломой. Для предохранения козлят от сырости и сквозняков заделывают щели в стенах кошары, ремонтируют двери, окна и крышку.

Сукозность (беременность) маток продолжается в среднем 147 суток (с колебаниями от 140 до 158).

С приближением родов коза проявляет беспокойство: она оглядывается назад (на живот); взбивает подстилку, готовя себе мягкое ложе; часто ложится и встает, будто не находит для себя удобного положения, чтобы отдохнуть; слегка тихо постанывает, а также жалобно блеет и отказывается от корма.

Первые потуги заметить трудно. Более старшие самки, особенно упитанные, могут проявлять лишь небольшое беспокойство вплоть до родов, молодые же козы могут беспокойно вести себя в течение суток. Во время потуг матка прогибает спину и поднимает хвост. Перед наступлением второй стадии родов коза освобождается от содержимого кишечного тракта и мочевого пузыря. Большинство самок с началом этой стадии ложатся (по крайней мере, ненадолго). Во вторую стадию происходит изгнание плода.

У здоровой козы окот проходит обычно легко и быстро. Длительность выведения первого плода всегда более продолжительная. При двойневой бе-

ременности первый плод выводится дольше, чем при тройневой или четверневой. Второй и последующие плоды выводятся быстрее. Интервалы между выведением плодов колеблются от 12 до 42 минут.

У окозлившейся матки тщательно очищают загрязненный шерстный покров на хвосте и на ляжках, выстригают шерсть вокруг вымени. Молочную железу обмывают теплой водой и насухо вытирают чистым полотенцем, первые струйки сдаивают в отдельную посуду. Только после этого козлят подсаживают под вымя матери. Новорожденный молодняк, еще как следует не обсохнув, обычно поднимается на ноги и начинает сосать мать. Слабому козленку нужно помочь найти сосок и обязательно добиться, чтобы он пососал молозиво матери. В тех случаях, когда козленок настолько слаб, что не может сосать сам, то первый раз его следует покормить из соски молозивом матери не позже чем через полчаса после рождения.

Как правило, через 1–1,5 ч после родов у козы отделяется послед. Иногда его выведение заканчивается в течение 2–3 ч, хотя возможно и через более продолжительное время. Процесс непосредственного отделения последа длится от 15 до 50 мин. При многоплодной беременности последы выводятся после рождения всех козлят. Лучше всего дожидаться, когда послед отойдет сам. Ускорять этот процесс, насильственно вытягивая послед, ни в коем случае нельзя. Во-первых, порой это приводит к неполному его отделению и вызывает воспаление матки. Во-вторых, может вызвать выпадение матки и животное будет выбраковано. В-третьих, при естественном отделении последа постепенно происходит заустевание кровеносных сосудов, питающих плод, поэтому его принудительное отделение может вызвать кровотечение. Если же отделение последа задерживается более чем на 5–6 ч, то нужно без дальнейших промедлений обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Послед, оставшийся в полости матки, может привести к серьезной болезни или даже к гибели самки. Послед необходимо сразу же убрать из загона или кошары (хлева), а затем утилизировать; например, можно его закопать где-нибудь. Нельзя оставлять послед там, где козы могут с ним контактировать, даже косвенно. После отделения последа наружные половые органы, заднюю часть крупа и бедра козы обмывают теплым 4 %-ным раствором пищевой соды или слабым раствором калия перманганата (марганцовки) и насухо вытирают чистым полотенцем или тряпкой.

Через 1–1,5 ч после родов козе дают небольшими порциями теплую, слегка подсоленную воду и легкопереваримый корм. В частности, можно дать теплое пойло из отрубей и отвара льняного семени. Концентрированные корма в первые два дня полностью исключают из рациона, а затем постепенно (в течение 7–8 дней) количество их доводят до нормы.

6.

В условиях фермерских (крестьянских) хозяйств козлят часто выращивают под матками до отбивки. Молодняк в таком случае может равномерно в течение суток получать молоко из вымени матери. Молозиво или молоко, поступающее непосредственно к козленку, во-первых, намного меньше обсеменено микроорганизмами и грибами, во-вторых, в нем нет пыли; в-

третьих, содержит больше питательных веществ и витаминов, чем выдоенное в посуду и затем выпоенное. Козлята, выросшие под матерью, всегда выглядят несколько лучше развитыми, они более упитанные и подвижные. На подсосе молодняк потребляет молоко небольшими порциями, но сосет матерей часто – до 30 и даже до 60 раз в сутки. При этом молодняк намного быстрее привыкает к поеданию грубых и концентрированных кормов, так как взрослая коза является для них примером. Козлята уже на 4–5-й день начинают понемногу пробовать сено и веники на вкус и к 10-му дню всю их жуют, а к двухнедельному – начинают активно потреблять концентраты. Причем при таком приучении к поеданию растительных кормов у молодняка никогда не наблюдается расстройств пищеварения.

После отъема молодняк нельзя резко переводить на другой корм. Материнское молоко следует заменять на смеси, болтушки и каши в течение одной недели. Если у козлят проявляется расстройство (понос) или снижение пищеварения, то им следует давать молоко матери до восстановления нормального состояния, а затем начать снова процесс приучения к новым кормам. Как правило, козлята через 1–2 дня привыкают и успокаиваются.

При использовании традиционной технологии производства продукции козоводства в 3,5–4,5-месячном возрасте молодняк, прежде всего хорошо развитый, отнимают от маток. Отъем всегда проходит болезненно для козлят, поэтому рекомендуется это делать постепенно, в течение 7–10 дней. С каждым днем козлят оставляют на все более продолжительное время без матерей. Сначала ограничивают количество сосаний с трех до одного раза в день. Затем козлятам позволяют питаться под матками только раз в два дня. На 7–10-й день молоко следует исключить полностью. Молодняку необходимо вволю давать сена, чтобы они полностью насытились.

После отбивки из молодняка разного пола формируют отдельные отары. В это время молодняк нужно хорошо кормить, чтобы не приостановилось его развитие. Слабых, недоразвитых козлят оставляют еще на некоторое время под матками, а после отбивки эту группу усиленно подкармливают, пока они не окрепнут.

В настоящее время, особенно в молочном козоводстве, все шире применяется искусственное выращивание молодняка. Это объясняется тем, что молодая коза за окот приносит 1–2 козлят, а взрослая – до 5. Однако многоплодие, как правило, истощает самку; на 3–4 детенышей у матери молока обычно не хватает. В связи с этим козлят молочных пород под матками не выращивают. Сразу же после рождения приплод отсаживают и содержат отдельно в клетках в теплом помещении.

Если фермер (крестьянин) имеет возможность часто кормить молодняк, то в этом случае можно рекомендовать следующую схему выпаивания молока. В первые три дня – по 240 г (по 20 г на одно кормление); с четвертого по восьмой день – по 450 г (по 75 г на одно кормление); с четырнадцатого по тридцатый день – 1–1,3 л (по 250 г на одно кормление). В последующие две-три недели норму постепенно уменьшают, поят молоком пополам с кипяченой водой, добавляют овсяную или пшеничную муку и приучают к поеданию достаточно большого количества грубых кормов и корнеплодов.

Если козление произошло в зимний период, то в хорошую и не очень морозную погоду с 6–10-го дня жизни козлят можно ежедневно выпускать на прогулку на 10–20 минут, постепенно увеличивая время до 1–2 ч, а при благоприятных условиях молодняк более старшего возраста может находиться на свежем воздухе до 5 ч. Если козление произошло в весенний период, то в теплую погоду молодняк можно выпускать на пастбище с 2-недельного возраста. Пастбище должно быть ровным, без глубоких ям и густого кустарника. Козлят можно привязывать с месячного возраста. Из группы выбирают двух предводителей, которых и привязывают. В этом случае остальные козлята будут пастись невдалеке.

Козлята очень резвые и своенравные, они могут пролезть даже в небольшую дырку в заборе или загородке. Отучить их от этого очень сложно, поэтому нельзя допускать, чтобы козлята были предоставлены сами себе и оставались без присмотра. На пастбище можно огородить сеткой загон, где желательно сделать навес от дождя и солнца и небольшие лежанки, чтобы козлята могли там оставаться в любую погоду. Площадь загона в расчете на 5–6 козлят должна быть 10×15 м.

К пастбищному кормлению молодняка следует относиться очень внимательно, так как от этого в значительной степени зависит будущая продуктивность взрослого животного. Если молодняк не съедает траву, то ее следует подкашивать. При бедном травостое его подкармливают концентратами и свежескошенной травой, обязательно ставят емкость с водой. Если травостой очень бедный и козлята его быстро вытаптывают, то на какое-то время следует сменить загон, чтобы подрастить траву.

К общению с человеком козлят приучают с рождения. Для этого на них надевают ошейники и прогуливают, угощая лакомством. Это необходимо для того, чтобы животных свободно можно было перемещать. После нескольких уроков козленок обычно с удовольствием ходит на поводке. Кроме того, козлят надо приучать к чистке щеткой, каждый раз скармливая после этой процедуры какой-нибудь вкусный корм. Копыта расчищают по мере отрастания, но обычно в 8-9-месячном возрасте. Отросший рог мешает нормально развиваться конечностям и может вызвать хромоту.

7.

Корма, используемые в козоводстве

Для кормления коз используют:

- 1) корма растительного происхождения – зеленые (пастбищные), грубые корма, силос, корнеплоды, клубнеплоды, листовенное сено, веточный корм, концентрированные корма (зерновые, зернобобовые и остатки производств);
- 2) корма животного происхождения – молочные продукты, заменитель цельного молока, мясокостная, рыбная, кровяная мука;
- 3) корма промышленного изготовления – минеральные добавки, азотсодержащие вещества, витаминные препараты, продукты микробиологического синтеза и различные биологические активные вещества.

Зеленый пастбищный корм. Основным кормом для коз является растительность естественных пастбищ. Это не только самый дешевый, но и самый биологически полноценный корм.

Коз необходимо пасти. После стойлового периода к пастьбе их приучают постепенно, в течении недели. Перед выпуском на пастбище коз следует хорошо накормить концентратами и сеном. Нельзя выпускать голодных животных, так как они с жадностью набрасываются на молодую зелень и съедают ее очень много, что резко изменяет микрофлору желудочно-кишечного тракта и может вызвать вздутие рубца и сильную диарею. Кроме того, истосковавшиеся за зимний период по траве козы ранней весной могут съесть ядовитые растения (летом они очень хорошо отличают ядовитые травы и избегают их).

Для пастьбы коз наиболее подходят разнотравные луга, где растут злаковые и бобовые травы, мышинный горошек. Козы любят пастись в местах с низкорослым кустарником, поэтому в лесных районах для содержания их успешно используют кустарниковые пастбища, мелколесье и лесные поляны. При этом совершенно непригодны для пастьбы коз заболоченные участки, а также болотистые, заливные луга с грубостебельной растительностью. Эти места бывают, как правило, поражены клещами и являются рассадниками глистных инвазий (гельминтозов) и копытных заболеваний.

Хороши в кормовом отношении для коз искусственные пастбища из многолетних и однолетних бобовых (клевер, люцерна, эспарцет, донник) и злаковых трав (тимopheевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная, различные смеси с овсом, озимая рожь).

За сутки на пастбище взрослые матки потребляют примерно 6–7 кг зеленой массы, козлы – 7–8, молодняк с 6-месячного возраста до года – 4–5 и козлята 3–6-месячного возраста – 2–4 кг.

Грубые корма – сено и гуменные (солома, мякина), занимают значительную массовую долю в рационах коз в период их стойлового или полустойлового содержания.

Из грубых кормов лучшим по питательности является мелкостебельчатое, мягкое сено бобовых и злаковых трав. Суточная норма дачи сена маткам составляет 1,8–2,2 кг, козлам – 2,5–3, козлятам до года – 0,8–1 кг.

Из гуменных кормов лучшими являются гороховая, чечевичная, бобовая и фасолева солома, а также солома яровых злаков. Озимую солому козы поедают плохо. Козы лучше поедают солому ячменную и просяную, а хуже – пшеничную и совсем плохо – ржаную.

Для кормления коз с успехом можно использовать сенную муку и сеннаж. Хорошим кормом для них является также листовенное сено (веники). Веники заготавливают из веток березы, ивы, осины, липы, тополя, клена, ясеня, яблони, малины, вяза, рябины, вербы, акации, орешника. В ограниченном количестве дают им веники из бука, ольхи и дуба. Нельзя скармливать козам ветви вишни, сливы, груши, сирени, волчьей ягоды, бузины, крушины, черемухи, так как в них содержатся ядовитые вещества.

Зимой козе можно давать по 3–5 веников в сутки: 2–3 днем и 1–2 на ночь. Взрослой козе на зимний период требуется 500–550 кг грубого корма.

Силос для кормления коз используют в зимнее и весеннее время. Им можно заменить в рационе до 50 % (по питательности) грубых кормов. Козы охотно поедают силос из бобовых трав, бурьянистых растений, подсолнечника, кукурузы. Силосуют также ботву овощей (кроме картофельной), капустный лист, корнеклубнеплоды, фруктовую падалицу, солому.

В лактационный период козам можно давать до 3 кг силоса в сутки, а сукозным маткам во второй половине беременности и молодняку от 6–12-месячного возраста – 1 кг. На одну взрослую козу надо заготовить от 400 до 600 кг силоса.

Корнеплоды – кормовую и сахарную свеклу, морковь, брюкву, турнепс, а также кормовую тыкву – чаще скармливают козам в сыром виде. Норма скармливания корнеплодов: взрослым козам – 2–4 кг и молодняку до года – до 1 кг.

Клубнеплоды – картофель, земляная груша (топинамбур) – также используют для кормления коз. Чтобы предохранить коз от желудочных заболеваний, их лучше давать вареными.

Фермеру (крестьянину) необходимо учитывать тот факт, что при включении в рацион дойных коз большого количества редьки, турнепса и капусты молоко может горчить, поэтому эти корнеплоды скармливают через 1–2 дня в количестве не более 10 % от общего количества корма.

Концентрированные корма – зерновые, зернобобовые, остатки технических производств – важная составная часть рациона коз. Из зерновых кормов скармливают овес, ячмень, рожь, пшеницу, кукурузу. Для повышения переваримости зерновые корма рекомендуется давать в плющеном или размолотом виде.

Из зернобобовых в козоводстве используют горох, сою, бобы и чечевицу, которые скармливают в виде дробленки или муки грубого помола. Из остатков технических производств – жмыхи и отруби. Суточная дача жмыха взрослым козам составляет 0,3–0,5 кг, а молодняку – 0,2–0,3 кг.

Комбикорм – ценный корм для коз, так как он является молокогонным и представляет собой смесь разномолотого зерна различных видов (злаковых, зернобобовых) с добавками мясокостной, рыбной, травяной муки, кормовых дрожжей, минеральных веществ, витаминных препаратов. Ежедневная норма скармливания комбикорма молодняку до года обычно составляет 0,2–0,4 кг, а взрослым козам – 0,3–0,6 кг.

Из минеральных кормов в рационы коз вводят преимущественно костную муку, мел, обесфторенный фосфат, диамонийфосфат, преципитат, поваренную соль.

Кормление козлов

В неслучной период козлов поддерживают в состоянии средней и высшей средней упитанности. В неслучной период, летом, потребность козлов-производителей в питательных веществах может быть обеспечена при содержании их на хороших пастбищах при умеренной подкормке концентратами (0,2–0,3 кг в сутки), а в период стойлового содержания – при таком же уровне концентратов на рационах из грубых и сочных кормов.

За 1,5–2 месяца до начала случной компании козлов-производителей постепенно переводят на усиленное кормление и поддерживают в состоянии заводской упитанности. При усиленном использовании племенным козлам рекомендуется давать смесь дробленых концентратов. В случной период у них резко возрастает потребность в протеиновых кормах. В качестве источника полноценного протеина и витамина Е козлам скармливают овес (до 1,2 кг на голову в сутки). Хорошее стимулирующее действие на спермопродукцию и повышение половой активности производителей оказывает следующая подкормка: свежее обезжиренное молоко (обрат) – 1–1,5 л, куриные яйца – 2–3 шт., обезжиренный творог – 200–300 г, кровяная мука – 20–30 г на голову в сутки. При недостатке минеральных веществ и витаминов в рацион включают минеральные добавки и витаминные препараты.

Суточный рацион племенных козлов в зимний период обычно включает в себя сено злаково-разнотравное и бобовое (1,5–2 кг), концентраты – ячмень, овес, отруби пшеничные, горох, комбикорм (0,8 кг), шрот подсолнечниковый (50 г), морковь (0,5 кг), соль поваренная (15 г).

В летний период сено и морковь заменяют травой, а норма концентратов остается прежней. Зеленую массу и хорошее сено обычно скармливают вволю. В качестве полноценного концентрированного корма используют комбикорм.

Козлов-пробников кормят в течение года по нормам для козлов-производителей, рекомендованных для неслучного периода.

Кормление маток

Кормление коз должно обеспечивать среднюю и высшую упитанность, а также высокую воспроизводительную способность, молочную, шерстную и пуховую продуктивность. Нормы кормления коз дифференцированы в зависимости от их живой массы, физиологического состояния (холостые, период сукозности, лактирующие), живой массы и уровня продуктивности.

Для яловых и сукозных маток в первой половине беременности нормы кормления одинаковые, поскольку затраты питательных веществ на развитие плода в этот период невелики. Так, за первую половину сукозности масса плода достигает лишь 10 % массы новорожденного козленка, поэтому напряженность обменных процессов у самок в этот период возрастает незначительно. Во вторую половину сукозности, особенно в последнюю ее треть, когда масса плода сильно увеличивается, резко возрастает потребность маток в энергии, питательных и биологически активных веществах: в энергии – на 30–40 %, протеине – в 2 раза. В этот период для достижения необходимого уровня продуктивности нужно использовать лучшее по качеству сено, сенаж, силос, корнеклубнеплоды, концентрированные корма, минеральные подкормки. В последний месяц сукозности в рационах маток постепенно уменьшают количество объемистых кормов.

В предродовый и лактационный периоды в рационы коз желательно включать корма, богатые легкопереваримыми углеводами. Сразу после козления маткам дают пойло из пшеничных отрубей, хорошее сено и небольшое

количество (до 1 кг в сутки) свеклы или моркови. На обычное кормление их переводят в течение 5–7 дней. Для подсосных маток нормы кормления установлены в зависимости от количества выкармливаемых ими козлят. При этом исходят из того, что на 1 кг прироста живой массы козленка затрачивается примерно 5 кг цельного молока. На продуцирование 1 кг молока жирностью 4–4,5 % матка должна дополнительно получить в рационе 0,35–0,4 корм. ед. и 50–60 кг переваримого протеина.

Общую питательность рациона молодых, впервые покрытых самок в период сукозности следует увеличить на 10 %, а после их козления к суточной норме переваримого протеина дополнительно добавить 15 г. Это необходимо делать для того, чтобы беременность не оказала отрицательного влияния на организм козочек на завершающей стадии его развития и формирования.

Фермер должен помнить, что на продуцирование 0,5 кг молока козам требуется 2–2,5 л воды. В связи с этим лактирующим маткам необходимо предоставить свободный доступ к воде.

Фермеру необходимо знать, что обеспечить высокую и устойчивую молочную продуктивность коз можно только при сочетании в их рационах высококачественного сена, силоса, корнеклубнеплодов и концентрированных кормов. Концентраты сукозным и лактирующим маткам лучше скармливать в виде комбикормов.

В период сукозности полноценным является рацион, состоящий из 1,5–2 кг хорошего сена и 0,4–0,5 кг концентратов, а в период лактации часть сена заменяют силосом – до 2–3 кг в сутки. В летний период грубые и сочные корма заменяют зеленой травой – до 5–7 кг в сутки.

Кормление молодняка

В первые два месяца жизни для козлят материнское молоко является основным кормом. В условиях фермерских (крестьянских) хозяйств не рекомендуется отнимать их от матерей раньше 2-месячного возраста. В этом возрасте козлята переходят на питание растительными кормами. К двум месяцам они съедают в сутки 40–80 г концентратов, а к 3 месяцам – 120–180 г. За подсосный период на одного козленка обычно расходуется 15–18 кг силоса. В качестве концентрированного корма до 3-месячного возраста скармливают комбикорм.

В пастбищный период козлят обязательно подкармливают концентратами (по 0,2–0,3 кг в сутки на голову) и по возможности силосом. При стойловом содержании подкормка концентратами сохраняется (количество их зависит от питательности других кормов рациона).

Фермеру (крестьянину) можно рекомендовать для использования следующий примерный рацион для козлят живой массой 35 кг: сено – 0,7 кг, силос – 1,5, концентраты – 0,25 кг, шрот подсолнечниковый – 50 г, соль поваренная – 12 г. В рационе содержится: корм. ед. – 1,04, переваримого протеина – 140 г, кальция – 13 г, фосфора – 6 г, каротина – 42 мг.

8.

Наряду с кормлением и разведением большое влияние на рост поголовья, повышение его продуктивности и продолжительности использования оказывает правильная организация содержания коз в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств и личных подворий граждан. Постройки и сооружения на козоводческой ферме располагают на сухом возвышенном участке с водопроницаемым грунтом, удаленным от жилых помещений не менее чем на 200 м. Состав, тип и размер построек и сооружений зависят от местных условий, способа и метода ведения козоводства, а также численности коз на ферме.

В Республике Беларусь в условиях фермерских (крестьянских) хозяйств, специализирующихся на производстве продукции козоводства, для содержания животных строят кошары с базами, базы-навесы и откормочные площадки.

Вместимость кошары рассчитывается по следующим нормативам: на козла – 2 м², матку с козлятами до отбивки – 2–2,5 м², холостую матку – 1,5–1,8 м², на одного козленка в возрасте от 4 месяцев до года – 0,6–0,8 м², на одну голову молодняка от года до 1,5 лет – 0,9–1,0 м². Для племенных животных нормы площади увеличивают на 12–15 %. В расчете на козу в помещении должно приходиться от 2,5 до 3,5 м². Высота стен от пола до потолочных перекрытий кошары – 2,4 м. Окна устраивают на высоте от пола не менее 1,8 м, чтобы козы, встав на задние ноги, не смогли рогами разбить стекла.

Норма естественной освещенности не должна выходить из пределов от 1:12–15 до 1:20–30.

Кошары и базы оборудуют передвижными яслями, решетками для концентрированных и минеральных кормов, водопойными корытами и мелким инвентарем, необходимым для ухода за козами. На каждые 100 коз требуется 5 комбинированных яслей-кормушек длиной 4 м и столько же водопойных корыт. Для устройства раскола, временных клеток и переносных изгородей удобно пользоваться деревянными 3-, 2-, 1,5- и 1-метровыми щитами. На маточную отару требуется щитов общей длиной примерно 200 м. Желательно, чтобы кошара и база были электрифицированы.

Кошара для содержания коз должна удовлетворять обязательным для животноводческих построек зоогигиеническим требованиям: быть сухой, светлой, чистой, оборудованной хорошей вентиляцией, обеспечивающей приток свежего воздуха, но без сквозняка и с непромерзающими стенами и потолком.

Температура воздуха в кошаре обычно поддерживается за счет жизнедеятельности коз в пределах 10–120 С, а в холодное время года она не должна опускаться ниже 5–70 С, а при содержании козы с маленькими козлятами – 8–120 С.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 70–80 %, а при содержании коз с приплодом – не выше 75 %.

В помещение для содержания коз обязательно должен проникать солнечный свет, поэтому даже в небольшом козлятнике обязательно делают окна. Располагают их на высоте не менее 1,4–1,5 м. В небольшом козлятнике

окно должно быть не менее 50 см в длину и 35 см в высоту, а в более крупных – высотой 50–60 и шириной 70–80 см (желательно с таким расчетом, чтобы общая площадь остекления составляла 1/10–1/12 площади пола). Стекла должны всегда содержаться в чистоте. В козлятнике необходим и электрический свет, особенно зимой. Освещать коз зимой надо не менее 8 ч в сутки. Это улучшает обмен веществ, повышает продуктивность и предохраняет животных от гормональных нарушений.

При содержании нескольких животных рекомендуется для каждой козы сделать индивидуальное стойло. Минимальный размер стойла для взрослой козы – 1×2 м. В каждом станке оборудуют кормушки для концентратов и корнеплодов, а также ясли для грубого корма (летом – для травы), которые изготавливают из деревянных реек или железного прута. Кормушка должна быть решетчатой, расстояние между рейками 15×15 или 10×10 см. При более широких просветах козы свободно вытягивают сено, особенно мелкое, и оно попадает под ноги, а животные его не поедают. Кормушку подвешивают на расстоянии 20–30 см от пола. Для козлят кормушку можно сделать меньших размеров, соответственно их возрасту.

Если в хозяйстве есть козел, то его лучше содержать отдельно, так как присущий ему специфический козлиный запах передается козе, а от нее – молоку. В связи с этим помещение для козла рекомендуется делать с плотными перегородками (без щелей) из толстых досок, а в крыше обязательно установить трубу для вентиляции. В крайнем случае, помещение для козла должно быть отделено от местонахождения коз изгородью высотой не менее 1,5 м. Если этого не сделать, то все самки будут приходить в охоту в одно и то же время.

Вдоль одной стены козлятника можно соорудить помост (полати, лежак) – возвышение над полом шириной 50–70 см, высотой 40–60 см и длиной 1–1,5 м в расчете на одну голову (для нескольких животных такой топчан делают шире в зависимости от их числа). Козы любят спать на таких полатах – там всегда суше и теплее, чем на полу, особенно если в сарае холодный пол. Наличие лежака не только спасает животных от сквозняков и простудных заболеваний, но и облегчает уборку в помещении. Полати строят из достаточно толстых досок, которые могут выдержать тяжесть коз. На них следует насыпать подстилку слоем 5–8 см. В месте расположения лежака не должно быть окон.

При содержании коз нужно использовать подстилку, так как она впитывает лишнюю влагу, мочу и вредные газы. Для этих целей годны опилки, стружка, торф, солома, сухие опавшие листья, остатки грубого корма. Если в сарае тепло, то его чистят ежедневно, меняя подстилку. Если в сарае холодно, то навоз можно оставлять, а подстилку в этом случае подсыпают по мере надобности.

При наступлении теплого времени стены, пол и стойла козлятника следует тщательно вымыть горячей водой со щелоком или с креолином жесткими щетками и хорошо проветрить. Козлятник можно побелить известковым молоком с целью его дезинфекции.

Вплотную к кошаре с подветренной стороны пристраивают баз-навес (выгульный двор) площадью из расчета 3–4 м² на голову. Баз огораживают плотной изгородью высотой 2 м с трех сторон. К противоположным внутренним сторонам изгороди пристраивают навесы для защиты животных от осадков, а в летнее время от солнца. Коз рекомендуется держать на открытом воздухе как можно больше, а чтобы во время отдыха на холодной земле они не простудились, баз время от времени надо застилать подстилкой.

Зимой, в хорошую погоду и при неглубоком снеге, коз следует выгонять на прогулку в выгульный дворик (баз) или на пастбище, так как это укрепляет организм животных, способствует поеданию ими большего количества кормов, обеспечивает получение здорового и хорошо развитого приплода, а также, в целом, значительно снижает затраты на содержание коз.

В зимний период, в солнечные с небольшим морозом дни коз содержат в базу обычно с 9 до 15 ч, а в морозные дни – с 12 до 14 ч. При температуре воздуха до 120 С мороза коз можно кормить в загоне.

6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКИХ (КРЕСТЬЯНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

1. Породные особенности кур.
2. Породы кур.
3. Постройка птичника.
4. Корма для птицы.
5. Сбор, хранение и инкубация яиц.
6. Выращивание цыплят.
7. Выращивание гусей в фермерских (крестьянских) хозяйствах.
8. Выращивание уток в фермерских (крестьянских) хозяйствах.
9. Выращивание индеек в фермерских (крестьянских) хозяйствах.

В домашнем птицеводстве курам отдается наибольшее предпочтение. Объяснение этому очевидно: для их содержания не требуется дорогостоящих помещений и сложного оборудования, а разводить их можно в любых районах республики. Кроме этого, для получения птичьего мяса и яиц можно использовать любые корма, в том числе отходы кухни и огородов.

1.

Многие птицеводы при выборе породы учитывают направление продуктивности (яичное или мясное). При выращивании кур в личных подсобных и фермерских хозяйствах необходимо разводить не одну, а две или более пород. В этом случае у птицевода есть возможность каждый год получать помеси, которые обычно бывают крупнее своих родителей и отличаются лучшей яйценоскостью.

Существуют и любители декоративных кур, интерес которых вызывают породы: кохинхины, брама, карликовые бентамки, падуаны, голландские с белым хохлом, курчавые, шелковые, карликовые кохинхины, юрловские голосистые и др.

В некоторых хозяйствах успешно разводят бойцовых кур. У этих птиц сильная, мускулистая грудь, длинные, крепкие ноги, длинная шея, мощная голова, солидный клюв и очень агрессивный нрав.

В процессе одомашнивания и разведения кур было создано несколько десятков пород, которые различаются по типам практического применения. Среди них куры яичного, мясного, мясо-яичного, бойцового и декоративного направлений.

2.

Куры яичного направления продуктивности

Породы этого типа отличаются сравнительно небольшой живой массой (масса кур – 1,5–2,0 кг, петухов значительно выше). Они очень подвижны, рано начинают нести яйца и почти не насиживают, поэтому период кладки яиц у них продолжительнее, чем у кур мясо-яичного типа. К породам кур яичного направления относят: русскую белую, леггорн, минорку, итальянскую куропатчатую, брекель, чешскую золотистую, пушкинскую полосатопеструю и др.

Итальянская куропатчатая старинная порода Италии, ее история насчитывает более 2 тысяч лет. Она широко распространилась в Европе в XIX веке.

По окраске оперения петухи имеют красный верх, темный низ и хвост. Окраска оперения у кур коричневато-серая с золотисто-желтой гривой, черными концами крыльев и рулевых перьев хвоста. Грудь кур итальянской куропатчатой породы светло-коричневая (рис. 21).



Рис. 21. Куры итальянской куропатчатой породы

Голова небольшая, клюв желтый. Гребень листовидный, большой, у кур свисает набок, у петухов прямостоячий, ушные мочки белого цвета, шея средней длины. Спина прямая, длинная, переходит в линию хвоста под четко выраженным углом. Грудь хорошо развита, выпуклая. Крылья плотно прилегают к туловищу. Ноги высокие, желтые.

Живая масса курочек составляет 2,0–2,5 кг, петушков – 2,5–3,6 кг. Яйценоскость – 180–200 шт., масса яиц – 58–60 г.

Суточные цыплята покрыты светло-коричневым пухом, по спине проходит одна широкая и две узкие темно-коричневые полосы.

Пол цыплят итальянской куропатчатой породы можно с точностью до 80 % определить в суточном возрасте. Курочки имеют ярко выраженную темно-коричневую черту от угла глаз к затылку, у петушков она или отсутствует, или плохо выражена. Кроме того, у курочек широкая темно-коричневая полоса проходит не прерываясь по голове и спине, у петушков она прерывается в затылочной части.



Рис. 22. Куры русской белой породы

Русская белая порода кур – одна из лучших яичных пород. Средняя яйценоскость русских белых кур – 180–200 яиц в год; отдельные же рекордистки дают до 300–320 шт. Вес яйца – в среднем 55–60 г, но иногда бывают и более крупные яйца – 65–75 г. При всех этих качествах русские белые куры имеют значительную живую массу и вкусное мясо (рис. 22).

Живая масса курицы этой породы – 2,0–2,5 кг, а петуха – 2,8–3,2 кг. Эта порода хорошо приспособлена к нашему климату.



Рис. 23. Куры породы леггорн

Широко распространенная яичная порода кур – леггорн (рис. 23). Завезена к нам из Англии и Америки в конце 20-х годов прошлого века. Куры породы леггорн почти не насиживают яйца, производительность – 180–200 яиц в год; вес яйца – 55–58 г. Средний вес кур – 2,0 кг, а петухов – 2,5–2,8 кг. Кроме белых существуют также леггорны черные, желтые и куропатчатые. Последние также широко распространены благодаря высокой продуктивности и красивой окраске.

Чешская золотистая – местная порода кур Чехии и Словакии. Завезена в Россию в 1977 г., откуда и попала в Беларусь.

Окрас пера у курочек куропатчатый, петухи имеют красный верх и черный низ. У кур перо окаймлено черной полосой. Плюсны окрашены в темно-серый цвет. Ушные мочки красные. Голова средней величины, клюв слегка изогнут, темной окраски. Гребень листовидный, хорошо развит. Шея средней длины. Хвост хорошо развит, поставлен высоко. Окраска скорлупы яиц светло-кремовая. Для суточных цыплят характерна необычная окраска пуха – желтая, с черными вкраплениями; на спине – две тонкие темные полосы.

Живая масса курочек составляет 1,6–2,0 кг, петушков – 2,0–2,3 кг. Яйценоскость кур – 160–170 шт., масса яиц – 54–57 г.



Рис. 24. Куры пушкинской породы

Пушкинская полосато-пестрая порода кур утверждена в 2007 г. Выведена в 1976–2005 гг. в НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных на основе скрещивания кур австралорпов черно-пестрых с петухами белых леггорнов и скрещиваний с московскими белыми и цветными бройлерами кросса «Бройлер-6» (рис. 24).

Сохранность молодняка составляет – 95 %, взрослого поголовья – 87 %. Живая масса курочек составляет 1,8–2,0 кг, петушков – 2,4–2,6 кг. Яйценоскость – 180–220 шт., масса яиц – 57–60 г.

Голова небольшая, удлинённая. Клюв средней длины, круто загнут, цвета слоновой кости. Гребень розовидный большой с выделяющимся шипом, следующим линии затылка, верхняя часть ровная, плоская, покрыта

мелкими сосочками. Глаза выпуклые, оранжевые. Ушные мочки белорозовые. Шея длинная, высоко поднятая с хорошо выделяющейся гривой. Тело трапецевидное, широкое, глубокое. Спина сужается к хвосту. Хвост вертикально поставлен, хорошо развит. Плюсны длинные, белые, толстые. Имеет широко расставленные пальца. Когти белые. Оперение плотное, полосато-пестрое с белым подпухом, петухи белые с темными пятнышками по телу. Крылья длинные, слегка приспущенные. Окраска скорлупы яиц светло-кремовая и белая.

Птица отличается спокойным нравом, приспособлена к суровым условиям содержания. Характерной особенностью породы является отличный товарный вид тушки. По этому признаку они превосходят все известные породы цветных кур.

Куры мясо-яичного направления продуктивности

К этой породной группе относятся юрловские голосистые, первомайские, ливенские, загорские белые, кучинские юбилейные, московские черные, адлерские серебристые, амрокс и др. Из иностранных пород часто встречаются род-айланд, плимутрок, нью-гемпшир, суссекс, фавероль.



Рис. 25. Куры юрловской голосистой породы

Юрловские голосистые куры отличаются большим весом тушки, хорошими мясными качествами и приспособленностью к местным условиям (рис. 25). Средний живой вес курицы составляет около 3,0 кг, а петуха – около 4,0 кг. Яйценоскость в зависимости от условий содержания и кормления колеблется от 85 до 213 яиц в год, средняя масса яиц 65 г.

Окраска оперения петухов и кур: черная с золотистой или серебристой гривой и спиной, серебристо-белая (основной цвет белый, хвост, грива, нижняя часть маховых перьев – черные), лососевая (туловище и хвост черно-матовые, грива и кроющие перья поясницы светло-палевые с красноватым оттенком, плечи темно-красные). Оперение рыхлое.

Куры хорошо насиживают яйца. Имеют отличные мясные качества и хорошо приспособлены к нашим климатическим условиям – все это позволяет отнести юрловских голосистых к ценным породам.



Рис. 26. Куры первомайской породы

Куры первомайской породы (рис. 26) получены путем скрещивания юрловских голосистых с курами род-айланд и виандот, в результате чего птица объединила в себе высокую живую массу тела, вес яиц, хорошо развитый костяк и мускулатуру, исключительно высокую приспособленность к местным условиям юрловской породы, высокую зимнюю яйценоскость породы род-айланд и особенности телосложения породы виандот.

Средняя яйценоскость первомайских кур-

молодок составляет 142 яйца в год, средний вес яйца двухгодовалых кур – 59,4 г, средний живой вес кур – 2,6 кг, а петухов – 3,8 кг.

Загорские белые куры выведены в подмосковном Всесоюзном научном и технологическом институте птицеводства (г. Загорск, ныне Сергиев Посад). При этом была поставлена задача получить породу, которая обладала бы хорошими мясными качествами, высокими яйценоскостью и жизнестойкостью, а также хорошими способностями разыскивать, добывать корм (фураж).

Хорошо известно, что поиски в земле, траве, навозе, мусоре червей, гусениц, жучков, личинок, склевывание семян сорняков и листочков травы, погоня за бабочками, мухами – все это способствует физическому развитию птицы. Вот почему многие птицеводы считают, что часть зернового корма следует специально разбрасывать повсюду, чтобы заставить кур рыться в земле. Такая своеобразная «физическая зарядка» особенно полезна при воспитании племенного молодняка.

Кучинская юбилейная порода кур создана в Государственном птицеводческом заводе «Кучинский» в 1947–1990 гг. с использованием пород: австралорп, род-айланд, полосатый плимутрок, бурый леггорн.

Основная окраска оперения – золотисто-ситцевая с серым подпухом, но светлым стержнем пера. Поэтому цвет тушки светлый, без черных пеньков. Оперение мягкое, обильное, но не рыхлое. Голова средних размеров. Клюв желтый с коричневым оттенком, крепкий, толстый. Ушные мочки красные, гребень листовидный. Грудь выпуклая, глубокая, спина широкая, прямая, длинная. Туловище длинное, глубокое. Крылья плотно прилегают к туловищу. Ноги крепкие, невысокие с желтой окраской.

У суточных цыплят пух коричневый или темно-палевый вперемешку с серым. Грудь и живот серовато-желтого цвета. От головы вдоль спины находятся 1–3 четко выраженные темные полосы. По окраске пуха на крыльях цыплята разделяются по полу: курочки с темным крылом, петушки светлокрылые. Точность определения пола – 85–98 %.

Порода неприхотлива к условиям содержания, хорошо разводится в любых климатических условиях. При промышленном использовании хорошо приспособлена к клеточному содержанию и разведению.



Рис. 27. Куры породы род-айланд

Порода кур род-айланд выведена в США в середине XIX века путем скрещивания местных кур с палевыми шанхайскими и красно-бурыми малайскими петухами (рис. 27).

Окраска оперения этих кур темно-коричневая. Стержень пера вплоть до кожи окрашен в сочный красноватый цвет. Подпух светлорусый. Перья хвоста черные с зеленоватым отливом.

Особенностью породы является наличие у нее гена золотистости, сцепленного с полом. При получении помесей этих кур с другими породами и кроссами можно разделить суточных цыплят по полу (аутосексные цыплята).

Куры породы род-айланд имеют голову средней величины. Гребень листовидный, прямостоячий, ушные мочки красные. Клюв короткий изогнутый, желтый с коричневым пятном. Грудь хорошо развита. Спина широкая, ровная, длинная. Туловище длинное, глубокое, прямоугольное. Широкие плечи и пышная поясница. Ноги недлинные, крепкие, плюсны желтые.

Окраска суточных цыплят от светло-коричневой, до темно-каштановой. У цыплят могут встречаться полосы и черные пятна на основной окраске пуха, с возрастом они исчезают.

У кур в небольшой степени развит инстинкт насиживания. Птицы неприхотливы к условиям кормления и содержания. Большая подвижность и живой темперамент способствуют поиску корма на свободном выгуле.

Куры породы род-айланд – отличные зимние несушки. Средняя яйценоскость за год – 152 яйца. Средний вес яйца – 54–55 г (иногда вес яйца достигает 60–62 г).



Рис. 28. Куры породы плимутрок полосатый

Порода кур плимутрок полосатый выведена в Америке в середине XIX века путем скрещивания кохинхинов, брам, доминиканских кур, черных испанских петухов и кур доркинг.

Окраска оперения полосатая с оттенками (рис. 28). Поперек перьев чередуются правильные линии черных и белых полос. Концы перьев черные. Куры кажутся чуть темнее петухов за счет более интенсивной окраски пера. Имеется большое число цветных форм: черные, белые, желтые, куропатчатые, серебристо-полосатые. Кроме того, имеется карликовая форма.

Голова небольшая. Короткий клюв желтого цвета. Гребень листовидный с пятью зубцами. Сережки овальные средней величины. Ушные мочки ярко-красные. Шея средняя, густо оперенная. Туловище длинное, широкое и глубокое. Грудь широкая. Крылья плотно прилегают к телу. Спина широкая, средней длины. Хвост небольшой, густо оперенный с умеренно длинными косицами. Плюсны желтые со светло-желтыми когтями.

Суточные цыплята покрыты черным пухом, Цыплята в суточном возрасте разделяются по полу по окраске пуха: петушки и курочки имеют черную окраску пуха, но у петушков пятно на голове светлее и больше.

Куры мясного направления продуктивности

К ним относятся кохинхины, брама, корниши и некоторые другие. Все они имеют большую живую массу – до 5 и даже до 6 кг, массу яиц – 55–60 г (редко до 70). Основные недостатки: грубокостность, позднепелость и относительно малая яйценоскость. С другой стороны, эти породы сыграли большую роль в образовании ценных пород общепользовательного типа; иногда для этой цели их используют и теперь. Нередко их разводят и как декоративных.



Рис. 29. Куры породы кохинхин

Куры породы кохинхин привезены в Англию из Шанхая в 1843 г. в подарок королеве. Современный тип создан европейскими птицеводами во второй половине XIX века. Вес петухов – 3,5–5,5 кг, кур – 3,0–4,5 кг. Яйценоскость – до 120 яиц в первый год. Минимальная масса яйца – 53 г, скорлупа желто-коричневая.

Окраска оперения может быть белой, голубой, палевой, куропатчатой, черной (рис. 29).

Для кур породы кохинхин характерна нежно-рыхлая конституция, маленькая голова, глубоко посаженные глаза, у палевой разновидности они оранжево-красные, у черных – темные. Небольшой листовидный гребень. Клюв желтый слегка изогнут. Ушные мочки продолговатые, красные. Шея средней длины. Спина короткая, широкая, с подъемом к пояснице. Поясница широкая. Хорошо развита грудная клетка. Крылья короткие, закругленные. Ноги невысокие, широко поставленные. Хвост короткий, рулевые крылья скрываются под кроющими перьями хвоста. У петухов слабо развитые косицы. Ноги желтой окраски.

Взрослые куры неприхотливы, не боятся холода, но склонны к ожирению. Куры очень спокойные, являются хорошими наседками и идеально подходят для содержания на небольших выгулах приусадебных участков.

Порода кур брама светлая выведена в США в 1840–1850 гг. на основе скрещивания кохинхинов, малайских бойцовых и возможно читтатогонг – старой азиатской породы. В Европе появились в конце 50-х годов XIX века и, с тех пор, благодаря своим размерам и необычному виду пользуются постоянным вниманием любителей (рис. 30). Масса петуха – 3,5–5,0 кг, курицы – 3,5–4,5 кг. Яйценоскость – 100–140 яиц минимальной массой 53 г, цвет скорлупы от желто-коричневого до желто-красного.

Окраска оперения белая с черным хвостом, черной продольной полосатостью перьев ожерелья и шеи.



Рис. 30. Куры породы брама светлая

Голова небольшая. Клюв желтый, сильный. Гребень небольшой, низкий, гороховидной формы, четко разделен на три борозды. Гребень, мочки ярко-красные. Глаза большие, оранжево-красные. Сережки средних размеров. Шея длинная, хорошо оперенная, с развитой гривой. Спина короткая, широкая, крылья плотно прилегают к телу. Грудь полная, широкая. Туловище массивное, квадратной формы, кожа желтая. Хвост небольшой, прямо поставленный и раскинутый в стороны, как «веер».

Ноги толстые, оперенные, плюсны и пальцы желтого цвета. Средний и наружный пальцы оперены.

Брама – очень спокойная птица и хорошая наседка. Молодняк развивается медленно, как и у всех кур мясного типа, поэтому для формирования стада, особенно в суровом климате, цыплят следует выводить как можно раньше. Цыплята жизнеспособны и легко выращиваются.

3.

Для птичника обычно выбирают достаточно сухое место. Почва на участке должна быть не тяжелой: супесчаной или суглинистой. Лучше, конечно, если участок находится вдали от дорог, где нет пыли и шума.

Лучшее основание для птичника – надежный фундамент. Для этого необходимо разметить площадку, вырыть котлован, уложить кирпичи на цементном растворе. С фундаментом постройка будет прочнее и долговечнее, кроме того, фундамент предохраняет помещение от сырости и проникновения крыс.

Пол птичника должен быть теплым, сухим и ровным. Наиболее долговечны цементные полы, они к тому же недоступны для проникновения крыс; с цементных полов удобнее и легче убирать подстилку. Единственный недостаток – такие полы холоднее деревянных. Деревянный пол делают из толстых, уложенных на балки досок.

Высота птичника не должна превышать 1,8 м. Птичник должен быть теплым, светлым, сухим и чистым, без сквозняков. Оптимальная температура – от -2°C до $+27^{\circ}\text{C}$.

В птичнике площадью 10 м² можно содержать не более 30 кур или 20 уток (гусей). Входную дверь или лаз устраивают с восточной стороны.

Стены птичника лучше всего делать деревянными, но не обязательно бревенчатыми. Они могут быть и каркасными с двусторонней обшивкой досками, между которыми нужно разместить утеплитель.

Солнечный свет – лучший дезинфектор, поэтому окна следует устраивать с южной стороны. Окна размещают невысоко над полом: 50–60 см, тогда и под окном будет достаточно света. При планировании общей площади применяют правило: на 8–10 м² площади пола должен приходиться 1 м² площади стекла. Летом застекленные рамы вынимают из окон и заменяют другими, затянутыми сеткой. Для стабильного получения продукции необходимо установить дополнительно электрическое освещение. Двери лучше всего делать с тамбуром – двойные, тогда холодный воздух не будет резко поступать в помещение.

Непременное условие содержания кур-несушек – это хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Наиболее простой вариант вентилирования – устройство форточки. В небольших птичниках чаще всего применяют естественную вентиляцию. Для этого используют окна, затянутые сеткой, тканевые рамы, фрамуги, каналы в стенках здания, вытяжные трубы.

Лазы – отверстия для выхода и входа птицы в помещение. Их устраивают на уровне пола. Размеры лазов зависят от величины птицы. Иногда перед лазом делают деревянные сходы (наклонный мостик) (рис. 31).

В каждом помещении для кур непременно следует оборудовать зольную ванну – деревянный ящик размером минимум 1,2×0,7 м и высотой не менее 0,2 м. В ванну насыпают мелкий песок, смешанный с древесной золой в равных долях. Для птиц это надежный способ избавления от кожных паразитов.




Рис. 31. План курятника: I – продольный разрез, II – поперечный разрез;

А – помещение для содержания кур-несушек; Б – тамбур;

1 – вентиляционная труба; 2 – лампа для дополнительного освещения; 3 – окно, для естественного освещения; 4 – кормушка для зеленых кормов; 5 – лаз, для выхода на выгул; 6 – зольная ванна; 7 – подвесная поилка; 8 – лестница, для подъема на насест; 9 – подвесная кормушка для сухих кормов; 10 – жердь для входа в гнездо; 11 – кормушка для минеральных кормов; 12 – насест с поддонном, накрытым сеткой для предотвращения контакта кур-несушек с пометом; 13 – гнезда, позволяющие проводить сбор яйца с тамбура; 14 – шкаф для хранения кормов и инвентаря; 15 – выгул; 16 – дверь

Выгул позволит использовать естественный инстинкт кур. Стандартная высота выгула – 2 м. Ограждают его металлической сеткой с крупной ячейей, а нижнюю часть ограждения обшивают тесом на высоту 30 см. Выгул должен быть доступен для прямых солнечных лучей. Чтобы он не загрязнялся и не увлажнялся, его лучше всего защитить навесом из стеклопластика, полиэтиленовой пленки и т. п.

Оборудование и инвентарь птичника

При правильно сделанных насестах птица не испытывает дискомфорта при отдыхе и ночевках, что положительно сказывается на ее продуктивности. Бруски насестов выполняют деревянными, гладко оструганными, верхние грани слегка закругляют. Изготовленные бруски устанавливают в наиболее теплой и удаленной от окон части птичника.

Следует учитывать, что при слишком узком бруске насеста птица постоянно должна заботиться о сохранении равновесия. Это не только вредно отражается на ее здоровье, но и может приводить к падению и травмам. Делать вместо бруска круглую жердь не рекомендуется.

При изготовлении брусков для конкретного вида и возраста птицы можно следовать такому совету специалистов: ширина бруска должна равняться половине длины раскрытой лапы птицы от начала среднего пальца до конца большого. Таким образом, оптимальное сечение бруска – насеста для кур примерно 4×6 см.

Если насесты длинные, то для них надо установить подпорки через каждые 1,5–2,0 м. Нельзя устанавливать насесты близко к стене: птица может поломать хвост. Расстояние от стены до насеста должно быть не менее 30 см, высота от пола до насеста – 90–100 см.




Рис. 32. Насест с поддоном закрытым металлической сеткой

Под насестами нередко устраивают пометный поддон. Который должен быть сделан из гладко выструганных досок или оцинкованной стали. Для удобства чистки на него насыпают сухой торф или песок, а насесты делают разборными. Для предотвращения контакта птицы с пометом на поддон укладывают металлическую сетку (рис. 32).

Переносной, так называемый гигиенический, насест можно поставить на стол, который служит для него поддоном, или на пустой ящик. Помет со стола удобно сметать, а из ящика выгребать, для чего одну стенку делают откидной. Стол или ящик для размещения насестов можно поставить в любом месте птичника. Переносной насест легко чистить и дезинфицировать, переставив его в отведенное для дезинфекции место и поворачивая в удобное для обработки положение.

Размеры гнезд должны строго соответствовать каждому виду птицы. Гнездо для кур мясных пород устраивают в 1 или 2 яруса, для кур яичных пород – в 1–3. Высота установки гнезд для кур – 0,6–0,7 м от пола (при ярусных гнездах нижний ярус может быть ближе к полу). Представляет интерес вариант размещения гнезд для кур-несушек над насестами, как это делается в домашнем птицеводстве Германии.

Клетки для содержания птицы могут быть одно- и многоярусными: последние позволяют значительно сэкономить площадь птичника. Серийные одноярусные клетки разработаны для содержания в приусадебном птицеводстве кур-несушек, молодняка птицы.

Кормушки различаются по назначению: для молодняка и взрослой птицы, а также для скармливания из них кормов различной консистенции – сухих рассыпных, влажных мешанок, зеленых. Длина кормушки обычно составляет 80–100 см, ширина ее и высота бортиков зависят от возраста птицы.



Рис. 33. Кормушка, изготовленная из ведра и секционной миски для кормления собак

Для взрослой птицы в приусадебном птицеводстве применяют несколько типов как серийных, так и самодельных кормушек (рис. 33). И те и другие просты, удобны, их легко чистить и дезинфицировать. Деревянные или пластиковые лучше подходят для сухих кормосмесей и минеральных подкормок (гравия, ракушечника, мела), они должны вмещать не менее суточного запаса корма. Для влажных мешанок предпочтительны металлические или пластиковые кормушки. Их вместимость рассчитывается, как правило, на разовую дачу корма.

Серийные самокормушки, предназначенные для скармливания сухих сыпучих кормов, хороши тем, что в них засыпают корм на несколько дней и хозяину не приходится ежедневно тратить время на кормление птицы. Нетрудно сделать приподнятую над полом самокормушку для скармливания сухого корма курам. Ее длина, как и длина любой кормушки, зависит от поголовья птицы. Для домашнего птичника рекомендуются кормушки длиной 1–2 м.

Простые по устройству желобковые кормушки позволяют скармливать птице как сухой корм, так и влажные мешанки. Над желобами этих кормушек устанавливают съемные решетки или планки-вертушки, чтобы птица не залезала в кормушку и не загрязняла корм.

Для скармливания птице зеленых кормов промышленность выпускает настенную кормушку-сетку и переносную сетчатую кормушку. Из проволоки или прутков, используемых для плетения корзин, легко сделать вполне приемлемую кормушку. Ее подвешивают на доступной для птицы высоте для склевывания или выщипывания через межпрутковые зазоры закладываемой в кормушку травы или другого зеленого корма.

Для скармливания птице минеральных подкормок наиболее удобна бункерная кормушка с секциями для гравия, ракушки и мела. Кормушки для минеральной подкормки обычно подвешивают на стене; для кур и уток не выше 20 см от пола, для гусей и индеек – не выше 40 см.

Поилки для молодняка и взрослой птицы отличаются по размерам и конструкции. Для приусадебного птицеводства разработаны поилки вакуумные для поения молодняка птицы и чашечные автопоилки для поения взрослой птицы. Однако чаще всего поилки в домашних птичниках самодельные.

Поению птицы следует уделять особое внимание, так как у нее в силу физиологических особенностей происходит интенсивный обмен веществ (например, в сутки одна курица потребляет до литра воды). Зимой воду необходимо подогревать во избежание простуды.

Микроклимат в птичнике

От температурного режима, относительной влажности и освещения во многом зависят здоровье кур, их продуктивность и использование корма. Если в птичнике температура ниже, чем должна быть, то часть корма расходу-

ется не для образования яиц и увеличения живой массы, а тратится для сохранения тепла.

Температурный режим в курятнике должен быть следующим: для цыплят с 1-го по 21-й день – 26 °С; с 21-го по 49-й – 24 °С; для взрослых кур – в пределах 18 °С. Если температура в помещении выше установленной нормы, это отрицательно сказывается на яйценоскости птицы, а также приводит к уменьшению массы яиц и ухудшению качества яичной скорлупы.

Если в птичнике слишком высокая температура, то у кур наблюдается учащенное дыхание, они сидят, раскрыв клюв и распутив крылья, пьют много воды и отказываются от корма. А при повышении температуры до 38–40 °С через 2 ч птица гибнет от перегрева.

Относительная влажность воздуха в помещении должна быть от 60 до 70 %. Для этого устраивают коньковую приточно-вытяжную вентиляцию. При любом направлении воздуха такая система позволяет подавать внутрь помещения свежий воздух и удалять из него вредные газы, влажный воздух и излишнее тепло.

В птичнике наряду с естественным освещением должно присутствовать и искусственное. Для этого используют люминесцентные или лампы накаливания мощностью 40–60 Вт.

В курятнике площадью 10 м² достаточно иметь одну электрическую лампочку мощностью 100 Вт. Подвешенная на высоте 2 м от пола она способна обеспечить нормальную освещенность, которая равна 20 Лк.

При недостаточном освещении (менее 5 лк) куры плохо потребляют воду и корм. В итоге снижаются яйценоскость и прирост живой массы. Высокая освещенность (более 25 лк) приводит к каннибализму.

В первую неделю жизни цыплят освещенность поддерживают на уровне 30–50 Лк, в дальнейшем снижая ее до 20–25 Лк. Для цыплят, которых выращивают на мясо, освещенность должна быть 5–10 Лк.

Для кур, которых содержат в курятнике с окнами, световой режим меняют в зависимости от естественного освещения. Начиная с суточного возраста цыплят продолжительность освещения постепенно снижают, а в период яйцекладки увеличивают.

4.

Корма, входящие в рацион кур, должны быть разнообразными, хорошего качества и содержать все необходимые питательные и биологически активные вещества.

Концентрированные корма. Основным кормом для всех видов сельскохозяйственной птицы является зерно. В рационе птицы оно должно составлять не менее 50 %.

Так как у кур короткий пищеварительный тракт с высокой интенсивностью обмена веществ, то зерно с высокой концентрацией питательных веществ оказывается для домашней птицы самым подходящим кормом. Однако в зерне содержится мало протеина и его аминокислотный состав не полностью удовлетворяет потребности кур в продуктивном корме. Поэтому в рацион в качестве добавки обязательно следует вводить белковый концентрат.

Лучшим зерновым кормом как для взрослых кур, так и для цыплят является кукуруза. Этот корм по своей питательности превосходит все другие зерновые и к тому же содержит много углеводов.

Ячмень перед скармливанием курам рекомендуется проращивать, чтобы обогатить его витаминами группы В. Если молодняк ставят на откорм ячменем, то в результате получают нежное, сочное и вкусное мясо белого цвета.

Помимо кукурузы и ячменя куры очень охотно поедают просо. В течение первых 5–10 дней жизни цыплятам скармливают просо в виде пшена. В корм включают и отходы пшеницы. Пшеничные отруби содержат минеральные вещества, витамины группы В и Е. В пшеничных отрубях содержится высокий уровень сырой клетчатки, и поэтому курам, находящимся на откорме, и молодняку нежелательно скармливать их в больших количествах.

Взрослым курам скармливают рожь. Она может составлять до 10 % веса всех концентрированных кормов.

Белковые корма разделяются на корма животного и растительного происхождения. К кормам животного происхождения относятся обрат, пахта, мелкая рыба, мясо животных, мясокостная и рыбная мука.

К кормам растительного происхождения относятся кормовые бобы, горох, жмыхи, шроты и люпин кормовой. Обеспечить птицу полноценным белковым питанием возможно только при правильном сочетании животных и растительных кормов.

Зеленые корма являются богатым источником различных витаминов и отчасти минеральных веществ. В рацион кур их добавляют в количестве 20 % от веса концентрированных кормов. Находясь в летнее время на выгулах, куры потребляют зелени вволю.

Наиболее ценными являются зеленые части молодых растений. Хорошо использовать для кормления кур клевер, люцерну и горох в стадии бутонизации. В молодой крапиве содержатся ценные питательные вещества: каротин, витамины В, С, Е, К и др. Для скармливания курам крапиву лучше всего использовать весной или в начале лета, пока ее листья и стебли богаты разнообразными питательными веществами и еще не огрубели.

С конца июля – начала августа зеленую массу можно получать от кормовой капусты. В это время травы уже грубеют и плохо поедаются птицей, а кормовую капусту можно использовать до самой зимы, обеспечивая кур зеленым витаминным кормом. Капусту скармливают в мелконарезанном виде в сочетании с мучными кормами.

Также птицу кормят морковной и свекольной ботвой. Перед употреблением в корм ее хорошо очищают, моют и измельчают. Скармливают в составе влажных мешанок.

Хорошим зеленым кормом для кур служат листья деревьев и хвоя. В еловой и сосновой хвое содержится много витамина С и каротина. При добавке в корм хвои в качестве витаминной подкормки у кур улучшается аппетит, увеличивается яйценоскость, повышаются качество яиц, жизнеспособность молодняка и интенсивность откорма.

В зимнее время источником витаминов служит сено культурных растений, таких как клевер и люцерна. Сено хорошего качества получается, когда траву сушат в тени. Переворачивать его необходимо очень осторожно, чтобы не обсыпались листочки. Хранить такое сено следует в затемненном месте, плотно уложенным.

Корнеплоды. К ним относятся: свекла, морковь, тыква, репа и др. Сахарной свеклой можно частично заменить зерно. Ее скармливают в сыром виде в количестве 50–60 % от веса сухих кормов.

Морковь содержит большое количество провитамина А – Р-каротина и может заменить рыбий жир. Так как витаминная ценность корнеплодов быстро снижается, то их рекомендуется солить, сушить или силосовать.

Свежую морковь скармливают взрослым курам в количестве до 30 г на голову в сутки, а цыплятам – 15–20 г.

Тыква является хорошим источником каротина. Скармливают тыкву обычно в измельченном виде. Кроме того, домашней птице можно скармливать мелкие или поврежденные клубни картофеля. Перед кормлением их обязательно следует проварить. В сутки можно давать до 100 г. Цыплятам можно скармливать картофель, начиная с 15–20-го дня жизни.

Кур можно кормить спелыми томатами и арбузами (не более 20–30 г на голову в сутки).

Взрослой птице можно скармливать падалицу груш и яблок. Для этого ее измельчают и дают по 15–20 г на голову в сутки.

Минеральные подкормки. Недостающие в кормах минеральные вещества куры получают из поваренной соли, мела, известняка, ракушки морской и речной, золы, костной муки и гравия.

При правильной организации кормления куры будут нестись круглый год. Рацион должен состоять из мучной смеси и цельного зерна, из растительных кормов и кормов животного происхождения, а также из минеральных добавок.

Если кур содержат для получения от них инкубационных яиц, то в их рационе обязательно должны присутствовать корма, обогащенные витаминами с содержанием легкоперевариваемого полноценного белка.

Курам, которые предназначены на племя, в день рекомендуется скармливать до 40 г на одну голову пророщенного зерна, которое является хорошим источником витамина Е.

Витамины группы В содержатся в пекарских дрожжах, поэтому их рекомендуется скармливать вместе с комбикормом каждый день в количестве 3–5 г.

Примерный суточный рацион для кур (г на 1 гол. в сутки): зерно (ячмень, овес, пшеница и др.) – 50; мучная смесь – 50; сенная мука – 10; сочные корма – 30–50; сухие белковые корма растительного и животного происхождения – 10–15; ракушка – 5; костная мука – 2; соль – 0,5.

У взрослых кур ежегодно происходит линька, которая длится 2–4 месяца. Обычно смена пера начинается, когда уменьшается световой день, т. е. в конце августа. Птица в этот период заметно ослабевает, яйценоскость снижается или может прекратиться вообще.

Если же организовать правильное кормление кур, обеспечить им необходимую продолжительность светового дня и хорошие условия содержания, то линька начинается осенью и заканчивается через 1,5–2 месяца. Кур, которые начали линять летом, не рекомендуется оставлять на следующий год.

Во время смены пера кормление кур должно быть не таким обильным, как во время яйцекладки, но более калорийным и разнообразным. В этот период рекомендуется скармливать мясокостную и рыбную муку, обрат, свежий творог. Также в рационе обязательно должны быть мел, ракушка, гашеная известь, яичная скорлупа, разнообразные овощи, пророщенное зерно и дрожжеванные корма.

Обычно кур кормят 3–4 раза в сутки. Утром скармливают треть суточной нормы зерновых. Через 2 ч кормят влажной мешанкой. Ее дают в таком количестве, чтобы она была съедена вся без остатка в течение 30–40 мин. По мере потребления в кормушки насыпают сухую смесь. На ночь птицу кормят зерном.

Поваренную соль можно давать в виде водного раствора не более 0,5 г в сутки на одну голову. Она является источником хлора и натрия. Избыток соли вызывает у птицы жажду, ухудшение аппетита и даже отравление.

На каждые 100 г сухого корма курица потребляет 200–300 мл воды. При температуре воздуха 10–18 °С птица выпивает около 250–300 мл воды в сутки.

При повышении температуры окружающей среды и потреблении сухого корма у птицы увеличивается потребность в воде. При жаркой погоде воду следует охлаждать, а при холодной – подогревать.

5.

В приусадебном хозяйстве цыплят можно выводить в инкубаторе или под наседкой. И в первом, и во втором случае, чтобы повысить выводимость, следует производить своевременный сбор яиц и организовать правильное хранение. Обычно сбор яиц осуществляют 2 раза в день. Забирать яйца из гнезд желательно, пока они теплые, и помещать в чистое, сухое и прохладное помещение.

Чтобы собрать необходимое количество яиц для инкубации, нужно определенное время. В этот период яйца хранят в вертикальном положении, тупым концом вверх и периодически переворачивают. Температура в помещении должна быть не выше 12 °С и относительная влажность – 75–80 %.

При долгом хранении выводимость снижается, а цыплята вылупляются слабыми. Для инкубации лучше всего использовать яйца, снесенные в течение 5–7 дней.

Для инкубации отбирают яйца, которые имеют правильную форму. Также не следует оставлять яйца, которые имеют дефекты скорлупы (явные и скрытые трещины, шероховатые и складчатые, с известковыми наростами). Очень мелкие или слишком крупные яйца, старые (лежалые) тоже не рекомендуется использовать.

Вывод цыплят под наседкой

При естественной инкубации (насиживании) условия среды создает сама наседка. Инстинкт насиживания в основном проявляется у птиц весной. Куры, которые склонны к насиживанию, перестают нестись, подолгу сидят в гнездах и с неохотой покидают их. Наседки, которые громко квохчут и убегают из гнезда при приближении человека, для насиживания не подходят. Под наседку можно подкладывать не только куриные яйца, но и яйца других птиц. Лучше всего это делать вечером, осторожно приподнимая наседку.

Гнездо для наседки желательно устанавливать в том месте, где она содержится постоянно. Вместо гнезд можно использовать корзины или ящики. Их устанавливают в спокойном и затемненном месте.

Продолжительность насиживания у кур составляет 21 день. На 19-й день начинается наклев, на 20-й приходится начало вывода и на 21-й – окончание вывода. Лучшими наседками считаются местные беспородные куры. Также встречаются хорошие наседки среди пород род-айланд, нью-гемпшир, плимутрок и др.

У домашней птицы инстинкт насиживания проявляется после усиленной яйцекладки. У птиц оголяется живот, поскольку пух и перья или выпадают, или курица сама их выдергивает и устилает ими гнездо.

Бывают ситуации, когда птица не садится на гнездо. Тогда в гнездо кладут немного пуха, который выщипывают с брюшка птицы, несколько яиц-подкладышей и сажают наседку. Для этих целей лучше всего использовать более старую птицу, которая уже выводила цыплят. Гнездо с наседкой сверху накрывают ящиком или корзиной, птицу выпускают 2 раза в день для кормления.

Если в течение трех суток наседка исправно сидит на яйцах, при приближении людей к гнезду тихо квохчет и топорщит крылья, но не вскакивает с гнезда и не убегает, то ее можно считать надежной. Лучшим временем для начала высидывания яиц считают конец марта, апрель и май.

Под курицу подкладывают по 13–15 яиц. Гнездо для наседки устраивают таких размеров, чтобы в нем было место для подстилки, яиц и наседки. В гнездо насыпают подстилку толщиной 5–8 см, сверху кладут сухую и плотно примятую солому. В середину гнезда кладут свитое из соломы чашеобразное гнездышко и застилают его мягкой соломой.

Гнездо устанавливают в тихом затемненном помещении, в котором температура не ниже 10 °С. Сажать наседку на гнездо лучше всего в вечернее время. Яйца, которые не помещаются под наседкой, убирают. За ночь курица осваивается на гнезде и сидит спокойно, она сама перекатывает яйца от края к центру для равномерного прогревания.

Обычно наседка сама сходит с гнезда, чтобы поесть и попить. Кормят наседку цельным зерном, зерновыми отходами и сухой мучной смесью. Мешанки вызывают расстройство пищеварения, и поэтому их исключают из рациона.

В первые 2 дня наседку не тревожат. В последующие дни, если она не встает с гнезда, ее осторожно снимают с него и подносят к кормушке. В ее отсутствие осматривают гнездо и меняют подстилку на свежую.

Во время вывода, если птенец долго не может выйти из яйца и пищит, а подскорлупная пленка прилипает к его пуху, то маленькими кусочками осторожно отламывают скорлупу, начиная с места наклева и подсыхания пленки.

Вылупившихся птенцов оставляют подсохнуть под наседкой, а затем сажают в ящик, который выкладывают утепленной тканью, а сверху накрывают материей. Ящик с цыплятами ставят в теплое место с температурой 26–28 °С. После окончания вывода их подпускают к наседке. Под наседку можно подпускать и цыплят, выведенных в инкубаторе.

Вывод цыплят в инкубаторе

Для вывода цыплят в приусадебном хозяйстве используют бытовые малогабаритные инкубаторы на 50–1000 яиц. Самые распространенные инкубаторы – «Наседка», «Наседка-1», ИПХ-5, ИПХ-10, ИЛБ-0,5. Они универсальны и рассчитаны на инкубацию яиц всех видов сельскохозяйственной птицы. Вместе с тем режимы их работы для каждого вида яиц существенно различаются. Причем оценка выбранного режима дается по такому показателю, как выводимость яиц.

Эксплуатация инкубаторов рассчитана на условия закрытых помещений с температурой окружающего воздуха от 15 до 30 °С, относительной влажностью от 40 до 90 %, питанием от бытовой электросети напряжением 220 ± 10 В и частотой $50 \pm 0,2$ Гц.

В инкубаторах с помощью пожаробезопасных электронагревателей и терморегуляторов поддерживается заданная температура: на период инкубации яиц 37,8 °С, на период вывода молодняка 37,2 °С. При необходимости может быть задана любая другая температура в пределах 36–50 °С.

Увлажнение воздуха осуществляется за счет испарения воды из резервуара, размещенного либо внутри камеры инкубатора, либо на верхней крышке камеры с капельной подачей в зону вентиляции. Резервуар заполняется водой температурой 15–30 °С не чаще одного раза в сутки.

Необходимый воздухообмен и перемешивание воздуха в камере инкубатора обеспечивает вентилятор с электроприводом. Воздух входит и выходит через приточно-вытяжные отверстия. Степенью открытия отверстий задается кратность воздухообмена.

Яйца инкубируют в лотках, которые через каждый час при помощи механизма с электроприводом автоматически поворачивают на 45°. Вывод молодняка осуществляется в тех же лотках, но при этом в камере устанавливают дополнительные лотки, входящие в комплект оборудования.

Поскольку инкубаторы предназначены для эксплуатации в сельской местности, в них предусмотрено резервное питание от автомобильного аккумулятора напряжением постоянного тока 12 В и емкостью 55 А/ч. Допустимая длительность перерыва электроснабжения от основной сети составляет 3–5 ч. Переключение на питание от аккумулятора и обратно производится автоматически. При нормальном питании инкубатора от основной сети обеспечивается подзарядка аккумулятора с оптимальной величиной зарядного тока.

6.

При выращивании цыплят под наседкой не нужен дополнительный обогрев, так как наседка укрывает и обогревает птенцов, учит их отыскивать корм и клевать его. А вот для выращивания цыплят, выведенных в инкубаторе, следует заранее приготовить огороженное и обогреваемое место. Для этой цели можно использовать деревянный утепленный ящик или коробку со стенками высотой 40–60 см.



Рис. 34. Брудер для цыплят

Ящик устанавливают на подстилку. На дно укладывают плотную бумагу. На 1 м² пола могут разместиться 30–35 суточных цыплят. Для обогрева цыплят лучше всего использовать электрические лампы мощностью 100–150 Вт или рефлектор с металлической сеткой (рис. 34).

В первые 5 дней жизни цыплят температуру следует поддерживать на уровне 29–34 °С; с 6-го по 10-й день ее снижают до 26 °С, а затем каждую неделю понижают на 3 °С, пока она не достигнет 16–18 °С. Для измерения температуры пользуются термометром, прикрепленным на высоте 0,5 м от пола.

Если температура нормальная, то цыплята подвижны, хорошо поедают корм и размещаются равномерно по всей площади пола. При переохлаждении цыплята жмутся возле источника тепла, скучиваются и лезут друг на друга, при этом плохо поедают корм и быстро слабеют. При большом скучивании слабые цыплята погибают.

При переизбытке тепла молодняк располагается подальше от его источника, птенцы раскрывают клюв, часто пьют воду и лежат, распушив перья, а также плохо едят.

Для обогрева ящика сверху прикрепляют 1–2 рефлектора, в которые вместо нагревательных элементов ввинчивают лампочки по 40–60 Вт. Другое простое устройство: в ящик помещают фляжку, грелку с горячей водой, которую оборачивают шерстяной тканью или ватой в 2 слоя, и периодически меняют воду. Молодняк охотно располагается возле такого источника тепла, при этом в ящике создается оптимальная температура.

В первые 10 дней при выращивании цыплят используют круглосуточное освещение. Далее продолжительность светового дня постепенно уменьшают и доводят ее до 9–10 ч для 2-месячных цыплят. Такой световой режим поддерживают до начала яйцекладки. Мощность электроламп в помещении должна быть в пределах 3–4 Вт на 1 м² пола.

Начиная с 5-дневного возраста при безветренной солнечной погоде молодняк полезно выпускать на выгул. Под влиянием солнца в организме цыплят образуется витамин D, предохраняющий их от заболевания рахитом.

7.

Содержание гусей на ферме не требует каких-то особых затрат на устройство помещений, поскольку взрослые птицы нуждаются лишь в укрытии зимой (обычный сарай). Почти все время гуси проводят на земле или на

пастбище, а откладывая яйца, редко пользуются гнездами. Гусята летом довольствуются простейшими навесами.

Птица неприхотлива: питаясь преимущественно травой, в том числе и сорной, отходами овощей с небольшим количеством комбикорма, к осени она способна набрать от 4 до 6 кг веса. Даже на небольшом подворье без усилий можно вырастить 3–5 птиц и более.

Большую часть корма птица получает за счет пастьбы и заботится о своем потомстве от яйцекладки и высиживания яиц до приобретения гусятами самостоятельности. При принудительном откорме гусь дает большой прирост нежного жира и крупную жирную печень. Яйценоскость гусынь зависит от их породы и кормления, а также от того, где находятся гусята – под наседкой или в инкубаторе. Еще одно достоинство гусей – их долголетие. Зачастую их можно держать 6–8 лет.

Породы гусей

Современные породы гусей можно классифицировать по величине взрослых птиц. Птицеводы различают 3 класса пород: крупные (тяжеловесные), средние и мелкие. Наиболее широко распространены крупные гуси, они же и лучше всего адаптированы для коммерческого разведения. Гуси среднего размера предпочтительны в приусадебном хозяйстве. Так называемые мелкие породы довольно редки, служат в основном для декоративных целей и разводятся, как правило, в общественных парках и частных владениях.

По происхождению и полезным качествам породы гусей можно разделить на 3 группы. Первая группа – гуси китайского происхождения (китайские, кубанские, переяславские, горьковские). Характеризуются высокой яичной продуктивностью, но небольшой живой массой. Вторая группа – западноевропейские гуси (тулузские, крупные серые, виштинес, эмденские, рейнские, итальянские). Они имеют более рыхлую конституцию и сравнительно высокую яйценоскость. Третья группа – восточноевропейские гуси (роменские, арзамасские, уральские). Отличаются высокой жизнеспособностью, но низкой продуктивностью.

В отличие от сельскохозяйственной птицы других видов гуси более позднеспелые. Половая зрелость у них при обычном содержании наступает в 240–310-дневном возрасте. С увеличением возраста повышается яйценоскость гусей – ежегодно (до 3-летнего возраста) на 15–20 %, кроме гусей китайской и кубанской пород.

В подсобных хозяйствах и на небольших крестьянских фермах наиболее перспективны гуси таких пород, как холмогорская, крупная серая, тулузская, линдовская, калужская, итальянская белая, горьковская, рейнская белая, кубанская, арзамасская, тульская, китайская и др. Эти породы больше всего подходят для выращивания птицы на мясо.

Гуси китайской породы выведены в Китае и произошли от дикого шишковатого гуся (рис. 35).



Рис. 35. Гуси китайской породы

Туловище яйцевидной формы, несколько приподнятое спереди. Голова большая, длинная, с большой шишкой на лбу, длинным прямым и черным клювом. Глаза коричневые. Шея длинная, лебединая. Грудь округлая и выпуклая. Спина прямая, покатая. Крылья хорошо развиты и плотно прилегают к туловищу. Хвост небольшой, немного приподнят. Ноги средней длины, крепкие. Оперение может быть белое, серое или пегое. Чаще встречаются китайские гуси с темно-серым оперением.

Масса взрослых гусаков составляет 5 кг, гусынь – 4,0–4,5 кг. Яйценоскость – в пределах 50–70 яиц в год, а у лучших гусынь может достигать 100 яиц в год. Масса яиц – 140–160 г. Инкубационные качества хорошие, в среднем выводится 75–80 % гусят от числа заложённых яиц. К 60–70-дневному возрасту гусята достигают массы 3,0–3,5 кг.

Гуси горьковской породы выведены в Горьковской области путем сложного воспроизводительного скрещивания китайских с местными гусями и прилития крови солнечногорских гусей с последующим разведением «в себе».

По экстерьеру горьковские гуси близки к холмогорской породе и сохраняют тип китайского гуся. Туловище гусей широкое, глубокое, длинное, с приподнятым поставом. Голова удлинённая, среднего размера, с небольшим шишковидным наростом на лбу и прямым, несколько удлинённым клювом. Шея длинная, изогнутая. Грудь выпуклая, не очень широкая. Крылья прилегают к туловищу. Хвост небольшой, приподнятый. Ноги средней длины, оранжево-красные. Оперение белое, серое или пегое.

Масса гусаков – 6 кг, гусынь – 5 кг. Яйценоскость составляет 60–70 яиц в год средней массой 150 г. Инкубационные качества яиц хорошие. Половая зрелость у гусынь наступает в 8-месячном возрасте. Жизнеспособность птицы высокая.

Тулузская порода гусей создана во Франции из одомашненных диких серых гусей путем улучшения условий содержания и целенаправленного отбора и подбора (рис. 36).




Рис. 36. Гуси тулузской породы

Птица крупная. Туловище массивное, широкое и глубокое. Голова широкая, короткая, с клювом оранжево-красного цвета. Под клювом имеется складка кожи – «кошелек». Шея относительно короткая, толстая. Грудь очень глубокая, широкая, несколько выпуклая. Спина широкая, прямая. Крылья сильно развиты, плотно прижаты к туловищу. Хвост небольшой, слегка приподнят. Ноги короткие, крепкие, оранжево-красные. На животе две сильно развитые жировые складки. Оперение серое, на животе белое.

Масса гусаков – до 10 кг, гусынь – 8 кг. Яйценоскость составляет 30–40 яиц за один цикл яйцекладки. Масса яиц – 170–200 г. Скорлупа белого цвета. Выводимость яиц от числа заложённых в инкубатор – около 60 %.

Сохранение молодняка при выращивании хорошее (свыше 90 %). К 2-месячному возрасту молодняк достигает массы до 4 кг.

При разведении в холодных климатических условиях тулузские гуси снижают продуктивные качества и быстро мельчают.

Арзамасская порода гусей выведена в Горьковской области из местных гусей путем отбора и подбора, направленного на повышение массы тела (рис. 37).



Рис. 37. Гуси арзамасской породы

Туловище горизонтально поставленное, широкое и глубокое. Голова небольшая, округлая, с голубыми глазами и коротким прямым клювом. Встречаются особи с ноженосым и горбоносым клювом. Шея средней длины. Грудь широкая, глубокая, выпуклая. Спина недлинная, прямая, широкая. Крылья развитые, плотно прилегают к туловищу. Хвост небольшой. Ноги высокие, крепкие. Оперение в основном белое, но встречается серое и пегое.

Масса тела гусаков – 6 кг, гусынь – 5 кг. Яйценоскость небольшая – 15–20 яиц в год. Масса яиц – около 200 г. Инкубационные качества хорошие. Жизнеспособность птицы высокая.

Гуси крупной серой породы созданы в Украинском научно-исследовательском институте птицеводства и госплемптице заводе «Арженка» Тамбовской области путем скрещивания роменских с тулузскими. Селекция велась в направлении повышения массы тела и яйценоскости.

Туловище гусей глубокое и широкое. Телосложение крепкое. Голова средней величины, с коричневыми глазами и коротким толстым клювом оранжевого цвета. Шея короткая, толстая. Грудь широкая, выпуклая. Спина длинная, очень широкая. Крылья плотно прилегают к туловищу. Хвост небольшой, по цвету оперения несколько светлее, чем туловище. Ноги невысокие, крепкие, широко расставленные, красные, на животе две жировые складки. Оперение серое, на кочне белое (рис. 38).



Рис. 38. Гуси крупной серой породы

Масса тела взрослых гусаков – около 8 кг, гусынь – 6 кг. Яйценоскость небольшая – 35–45 яиц в год. При двух циклах она увеличивается до 60 яиц. Средняя масса яиц – 175 г. Вывод гусят от числа заложённых яиц составляет 58 %. Жизнеспособность молодняка и взрослой птицы хорошая.

Масса гусят в 60-дневном возрасте составляет 3,5–4,0 кг.

Крупных серых гусей используют в качестве отцовской формы при скрещивании с переяславскими, кубанскими, рейнскими и китайскими для получения гусят-бройлеров.

Адлерская порода гусей выведена на Адлерской птицефабрике, где местных серых гусей, масса которых небольшая, но высокая яйценоскость,

скрестили с крупными серыми гусями, завезенными из ГППЗ «Арженка» Тамбовской области.

Адлерские гуси по экстерьеру и хозяйственно полезным признакам похожи на крупных серых гусей. У них тоже хорошие мясные качества, но недостаточная яйценоскость, оплодотворенность яиц и выводимость гусят. Цвет оперения белый.

Масса гусakov составляет 7–9 кг, гусынь – 5–7 кг. Яйценоскость – до 40 яиц в год. Масса яиц – 170 г. Масса гусят в 60–65-дневном возрасте – 4,0–4,5 кг.

Холмогорская порода гусей выведена в районах Курской, Белгородской, Воронежской областей скрещиванием местных гусей с китайскими, при тщательном отборе и подборе производителей. Помеси в течение нескольких десятилетий разводили «в себе» при улучшенном кормлении и содержании (рис. 39).

Холмогорские – старейшая отечественная порода гусей с хорошими хозяйственно полезными признаками. Птица обладает крепкой конституцией, вынослива, хорошо акклиматизируется. Туловище гусей массивное, длинное, глубокое и широкое, горизонтально поставленное. Голова большая, удлинённая, с шишковидным наростом на лбу, с голубыми глазами у белых гусей и коричневыми – у серых. Клюв прямой, длинный, оранжево-красного цвета. Шея длинная, в верхней части красиво изогнутая, с «кошельком». Грудь широкая, глубокая, выпуклая. Спина прямая, слегка покатая к хвосту. Крылья сильно развиты, плотно прилегают к туловищу. Хвост небольшой. На животе имеются жировые складки. Ноги невысокие, крепкие, оранжево-красные. По окраске оперения холмогорские гуси могут быть белые, серые и пегие.



Рис. 39. Гуси холмогорской породы



Рис. 40. Гуси итальянской белой породы

Масса гусakov достигает 8–10 кг, гусынь – 7–7,5 кг. Яйценоскость – 30–40 яиц в год. Лучшие гуси откладывают за год до 50 и даже 80 яиц. Масса яиц – 180–220 г. Инкубационные качества хорошие. Молодняк и взрослая птица обладают высокой жизнеспособностью. При интенсивном откорме к 60-дневному возрасту гусята достигают живой массы около 4 кг при затратах корма 3 кг на 1 кг прироста.

Итальянская белая порода гусей получена в результате усовершенствования местных гусей (рис. 40).

Масса взрослых гусakov превышает 7 кг, гусынь – 6 кг. Молодняк быстро растет и обладает высокой энергией роста. В 9–10-недельном возрасте масса гусят достигает 4,3–4,5 кг. Яйценоскость в среднем составляет 47 яиц в год, масса яиц – 165 г. Выводимость гусят от числа заложенных в инкубатор яиц – около 70 %.

Итальянские белые гуси хорошо откармливаются для получения большой жирной печени. При массе тушки взрослых гусей, достигающей 8,8

кг, масса печени составляет 625 г, или 7 % от убойной массы.

Итальянские белые гуси завезены в колхоз «Россия» Липецкой области, Краснодарский край, Новосибирскую и Московскую области.

Ландшская порода гусей выведена в Венгрии и используется для производства гусяной печени.

Масса гусей составляет в среднем около 5 кг. Гуси на откорме достигают массы 8 кг, их печень – 700–730 г. При скрещивании ландшских и рейнских гусей помеси первого поколения достигают массы 9,8 кг, их печень – 817 г.

Курчавые, или ленточные, гуси известны как мохнатые или шелковистые и, кроме того, – турецкие или астраханские.

Характерная особенность этой разновидности домашних гусей – длинные извитые перья на плечах, крыльях, среди покровных перьев спины и хвоста. Кроме того, отмечается замедленная оперяемость, рост и развитие молодняка. Оперение белого и серо-белого цвета.

Раньше, когда гуси этой породы были распространены, они имели достаточно высокие показатели продуктивности. В настоящее время курчавых гусей разводят в ограниченном количестве и они имеют сравнительно низкие хозяйственно полезные признаки.

Масса взрослых гусак составляет 5–6 кг, гусынь – около 4 кг. Яйценоскость в среднем не превышает 35–40 яиц. К 70-дневному возрасту масса гусят достигает 3,5 кг.

Выращивание гусят

Гусята обладают высокой интенсивностью роста, особенно быстро они растут в первый месяц жизни. Если в суточном возрасте их живая масса составляет 100–120 г, то в 30-дневном она достигает более 2 кг. За 60–70 дней выращивания гусята при хорошем кормлении и содержании увеличивают свою первоначальную живую массу в 35–40 раз, достигая массы 4,0–4,5 кг. Чтобы достичь таких результатов, необходимо придерживаться правильной технологии выращивания.

Гусят размещают в теплом, тщательно вымытом и побеленном помещении с чистой, сухой подстилкой. Обогревать гусят, выращиваемых без наседки, можно с помощью грелки. Чтобы гусята нормально росли и развивались, в грелке должна поддерживаться следующая температура: с 1-го по 5-й день – 28–32 °С; с 6-го по 10-й день – 24–28; с 11-го по 20-й день – 18–24 °С. С 3-недельного возраста молодняк уже не нуждается в обогреве.

Выращивание гусят с гусыней или без нее может быть правильно организовано только в том случае, если есть возможность предоставить им хорошее пастбище. На выгул гусят можно выпускать с третьего дня жизни, как только они окрепнут. В первые недели их нельзя выпускать в ветреную и дождливую погоду. Двух-, трехнедельные гусята уже целый день могут проводить на пастбище, и только на ночь их необходимо загонять в помещение.

Чтобы хорошо сохранить и вырастить гусят, необходимо заблаговременно подготовить помещение. Его тщательно очищают от старой подстилки и помета, моют и дезинфицируют 2%-ным раствором каустической соды или

другими дезинфицирующими средствами, имеющимися в хозяйстве. В гусятнике должно быть тепло, сухо и чисто.

Для утепления помещения и поддержания в нем чистоты на пол кладут подстилку. Предварительно пол посыпают известью-пушонкой из расчета 0,5–1,0 кг на 1 м² его площади. В качестве подстилки применяют любой подстилочный материал, имеющийся в хозяйстве, но он обязательно должен быть сухим и без плесени. Для выращивания одной головы с 1- до 65-дневного возраста требуется 7,5 кг подстилки. При содержании гусят подстилка промокает больше, чем у цыплят или индюшат, поэтому каждые 2–3 дня ее обновляют.

В первый период выращивания (от 1 до 10 дней) для поения гусят лучше использовать автоматические поилки, пластиковые или из стеклянных банок емкостью 0,5; 1 и 3 л. Чтобы сохранить подстилку в сухом состоянии, поилки ставят на железные противни, накрытые металлической сеткой.

В первый день гусят кормят из лотков с высотой бортиков 15–20 мм. С 2-дневного возраста гусят начинают кормить из корытцев, так как на лотках они затаптывают корм. По мере подрастания, с 30-дневного возраста гусят кормят из кормушек, предназначенных уже для взрослых гусей. При этом фронт кормления при влажном типе составляет 15 см на одну голову. Кормушек должно быть столько, чтобы в период кормления гусята могли подходить к ним все одновременно.

Откорм гусей

Обычно в августе гусят начинают откармливать. К этому времени у молодняка раннего вывода живая масса достигает 3,5–4,0 кг и более. В начале откорма гусей продолжают пасти и подкармливают зерном 1–2 раза в день. Последние 15 дней откорма птицу обильно кормят зерновой смесью 3–4 раза в день и не выпускают на пастбище.

Откармливать гусей можно на любых доброкачественных кормах, кроме ржи и вики: эти корма ухудшают качество жира.

В первый период откорма на каждый килограмм живой массы гусям дают по 30–35 г зерна в каждую кормежку. Подкармливают их, как правило, утром и вечером. Во 2-й период откорма, когда перестают выпасать, гусям дают в день по 135 г зерна в расчете на каждый килограмм живой массы.

Через 20 дней откорма хорошо упитанных, с жировыми отложениями на груди и особенно под крылом гусей можно забивать. Если гусяное мясо предназначено для домашнего использования, период откорма гусей следует растянуть – откармливать не сразу всю птицу, а небольшими партиями.

Молодняк для ускоренного выращивания содержат в загонах, давая ему вволю зерновые корма и зелень, не выпуская на пастбище. При таком способе откорма масса 70–75-дневного молодняка достигает 4,0–4,5 кг; выход съедобных частей в тушке составляет 63–65 %, а количество жира в мясе – 18–24 %.

Если семье не требуется много мяса в летний период, интенсивный способ откорма гусят можно комбинировать с обычным, пастбищным содержанием.

Свежую нарубленную зелень лучше давать молодняку утром и вечером, когда она не так быстро высыхает. Кормушки с зеленью ставят всегда в затененных местах. Увлажненные рассыпчатые мешанки во избежание закипания кладут в кормушки в таком количестве, чтобы гусята всю порцию съедали в течение 30–40 мин. Мешанки надолго оставлять в кормушке нельзя. Количество кормов увеличивают постепенно. Всего за 75 дней выращивания расходуется 10–12 кг зерновых кормов и 25 кг зеленой травы.

Откорм гусей на жирную печень

Жирная гусиная печень – деликатесный высокопитательный продукт превосходного вкуса, с приятным ароматом. Высокие вкусовые качества присущи только крупной жирной печени, полученной при специальном откорме, в результате которого масса печени увеличивается со 100–150 г до 700–900 г.

Лучшими породами гусей для откорма считают ландскую, венгерскую. Перед принудительным откормом проводят предварительный откорм в течение 1,5–2,0 недель до 12–13-недельного возраста. Для этого гусей размещают в закрытых помещениях по 100–200 гол. в секции при плотности посадки 2 гол. на 1 м². В рацион включают до 50 % запаренной кукурузы, 20 % кукурузной дерти и 30 % белковых кормов. Гусей кормят порциями 5 раз в сутки.

За неделю до постановки гусей на принудительный откорм им дают повышенную дозу витаминов А и С (в 2 раза больше нормы), чтобы ослабить стресс у птицы. В 12–13-недельном возрасте гусей переводят на принудительный откорм. К этому возрасту они должны иметь живую массу не менее 4,2–4,5 кг.

В период откорма применяют высокую плотность посадки – 6 гол. на 1 м², чтобы снизить активность птицы. Желательно гусей содержать небольшими группами по 10–12 гол. или в одноярусных клетках по 3 головы в каждой. Размеры одной клетки: высота – 600 мм, ширина – 500 мм, длина – 750 мм.

Для откорма используют запаренную кукурузу. Запаривают ее в горячей воде в течение 30–40 мин и скармливают в теплом виде через 2–3 ч после запаривания. Перед скармливанием добавляют 0,5–1 % поваренной соли, которая не только улучшает вкус корма, но и способствует увеличению массы печени. Вводят также растительный или технический жир, способствующий повышению питательности корма. Установлено, что добавка 2 % технического жира способствует увеличению массы печени. Технический жир и соль добавляют в еще не остывший после запаривания корм и тщательно перемешивают. При принудительном откорме гусей используют специальную откормочную машину со шнеком для подачи корма (рис. 41).

Техника откорма заключается в следующем: оператор фиксирует птицу. Левой рукой он захватывает голову гуся и сдавливает ее у основания клюва указательным и большим пальцами. В открытый клюв оператор вводит палец правой руки и придавливая язык к нижней челюсти, осторожно вводит в рот трубку машины, предварительно смазанную жиром, в пищевод.

После этого он педалью включает машину, и пищевод заполняется кормовой смесью. Оператор контролирует заполнение пищевода по плотности и толщине находящегося там корма.




Рис. 41. Машина для принудительного откорма птицы

Корм перестают вводить, когда он будет находиться на 1–2 см ниже гортани. Правой рукой оператор закрывает клюв, чтобы птица не вдыхала воздух, и вытягивает ее шею вертикально вверх, чтобы корм не попал в гортань. После этого он указательным и большим пальцами левой руки 3–4 движениями продвигает корм вниз по пищеводу. Не следует слишком плотно (особенно в первые 7 дней) набивать пищевод кукурузой, так как это может привести к его разрыву. В первые 3 дня гусей кормят 2 раза, а в конце откорма – 6–8 раз в сутки. Начиная с 10-го дня гусей кормят почти

круглые сутки, через каждые 3–4 часа.

Перед тем как приступить к следующему кормлению, оператор проверяет каждого гуся: переварен ли корм, полученный во время предыдущего кормления. Если обнаруживается, что корм не переварился, то кормление следует отложить на несколько часов.

Затраты времени на кормление одного гуся составляют 40–60 с. Продолжительность откорма составляет 28–35 дней в зависимости от возраста и породы гусей. Расход кукурузы за весь период откорма – 18–20 кг на голову. В конце 3-й недели откорма откормленных гусей отбирают для убоя. Готовые для убоя гуси тяжело дышат, малоподвижны, имеют впалые глаза и беловатый клюв. Гусей, не достигших такого состояния, задерживают на откорме на несколько дней до появления у них соответствующих признаков.

Прижизненная ощипка гусей

Перо и пух водоплавающей птицы являются ценным сырьем для изготовления подушек, одеял, меховых курток, декоративных цветов и других изделий, поэтому максимальное их получение может быть источником пополнения семейного бюджета. Гусиное перо отличается мягкостью, легкостью, упругостью, прочностью, низкой гигроскопичностью и теплопроводностью.

После окончания яйценоскости (примерно в июне-июле) у гусей начинается естественная линька. Чтобы не потерять это ценное сырье, необходимо провести ощипку гусей. Процесс снятия пера у гусей при начавшейся естественной линьке протекает безболезненно, так как старое перо выталкивается вновь растущим.

В стаде не все гуси линяют одновременно. При проведении ощипки обращают внимание на особей, приступивших к линьке раньше других и имеющих много новых, не вполне сформированных перьев, выщипывание которых недопустимо. Если новые перья отросли на такую длину, когда трудно распознать, новые они или старые, то в этом случае следует выдернуть несколько перьев и посмотреть очин. Если он сухой и прозрачный, то

перо полностью развито. У молодых перьев очин наполнен кровью, такие перья щипать нельзя, так как пуховая часть опахла не развита и все перо не обладает необходимой эластичностью.

Сбор пера и пуха зависят от количества имеющейся в хозяйстве птицы, подлежащей ощипке. За день перед ощипкой гусям дают возможность хорошо выкупаться (лучше в водоеме) и очистить перья от грязи и пыли. Утром следующего дня оставляют такое количество птицы, которое будет ощипано в первой половине дня. Ощипанных гусей оставляют во дворе (в загоне) до следующего дня или выпускают на пастбище, если оно расположено недалеко от дома.

Ощипанную птицу не следует смешивать с неощипанной, так как частая перегонка, сортировка и другие передвижения неблагоприятно отражаются на гусях. После ощипки всех гусей объединяют снова в одно стадо. Ощипывать гусей можно в любом удобном помещении, светлом и чистом. Все операции при ощипке проводят осторожно, внимательно и спокойно, так как гуси от природы птицы нервные и не терпят скученности.



Рис. 42. Прижизненная
ощипка гуся

Ощипку пера осуществляют следующим образом. Щипальщик, сидящий на стуле, кладет себе на колени гуся спиной вниз и ногами от себя, которые или завязывает, или левой рукой придерживает, а правой начинает снимать мелкое перо с нижней части туловища (рис. 42). Затем переворачивает гуся на живот и снимает перо с нижней части шеи. Пух на этих местах полностью не снимают, а только разреживают до такой степени, чтобы не проявились оголенные места.

При ощипке шею гуся придерживают локтем левой руки. Особенно необходимо следить за тем, чтобы крылья были плотно прижаты к спине, так как птица будет пытаться размахивать ими и освободиться.

Прежде чем приступить к ощипке, нужно несколько раз провести правой рукой по перьям живота против их расположения, чтобы удалить пыль, убедиться в целостности кожных покровов (отсутствии травм) и установить наличие или отсутствие молодых, растущих перьев. Ощипку следует проводить указательным и большим пальцами правой руки. Чтобы не порвать кожу при ощипке, в один выщип берут небольшое количество перьев по направлению расположения последних.

Начинать ощипку пера следует от заднего конца киля грудной кости. Когда перья задней части брюшка удалены, продолжают их снимать с передней части до подвздошковой впадины. Затем снимают перо с задней части спины и шеи. Ни в коем случае нельзя снимать вместе перо и пух. Необходимо сначала снять перо, а затем пух. Остаются неснятыми перья крыла, хвоста, верхней части шеи, плеча и бедра.

За одну ощипку с гуся получают до 120–150 г пуха и пера. В южной зоне страны гусей можно ощипывать дважды. Второй раз ощипывают, как только у них полностью отрастет оперение (примерно в конце сентября –

начале октября). При плюсовой температуре окружающей среды и полном формировании перьевого покрова (через 20 дней после отрастания перьев) у гусей наступает частичная линька, при которой покровные перья туловища сменяются. Перья крыльев, хвоста, бедер, плеча 2-й раз не сменяются. Процесс выщипывания перьев у гусей в этот период проходит безболезненно. За двукратную ощипку с гуся собирают до 240–300 г пера и пуха.

В процессе ощипки птица ведет себя в большинстве случаев спокойно. После ощипки в течение первого дня птица немного возбуждена, нервна и боязлива. Однако такое состояние быстро проходит, и гуси с аппетитом начинают поедать предложенный корм.

8.

Практически все известные породы уток очень продуктивны, хотя каждая по-своему. Все зависит от района разведения, климата, экономической выгоды и хозяйственного использования.

По направлению продуктивности породы уток делятся на мясные, мясо-яичные, яичные и декоративные.

Породы мясного направления продуктивности

Черная белогрудая порода уток выведена на экспериментальной базе Украинского НИИП путем скрещивания местных украинских белогрудых уток с пекинскими и хаки-кемпбелл (рис. 43).



Рис. 43. Утки черной белогрудой породы

Птица имеет слегка приподнятое, глубокое и широкое туловище с очень широкой и глубокой грудью. Голова удлинённая, с черными блестящими большими глазами и черным, немного выгнутым, средней длины клювом. Спина широкая, длинная, с наклоном от плеча к хвосту. Ноги расположены ближе к задней части туловища, невысокие, умеренной толщины, черного цвета. Крылья крепкие, небольшие, плотно прилегающие к туловищу.

Оперение черное. Часть груди и живота белые. У селезней верхняя часть шеи с сине-фиолетовым отливом. На крыльях имеется «зеркало» с зеленоватым или фиолетовым отливом.

Масса селезней составляет 3,5–4,0 кг, уток – 3,0–3,5 кг. За один продуктивный цикл утки откладывают 120–130 яиц, отдельные рекордистки – до 210 яиц. Масса яиц – 80–90 г. Скорлупа белая. Инкубационные качества хорошие. Утята к 60-дневному возрасту достигают массы 2 кг. Половая зрелость наступает к 6-месячному возрасту. Жизнеспособность молодняка и взрослых уток высокая. Утки хорошо используют корма водоемов.

Пекинская порода уток выведена в Китае более 300 лет назад. Широко распространена почти во всех странах мира (рис. 44).

В XIX в. пекинские утки были завезены из Китая в Америку, где им была прилита кровь уток эйльсбюри. Благодаря большой селекционной рабо-

те пекинские утки стали одной из лучших мясных пород, отличающихся скороспелостью и мясными качествами.




Рис. 44. Утки пекинской породы

В Европе пекинские утки получили широкое распространение в период строительства инкубаторно-птицеводческих станций и развития общественного птицеводства в конце двадцатых и начале тридцатых годов прошлого столетия. В 1935 г. пекинские утки были завезены из Англии в Кучинский селекционный птицерепродуктор, где с ними вели углубленную племенную работу.

Туловище глубокое, широкое, длинное, приподнятое, с высокой, широкой, выпуклой грудью. Голова большая, широкая, с большими блестящими и глубоко посаженными темно-голубыми глазами и выпуклой лобной частью. Клюв оранжево-желтый, несколько вогнутый, небольшой. Шея средней длины, несколько изогнутая в верхней части. Спина широкая, длинная, слегка наклоненная от плеч к хвосту. Крылья крепкие, небольшие, плотно прилегающие к туловищу. Ноги невысокие, толстые, красновато-оранжевого цвета, поставлены несколько ближе к задней части туловища. Оперение белое с желтовато-кремовым оттенком. Новое перо после линьки имеет более кремовый оттенок, но после двух-трех месяцев становится абсолютно белым.

Масса взрослых уток – 3,0–3,6 кг, селезней – 3,5–4,0 кг. Яйценоскость птицы за один цикл составляет 140–180 яиц, может достигать 200 яиц при средней массе их 85 г. Жизнеспособность молодняка и взрослой птицы хорошая.

Утята при обильном кормлении к 50-дневному возрасту могут достигать массы 3 кг и более.

По откормочным качествам пекинские утки занимают ведущее место в утководстве, уступая по качеству мяса только руанским и эйльсбюри. Птица этой породы в нашей стране распространена повсеместно.

Серые украинские утки выведены путем направленной селекции. Утки крепкие, подвижные, хорошо фуражируют на водоемах и отличаются скороспелостью, высокой яйценоскостью и хорошими мясными качествами (рис. 45).



Рис. 45. Утки украинской серой породы

Туловище глубокое, широкое, приподнятое. Голова небольшая, слегка вытянутая, с большими глазами, темно-бурая с двумя темными полосками. Клюв большой и имеет зеленую окраску у селезней и коричневую у уток. Шея средней длины, слегка изогнутая. Грудь широкая, глубокая, выпуклая. Крылья небольшие, плотно прилегающие к туловищу. Хвост несколько приподнят. Ноги невысокие, крепкие, розово-красные. Оперение у селезней на голове темно-серое или почти черное с блестящим зеленоватым отливом. Спина черно-бурая. Шея черно-бурая с белым ошейником. Грудь красно-бурая. Нижняя

часть туловища светло-серая. Шея, спина, грудь и нижняя часть туловища бурые, крылья серо-бурые с блестящими синими «зеркальцами», окаймленными по бокам черными и белыми полосками.

Масса тела селезней – 3,5 кг, уток – 3,0 кг. Яйценоскость в среднем за один цикл составляет 120 яиц массой 80–90 г. Скорлупа белая, прочная. Инкубационные качества яиц хорошие. Утята быстро растут, хорошо сохраняются и к двум месяцам достигают массы свыше 2 кг.

Половая зрелость наступает в возрасте около 6 мес. Яйцекладка продолжается в течение 6–7 мес. Жизнеспособность птицы высокая.

Распространены в Украине и на Северном Кавказе.




Рис. 46. Утки мускусной породы

Мускусные утки ведут свое происхождение от южноамериканской древесной утки. Туловище широкое и длинное, расположенное горизонтально. У селезней крупная удлиненная голова, у уток она средней величины. У селезней кожа вокруг глаз и клюва красная (рис. 46). Такого же цвета складки и наросты, расположенные на голове. Они выделяют жир с запахом мускуса.

Мускусная утка, или индоутка, в диком виде обитает в тропиках Южной Америки и гнездится на деревьях. Прижилась она и в наших хозяйских подворьях, где стала популярной благодаря необычайно вкусному мясу и неприхотливости в содержании. Мускусные утки выносливы, скороспелы, могут обходиться без водоема, хорошо переносят морозы.

В отличие от пекинских у мускусных уток больше мышечной ткани (54 % против 41) и гораздо меньше жира (22 % против 37). От каждого взрослого селезня можно получить 700–800 г, а от утки – 350–400 г грудных мышц, в то время как от пекинских соответственно 350 и 320 г. Убойный выход мускусных уток на 8–10 % превышает убойный выход пекинских уток. На протяжении своей эволюции мускусные утки обитали постоянно в зонах повышенной температуры внешней среды, не пользовались сезонными перелетами, у них не было необходимости накапливать согревающий подкожный жир и создавать его запасы. Эту особенность сохранили они до настоящего времени.

Характерный признак мускусной утки – бородавчатая кожа на лобной и лицевой части головы. Так же, как и гусь, она хорошо использует корма с высоким содержанием клетчатки. Разведение этой утки не очень сложно, поскольку у нее сохранен инстинкт насиживания яиц и выращивания утят до наступления их самостоятельности.

Утка имеет очень жесткие перья, сильные цевки и когти. Она сохранила способность летать. С породами уток, происходящих от кряквы, она дает бесплодное потомство, но высокой живой массы. Откормленные гибриды достигают 6–7 кг, и их печень можно сравнить с печенью принудительно откармливаемых гусей. У селезней нет кольцеобразных перьев на хвосте, но они гораздо крупнее уток.

Индоутки – прекрасные мамы: опекают утят, обучают их премудростям существования, что не мешает вовремя начать кладку яиц. Мускусные утки не издают громких звуков, лишь селезни тихо шипят, а если чем-то возбуждены, у них поднимаются перья на голове в виде хохолка, поэтому их в народе и окрестили индоутками.

Яйца начинают откладывать в возрасте 180–200 дней и несут до 120 штук в год. Живая масса селезня – 5 кг, а утки – 3 кг. Гибриды от скрещивания их с другими породами весят до 7 кг. Селезни и утки имеют яркое контрастное оперение – сине-черное, белое и пестрое. Селезней украшают кораллы – красные мясистые наросты над клювом, а между основанием клюва и ноздрями – мясистая шишка. У уток наросты поменьше.

Мясо уток постное, темного цвета, нежное, по вкусу напоминает мясо дичи, считается диетическим. По питательности оно превосходит мясо цыплят-бройлеров. Голову, ноги, крылья можно использовать для холодца; печень, легкие и желудок – для деликатесных супов. Яйца, сваренные вкрутую, душисты, приятны на вкус.

Другие достоинства мускусных уток:

небольшое поголовье (1 селезень и 5–6 уток) можно прокормить различными кухонными и огородными отходами при минимальных затратах на покупные корма;

хорошо переносят холода и не нуждаются в обогреваемом помещении. Главное для них зимой – сухой пол и свободный доступ к воде;

возможность обходиться без открытой воды;

обладают устойчивым видовым иммунитетом ко многим инфекционным заболеваниям;

они дают постную тушку с нежным мясом, в отличие, например от пекинских уток, которые бывают слишком жирны, а жирное мясо, как известно, нынче не особо ценится;

селезни почти вдвое крупнее уток, а если учесть, что из 13–15 яиц от одной наседки селезни составляют больше половины, то выгода очевидна.

Все это с лихвой покрывает такие недостатки мускусных уток, как большой срок инкубации яиц (33–35 дней), более длительный, чем у цыплят-бройлеров, период выращивания на мясо (11–12 недель), а также цикличность яйценоскости (весной и осенью).

Породы мясо-яичного направления продуктивности

Утки породы хаки-кемпбелл выведены Кемпбеллом в конце XIX в. в Англии путем скрещивания индийских бегунов, руанских и маларадских уток (рис. 47).

Туловище уток цилиндрической формы, слегка приподнятое, длинное. Голова несколько удлинённая, с коричневыми глазами и темным клювом. Шея средней длины, изогнутая в верхней части. Грудь округлая, выпуклая. Спина ровная, широкая, немного опущенная к хвосту. Крылья хорошо развиты и плотно прилегают к туловищу. Хвост небольшой, немного приподнятый. Ноги невысокие, коричневые.



Рис. 47. Утки породы хаки-кемпбелл

По окраске оперения существуют три разновидности уток породы кемпбелл: дарк-кемпбелл, хаки-кемпбелл и уайт-кемпбелл. В Россию были завезены только утки окраски хаки-кемпбелл, так и названа эта порода в нашей стране.

Масса селезней варьирует от 2,8 до 3,3 кг, уток – 2,3–3,3 кг. Утята к двум месяцам достигают массы 1,7 кг. Средняя яйценоскость за один продуктивный цикл составляет 180–200 яиц. Скорлупа белая. Масса яиц – 80 г. Инкубационные качества хорошие. Жизнеспособность молодняка и взрослой птицы высокая. Половая зрелость наступает в 6-месячном возрасте.

Мясо уток хаки-кемпбелл сочное, с хорошими вкусовыми качествами. Они распространены во многих странах и в настоящее время используются в скрещиваниях.

Утки зеркальной породы выведены на Кучинском племптице заводе путем сложного воспроизводительного скрещивания местных уток, пекинских и хаки-кемпбелл, отбора и подбора, направленного на повышение продуктивности (рис. 48).

Туловище у уток глубокое, широкое и длинное. Голова небольшая, длинная, с коричнево-темными глазами и темным клювом. Шея средней длины, несколько изогнутая. Грудь широкая, глубокая, округлая, слегка выдающаяся вперед. Спина широкая, прямая. Крылья плотно прилегают к туловищу. Хвост короткий, узкий. Ноги не-высокие, крепкие, оранжевого цвета, немного отставлены к задней части. Утки имеют светло-коричневое, почти белое, оперение туловища и головы. У селезней голова и шея темные с сине-зеленым отливом. На шее белое кольцо. Грудь коричнево-красная. Туловище светло-серое. На крыльях селезней и уток темно-синее «зеркало».



Рис. 48. Утки зеркальной породы

Средняя масса взрослых селезней составляет 3,5 кг, уток – 3,0 кг. Яйценоскость – до 200 яиц массой 80 г. Скорлупа белая. Инкубационные качества достаточно высокие. Утята в 2-месячном возрасте достигают массы 2 кг.

Руанская порода уток выведена во Франции в окрестностях нормандского города Руана в результате приручения диких уток и длительной селекции на увеличение массы тела.

Туловище массивное, горизонтально поставленное. Грудь широкая и глубокая. Спина широкая, сужающаяся к плечам и хвосту. Окраска оперения близка к дикому родоначальнику породы. Голова уток темно-коричневого цвета с двумя светло-коричневыми полосками, идущими от клюва к шее с обеих сторон. У селезней голова блестящая, темно-зеленого цвета с зеленовато-желтым и черным на конце клювом. Шея зеленого цвета с белым кольцом, несомкнутым

сзади. Грудь красно-бурая до плеч, а от плеч вся нижняя часть туловища серая. Ноги темно-оранжевого цвета.

Масса селезней составляет 4,5 кг, уток – 4,0 кг, отдельные особи достигают 5 кг и более. Яйценоскость уток – 80–90 яиц массой 60–80 г. Мясо руанских уток характеризуется высокими вкусовыми качествами.

Породы яичного направления продуктивности

Порода уток индийские бегуны выведена в Индии. Местом происхождения считается Юго-Восточная Азия и Малайский архипелаг. В Россию завезены в 1926 г. из Англии (рис. 43).

Экстерьерно индийские бегуны отличаются от уток других пород пингвинообразной постановкой корпуса, высокими ногами, длинной и тонкой шеей. При движении они не переваливаются с боку на бок, как другие породы уток, а быстро бегают.

Туловище довольно узкое, почти вертикально поставленное. Голова маленькая с большим клинообразным клювом, который у белых уток желто-оранжевого цвета, а у пегих – темного. Шея тонкая, длинная. Грудь округлая. Спина узкая, покатая к хвосту. Крылья плотно прижаты к туловищу. Хвост немного приподнят. Ноги длинные, оранжево-красные. Оперение бывает белое, пегое, красно-пепельное и черное.




Рис. 49. Утки породы индийские бегуны

Масса взрослых селезней составляет 1,8 кг, уток – 1,7 кг. Яйценоскость – около 200 яиц за один продуктивный цикл. Масса яиц – в среднем 75 г. Скорлупа белая, инкубационные качества хорошие. Утята обладают хорошей энергией роста и к 2-месячному возрасту достигают 1,5 кг. Жизнеспособность молодняка и взрослой птицы хорошая. Половая зрелость уток наступает в 5–6-месячном возрасте.

Индийские бегуны хорошо фуражируют на пастбищах, уничтожая при этом большое количество червей и насекомых. В некоторых странах их разводят для производства пищевых яиц, учитывая их высокую яйценоскость.

Индийских бегунов используют для скрещивания с утками более тяжелых пород с целью повышения скороспелости и яичной продуктивности.

Условия для выращивания уток

Способ содержания уток выбирают в зависимости от местных условий. Хорошо, если есть естественный водоем: птица, имея преимущества водного выгула, одновременно создает благоприятные условия и для нагула рыбы. Кроме того, утки, как и гуси, являются прекрасными биологическими мелиораторами водоемов. Они поедают мягкую подводную и плавающую на поверхности воды растительность, молодые побеги и подкусывают корневища жестких подводных растений, предотвращая зарастание водоемов, очищают их от неиспользованной рыбой фауны.

При содержании уток на водоемах экономится пятая часть кормов. Птица, находящаяся на водном выгуле, приобретает устойчивость к заболеваниям, лучше развивается, повышается качество мяса. И это уже не говоря о том, что птице на выгуле не надо подвозить подстилку, удалять помет, обеспечивать водой и т. д. Правда, и надзор за птицей более строгий: необходимо следить за ней постоянно, чтобы не напали хищники.

Пригодными для разведения уток считаются не очень глубокие пруды, проточные озера, благоприятные для рыборазведения. Дно пруда птицы используют на глубине до 1 м. На одну взрослую утку достаточно 25–50 м² водного выгула (рис. 50). Очень глубокие водоемы (4–5 м) использовать для содержания уток не рекомендуется, так как на большой глубине вода не перемешивается и утиный помет вызывает усиленное цветение воды и развитие водорослей. Впоследствии это может привести к появлению сероводорода в более бедных кислородом нижних слоях воды. В проточных водоемах плотность посадки птицы может быть увеличена.



Рис. 50. Водный выгул для уток

Водные выгулы огораживают плавучими заграждениями. Высота их над и под водой составляет 80 см. Для защиты от непогоды на берегах устраивают летние домики. Около них организуют кормление. Часть кормушек размещают на козлах прямо в воде. Рассыпаемый корм поедается рыбой.

Для купания, если температура воздуха не ниже –20 °С, делают прорубь, которую ограждают сеткой на глубину до 1 м, чтобы птица не попала под лед. Вокруг проруби настилают слой соломы толщиной до 5 см. В сильные морозы уток на выгул не выпускают, а кормят и поят в помещении.

При уходе за утками, как и за другой птицей, необходимо соблюдать распорядок дня. Особенно он важен в период яйцекладки. Нужно помнить, что утка – очень пугливая птица, поэтому обращение с ней должно быть осторожным.

Ни в коем случае уток нельзя переводить в другое помещение в период яйцекладки, так как они могут прекратить ее и начать линьку. В этот период желательно увеличить длину светового дня. Его продолжительность должна составлять 14 ч. Дополнительное освещение лучше организовать с наступлением сумерек, для этого можно вручную включать свет, но лучше установить автоматику с применением реле времени. Свет должен быть такой интенсивности, чтобы достигалась слабая видимость окружающей обстановки. Прямые лучи не должны падать на птицу. В таком случае утки не будут беспокоиться и за ночь хорошо отдохнут.

Утки сносят яйца утром, поэтому выпускать их на выгул до 10 ч не следует. Яйца нужно собирать не реже одного раза в час. В период яйцекладки уток следует усиленно кормить. При плохом кормлении они поздно начинают яйцекладку и в дальнейшем не достигают той продуктивности, на которую способны. В холодное время года даже при хорошем кормлении, но на

сырой подстилке яйцекладка задерживается, поэтому необходимо регулярно подсыпать сухую подстилку, тогда нижние слои, разлагаясь, создадут дополнительное тепло.

Опыт последних лет показывает, что уток круглый год можно содержать без водоемов и при наличии полнорационных комбикормов переводить на сухой тип кормления. При содержании на сухопутных выгулах, особенно в жаркий период года, можно сделать купочные канавки, в которые регулярно следует доливать чистую воду, а загрязненную сливать.

Выращивание утят

До 10-дневного возраста при содержании на сетчатых полах их размещают по 25 гол. на 1 м² пола, на глубокой подстилке до месячного возраста – по 12 гол. После завершения подготовки помещения и обеспечения требуемой температурой и необходимым инвентарем завозят утят (если они приобретены на стороне).

На выращивание отбирают крепких, здоровых, хорошо стоящих на ногах утят. Они должны быть подвижными, с хорошо открытыми глазами и ясным взглядом. Пух должен быть шелковистым, без следов слипания или прилипшей скорлупы. У отобранных утят должна быть хорошо затянувшаяся, полностью зажившая пуповина, без следов крови.



Рис. 51. Транспортировочные ящики для утят

Транспортируют утят в специальных ящиках размером 60×60×20 см, разгороженных внутри на 4 секции (рис. 51). Ящики должны иметь в верхней части наружных сторон вентиляционные отверстия диаметром до 20 мм. Сверху ящики прикрывают крышкой. Транспортировать утят следует в обогреваемых в холодное время автомобилях, чтобы избежать переохлаждения, что может стать причиной дальнейшей задержки в росте и развитии.

При доставке к месту утят размещают по секциям в уже полностью подготовленные прогретые помещения. Чем меньше утят содержится в секциях, тем лучше они выращиваются. При уплотненном содержании очень быстро сказывается незначительная разница в массе.

В помещении, где размещаются утята для выращивания, поддерживают температуру в пределах 18–20 °С. В первые 10 дней в клетках или на отгороженных участках пола температура на высоте 5–8 см должна быть 28–26 °С, с 11- до 20-дневного возраста – 26–22 °С. Такую температуру поддерживают с помощью обычных электрообогревателей. С 20-дневного возраста в летнее время электроприборы убирают.

Выращивание утят на мясо

В условиях приусадебных хозяйств особенно выгодно выращивать утят на мясо. Утки жизнеспособны, хорошо оплачивают корм мясом, очень скороспелы, выносливы и легко переносят суровые зимы. Живая масса суточного утенка пекинской породы – 50–60 г, а в 50–60 дней – 2–2,5 кг, т. е.

увеличивается в 40–50 раз. Утиное мясо высококалорийное, с отличными вкусовыми качествами и прекрасно подходит для приготовления первых и вторых блюд.

Как правило, к 60-дневному возрасту утята достигают живой массы 2 кг и выше. С этого времени их уже можно выращивать на мясо, т. е. кормить вволю. Кормят обычно влажными рассыпными мешанками, в состав которых должны входить круто сваренные куриные яйца, перетертые с мелкой кукурузной, пшеничной или овсяной крупой, минеральные корма (ракушка, мел), витаминные (рыбий жир) и корма животного происхождения (свежий творог).

Свежую зелень дают утятам с 2–3-дневного возраста в мучных смесях в количестве 15–20 %, увеличивая к 20-дневному возрасту до 30 % от дневной нормы кормов. При отсутствии рыбной и мясокостной муки их заменяют свежим творогом из расчета 2 г творога на 1 г сухих кормов животного происхождения.

Влажные мешанки для утят должны быть рассыпчатыми, так как липкие они плохо поедают, к тому же липкий корм заклеивает носовые отверстия. Не рекомендуется кормить утят кашей, так как она быстро прокисает, вызывает понос, а во время варки разрушаются витамины.

Влажные мешанки дают утятам в кормушках-корытцах. Раздавать корм на лотках не рекомендуется, так как утята залезают на них и корм быстро загрязняется.

При выращивании утят на мясо их до 10-дневного возраста кормят 6 раз в сутки, с 11- до 30-дневного возраста – 4–5 раз, с 31-го дня – 4 раза и вволю. В кормушки добавляют корм по мере поедания. С 10-дневного возраста утятам во влажную мешанку можно добавлять вареный картофель в количестве 20–30 % от сухой части рациона.

Утятам нельзя скормливать заплесневелые и затхлые корма. При откорме утят на мясо один раз в неделю дают гравий: по 0,5 кг на 100 кг комбикорма. Гравий после скормливания находится в желудочно-кишечном тракте 7–10 суток. Поэтому за 10 суток до сдачи на убой его в комбикорм не добавляют, чтобы при переработке отходов убоя он не выводил из строя перерабатывающие механизмы.

Биологической особенностью утят является высокая интенсивность роста и хорошее усвоение кормов. За 55 дней выращивания утенки увеличивают живую массу в 40–45 раз при кормлении полнорационными кормовыми смесями. При выращивании утят на мясо необходимо периодически контролировать их рост, для чего один раз в неделю взвешивают контрольную группу (не менее 50 гол. от партии).

Если утята не пользуются водоемом, у них должна быть постоянно чистая вода. Недостаток ее задерживает рост молодняка и увеличивает его отход.

На неограниченных водоемах потребность утят в белковых и витаминных кормах удовлетворяется полностью за счет водных растений и организмов. Если утята с 20–30-дневного возраста пользуются водоемами, богатыми естественными кормами (ряской, элодеей, рдестом), их достаточно

подкармливать утром и вечером полноценными зерновыми отходами или дробленным зерном.

При использовании водоемов необходимо учитывать, что стоячая, непроточная вода часто является источником заражения птицы глистами.

Естественные корма можно вылавливать и скармливать во влажной мешанке. Особенно охотно поедают утята ряску, к тому же ее легко добывать и не надо измельчать. Утенок в возрасте 40–50 дней за день съедает свыше 200 г ряски. Ее можно заготавливать на зиму путем сушки.

Если утята выращиваются для племенных целей, до 1,5-месячного возраста кормят их вволю, как и выращиваемых на мясо. В дальнейшем их рацион отличается меньшим содержанием белка и большим объемом за счет увеличения нормы свежей зелени.

Начиная с 45-дневного возраста племенных утят постепенно приучают к цельному зерну. Его сначала примешивают к влажной мешанке, а через несколько дней скармливают вечером в чистом виде. Утят, выращиваемых на водоемах, богатых естественными кормами, кормят один раз в день – поздно вечером.

Племенных утят, выращиваемых на суше, кормят 3 раза в день: утром и днем – влажными мешанками, на ночь – зерном. Во влажные мешанки добавляют свежую зелень – до 250 г на голову в день.

Из выращенных племенных утят на зиму оставляют наиболее развитых: на 5 уток (самок) оставляют одного селезня. Для инкубации утиные яйца отбирают от уток, возраст которых не менее 10 месяцев, еще лучше – от перерярых уток (второгодок).

Следует отметить, что утиному молодняку свойственны некоторые биологические особенности. Имеется в виду, прежде всего, линька, во время которой происходит полная смена оперения. Она начинается с 55–60-дневного возраста и продолжается около 2 месяцев. Во время линьки утята резко худеют, теряют накопленный живой вес. Тушки теряют товарный вид из-за большого количества пеньков. Утят, выращиваемых на мясо, следует забивать в возрасте 50–60 дней, т. е. до наступления линьки. В этом случае затраты кормов самые минимальные, а по истечении 60 дней их расходуется в несколько раз больше.

Ощипка уток

Утиное оперение намного уступает гусиному, но тем не менее находит применение при изготовлении теплых одеял и подушек. В отличие от гусей ощипку уток проводят только у взрослого поголовья, после прекращения яйцекладки, причем приурочивают ее к началу первой летней линьки, обычно она проходит в июне–июле.

Следует также помнить, что самки начинают линять на 10–15 дней позже самцов. Отслеживание естественных сроков начала линьки связано с тем, что, во-первых, процесс ощипки не будет причинять птице боль и она будет вести себя при этом спокойнее, а во-вторых, в дальнейшем потребуются меньше времени на восстановление выщипанного пера.

После определения готовности перо-пухового оперения проводят пробную ощипку, для чего выдергивают перо у небольшого поголовья птицы на разных участках тела. О полной готовности можно судить по тому, как выдергивается перо. Если оно извлекается легко и его ствол светлый и сухой, можно начинать ощипку. Если нижняя часть ствола (очина) наполнена кровью или лимфатической жидкостью, рост пера еще не закончен, следовательно, с ощипкой придется повременить.

Накануне ощипки уткам дают возможность искупаться, чтобы привести в порядок оперение. На ночь после купания птицу помещают в очищенное помещение. Вечером уток, предназначенных для ощипки, не кормят. Порядок и техника ощипки уток такие же, как и гусей.

Начинают с нижнего конца киля грудной кости, после чего переходят с живота к грудной части тела до подвздошной впадины. Затем ощипывают перья спины и нижней части шеи. Пух можно выщипывать отдельно или вместе с пером. В первом случае пух снимают после того, как полностью снято перо, во втором – с каждого отдельного участка тела перо и пух выщипывают последовательно, но не вместе.

За каждый отдельный прием ощипки берут небольшой пучок и выдергивают в направлении его роста. При ощипке от одной взрослой утки добывают 50–60 г пера и пуха. При послеубойной процедуре, когда производится полная ощипка, сбор увеличивается вдвое, а доля пуха составляет около 10 %.

9.

Родина индеек – Америка, а в Европу они завезены еще в 1520 г. Нежное индюшиное мясо пришлось по вкусу европейцам, и с тех пор индеек выращивают как в домашних условиях, так и в промышленных масштабах. Это самые крупные домашние птицы: самцы индеек иногда вырастают до 1,2 м в высоту и весят до 30 кг.

У птиц крепкие длинные ноги и широкий хвост. На голове и шее отчетливо проступают кожные образования – «кораллы». С верхней части клюва самцов свешивается мясистый придаток, который в период возбуждения птицы достигает 12–15 см. Оперение белое, бронзовое, черное, серое.

Породы индеек



Рис. 52. Индюки белой широкогрудой породы

Индюки белой широкогрудой породы выведены в 60-х годах прошлого века в США, при скрещивании белых голландских с бронзовыми широкогрудыми индейками (рис. 52). Оперение белое, на груди пучок черных перьев. Туловище овальной формы, с широкой и покатой грудью. Ноги средней длины, широко расставленные, темно-розового цвета.

Белые широкогрудые индейки бывают трех разновидностей: легкая, средняя, тяжелая. Живая масса самцов легких форм – 8–9 кг, самок – 4,4–5,5 кг; средних – соответственно 15–17 и 6–7; тяжелых – 20–25 и 10–11 кг.

На основе белой широкогрудой индейки созданы высокопродуктивные линии, используемые для производства мясных индюшат от легких кроссов со средней живой массой в 8-недельном возрасте 2,0–2,3 кг, от средних в 13 недель – 4,0–4,5, от тяжелых в 17 недель – 7,0–7,5 кг. Используются также для улучшения других пород индеек.

Яйцекладка у белых широкогрудых индеек начинается в возрасте 9 мес и продолжается 6–7 мес. За этот период от одной индейки получают 100–120 яиц массой по 80–90 г.

Индейки этой породы имеют хорошие мясные качества, быстро растут, хорошо приспособлены к различным условиям. Отличаются от бронзовых меньшей живой массой и лучшей яйценоскостью.

Северокавказская бронзовая – одна из старейших отечественных пород, хорошо приспособленная к пастбищному содержанию. Яйцекладка у индеек начинается в возрасте 9–10 мес и продолжается 5–6 мес. В течение этого времени от одной индейки получают 75–80 яиц массой по 85–100 г. Скорлупа яиц светло-палевого цвета, с бурыми крапинками. Средняя живая масса взрослых индеек – 6,5–7 кг, индюков – 13–14 кг. Индюшата к 4-месячному возрасту достигают массы 4 кг.



Рис. 53. Индюк северокавказской бронзовой породы

Северокавказские бронзовые индейки имеют вытянутое, довольно широкое туловище. Оперение плотно прилегает к телу и имеет бронзовый оттенок с зеленовато-золотистым блеском (рис. 53).

Перья спины, поясницы и хвоста окаймлены широкой полосой бронзового отлива. Индейки отличаются от индюков меньшими размерами, более слабым оперением головы, маленьким кожным наростом над клювом, хорошо оперенной шеей. Перья груди имеют тонкое белое окаймление, придающее оперению слегка сероватую окраску. Недостатком породы является неудовлетворительный внешний вид тушки в раннем возрасте из-за пеньков и черного оперения.

Северокавказские бронзовые индейки использовались для улучшения местных пород.

Северокавказская белая порода индеек выведена в 60-х годах XX века скрещиванием северокавказских бронзовых индеек с белыми широкогрудыми. Птицы этой породы хороши тем, что оперение у них белое, а товарный вид значительно лучше, чем у бронзовых. Кроме того, северокавказские белые индейки отличаются высокой яйценоскостью. Туловище индюков длинное, грудь широкая, глубокая и выпуклая. Грудные мышцы хорошо развиты. Живая масса индюков в возрасте 8 мес достигает 12,1–12,4 кг, индеек – 6–7 кг. Яйценоскость – около 100, а в отдельных случаях – до 180 яиц в год. Индюшата обладают высокой жизнеспособностью и быстрым ростом. В возрасте 90 дней их можно готовить к убою. При этом на 1 кг прироста затрачивают по 3,3–3,4 кг комбикорма.

Северокавказские белые индейки используются в скрещивании с белыми широкогрудыми для производства мясных индюшат с живой массой (в 17 недель) самцов 4,8–5,0 кг, самок – 3,5–3,9 кг.

Индейки бронзовой широкогрудой породы выведены в США, в странах бывшего СССР разводятся с 1945 г. Отличаются большой массой; у индеек она составляет 10 кг, у индюков – 14,5 кг. Индюшата к 4-месячному возрасту достигают массы 3 кг.



Рис. 54. Индюк бронзовой широкогрудой породы

Яйцекладка у индеек наступает в 10-месячном возрасте. За год птица сносит 70–80 яиц со средней массой по 95 г. По внешнему виду бронзовые широкогрудые индейки похожи на северокавказских, которые были использованы при их создании. Однако выведенная порода отличается большей массой и сильным развитием грудных мышц. Туловище у них длинное и широкое, грудь широкая, выпуклая. Оперение черное, с медно-бронзовым отливом, мясо нежное и сочное (рис. 54).

Московские бронзовые индейки имеют крепкое телосложение, высокую яйценоскость и хорошие воспроизводительные качества. Хорошая приспособленность к местным условиям обеспечивает высокую сохранность молодняка и взрослой птицы.

Яйцекладка у индеек начинается в возрасте 270 дней, а при регулируемом световом режиме – в 180 дней. В год от одной индейки можно получить 80–100 яиц. Средняя масса яиц – 85 г; скорлупа имеет розовый оттенок со светло-коричневыми крапинками. Живая масса взрослых индеек составляет 7,5 кг, индюков – 13 кг.

Откормленные индюшата в 120-дневном возрасте достигают живой массы 4 кг.

Черная тихорецкая порода выведена в Краснодарском крае путем селекции местных черных индеек. Оперение черное, с бронзовым отливом. Самцы весят 9,5–10,0 кг, самки – 4,5–5,0 кг; мясные индюшата в 17-недельном возрасте – 3,2–4,4 кг. Средняя годовая яйценоскость – 80–100 яиц. Масса яиц – 80–85 г. Индейки перспективны для клеточного содержания.



Рис. 55. Индюк московской бронзовой породы

У индеек московской бронзовой породы голова длинная и широкая, шея длинная, изогнутая, спина выпуклая, грудь широкая, туловище длинное, глубокое, ноги длинные. Оперение черное, с бронзовым блестящим оттенком. Перья крыльев и хвоста черные, испещренные узкими полосками светло-бурого цвета с черной и белой каймой (рис. 55).

Московские белые индейки отличаются высокой плодовитостью и жизнеспособностью, имеют компактное, хорошо развитое округлое туловище. Живая масса годовалых самцов – 12,5 кг, самок – 6,5–7 кг. Молодые

самки готовы к убою уже в возрасте 150 дней при живой массе 4 кг, самцы – в 180 дней массой 6,6–7 кг. Яйценоскость составляет 100–110 яиц. Московские белые индейки хорошо акклиматизируются и потому получили самое широкое распространение. Оперение белое, блестящее; клюв и ноги розового цвета.

Содержание индеек

Основным условием получения высокой продуктивности индеек, как и любой другой птицы, является правильное содержание и кормление. Можно приобрести хорошую племенную птицу, но, если ее неправильно содержать, плохо ухаживать, она не проявит своих генетических возможностей к высокой продуктивности. Главные условия – оптимальная плотность посадки индеек, чистота и сухость помещения, оптимальная температура, доброкачественная подстилка, хорошее освещение, обеспеченность водой, соблюдение режима и полноценное кормление.

Плотность посадки определяется количеством птицы, размещенной в помещении. Взрослых индеек, если их содержат на глубокой подстилке, на 1 м² размещают не более 2 гол.

В помещении всегда должен быть свежий, чистый воздух. В плохо вентилируемых помещениях накапливаются влага, углекислота, аммиак, что отрицательно влияет на здоровье и продуктивность птицы. Нормальной считают относительную влажность воздуха в помещении 65–70 %.

Оптимальная температура – не выше 18–20 °С, высокая температура особенно отрицательно сказывается на состоянии индеек. Они становятся вялыми, теряют аппетит, снижают яйцекладку, а иногда вовсе ее прекращают. У индюков ухудшаются воспроизводительные способности, в результате чего снижается оплодотворение яиц индеек. При чрезмерно низких температурах индейки расходуют больше корма, резко сокращают яйцекладку.

Очень важно правильно организовать содержание индеек зимой. Практика показала, что индейки легко переносят холод, но боятся сквозняков и сырости. В морозные дни в помещении необходимо поддерживать температуру в пределах от –3 до –5 °С: эта температура лучше, чем плюсовая, при которой образуется сырость.

Подстилка всегда должна быть сухой, поскольку появление в подстилке плесени опасно для здоровья индеек. Можно содержать птицу на глубокой подстилке, ежедневно подсыпая новую. Сменяют ее, как правило, весной и осенью. При этом пол птичника тщательно очищают и дезинфицируют. На чистый пол насыпают известь-пушонку (0,5–0,6 кг/м²), а затем укладывают слой чистой подстилки.

Яйценоскость индеек при правильном кормлении и содержании составляет примерно 65 яиц за сезон. Но во многих случаях от хороших самок получают и свыше 100 яиц. У индеек более растянутый период яйцекладки по сравнению с гусями и утками – с марта до сентября. Наивысшая яйценоскость бывает в мае, июне и июле, а количество снесенных яиц составляет около 60 % от общего количества.

Наиболее высокая яйценоскость у индеек наблюдается в первый год яйцекладки. Раннюю яйценоскость – за месяц до обычного срока – можно вызвать искусственно, путем введения дополнительного освещения в птичнике. Световой день в этом случае удлиняют до 14 ч.

В первые дни индюшатам требуется больше тепла, так как у них еще недостаточно развита терморегуляция, а потому в раннем возрасте температура их тела зависит от температуры внешней среды. Оптимальная температура воздуха в помещении для суточных индюшат – 30–32 °С. Индюшата приобретают способность сохранять температуру тела примерно к 10–12-дневному возрасту.

Маленькие индюшата требовательны и к влажности воздуха. Она должна быть не ниже 72–78 %. Низкая влажность вызывает усиленное испарение влаги из тела, что приводит к повышенной теплоотдаче.

За индюшатами необходимо ежедневное наблюдение. Отстающих в росте, слабых и больных отсаживают отдельно для лучшего ухода.

Для первых дней жизни индюшат очень важно хорошее освещение. В этот период они лучше поедают светлые и ярко окрашенные корма. Исходя из этого на каждые 10 м² пола нужна примерно одна электролампа мощностью 150 Вт. В первую неделю освещение должно быть круглосуточное, затем постепенно к месячному возрасту его сокращают до 15–17 ч в сутки, а мощность ламп уменьшают до 50 Вт.

Помещение для молодняка должно быть сухим, теплым, с хорошей вентиляцией. Для предупреждения кокцидиоза и других заболеваний следует обработать помещение и инвентарь паяльной лампой. Пол помещения застилают сухой соломой, опилками, торфом. В первые один-два дня для предупреждения поедания подстилки ее застилают бумагой. Когда индюшата научатся находить корм в кормушке, бумагу убирают. Около птичника желательно сделать небольшой, огороженный металлической сеткой выгул – солярий.

При подготовке помещения необходимо учитывать плотность посадки. В первый месяц выращивания на 1 м² пола размещают не более 15 гол., к 2-месячному возрасту – 8–10, а старше – 5–6 гол. Важно помнить, что скученность птицы ведет к отставанию в росте и провоцирует возникновение заболеваний.

Индюшат можно поить из вакуумных поилок с температурой воды 25–27 °С. Поилки следует содержать в чистоте, следить, чтобы вокруг было сухо. Через каждые 10 дней в воду с профилактической целью добавляют марганцовокислый калий (до светло-розового окрашивания). Кроме того, в воду добавляют один из антибактериальных препаратов, таких как байтрил, энроксил и пр. Применять эти препараты нужно строго по инструкции, в противном случае можно вызвать у птицы дисбактериоз, который сам по себе представляет угрозу для индюшат.

Выведенные индюшата постоянно должны иметь в поилках воду и беспрепятственный доступ к ней, иначе они не научатся пить и могут погибнуть. Потребление корма без воды в этот период оказывается более опасным, чем голодание. Желательно, чтобы вода была проточной, чистой.

Со 2-й недели индюшат можно выпускать на выгул: в теплую сухую погоду на 15–20 мин, затем постепенно срок удлиняют. Нельзя выпускать их утром по росе или сразу после дождя, они быстро намокают и начинают скучиваться, к тому же могут простудиться, а простуда для них в большинстве случаев смертельна. Больше всего индюшата боятся сырости. Их нельзя содержать на сыром холодном ветру, прогуливать на сырой земле и сквозняках. На выгуле также должны быть поилки и кормушки с сухим кормом.

В помещении для индюшат и под навесом, где они гуляют днем, устраивают насесты, которые размещают на высоте 45–50 см от пола или земли из расчета 30–35 см на голову. Бруски для насестов должны быть с закругленными краями, расстояние между ними – 40–50 см. Насестами индюшата начинают пользоваться в возрасте 1,0–1,5 мес.

Выращивать индюшат под наседкой значительно легче. Одна индейка может иметь выводок из 15–20 индюшат и водить их до 50–60-дневного возраста, т. е. весь самый трудный период их выращивания.

Для индейки с индюшатами должно быть отведено сухое и теплое место. Если собственный вывод не удался, к индейке можно подпустить индюшат, выведенных в инкубаторе. Делают это ночью, осторожно, чтобы не испугать птицу, подпускают индюшат не всех сразу, а по одному. В течение всего периода выращивания внимательно следят за состоянием здоровья и поведением молодняка.

На дальнейшее выращивание отбирают только крепких индюшат. Они хорошо опушены, устойчивы на ногах, подвижны, пуповина у них зарубцована, живот втянут, анальное отверстие и пух около него чистые, без признаков выделений, глаза блестящие. Индюшата быстро реагируют на постукивание по коробке.

Откорм индеек

Осенью в фермерских хозяйствах производят сортировку индеек: одних оставляют на племя, другие поступают на откармливание. Птиц помещают в особый птичник и кормят до самого дня убоя питательным, по возможности разнообразным кормом: вареным тертым картофелем, смешанным с овсяной, гречишной или ячменной мукой, зернами пшеницы.

Чтобы придать особый вкус мясу откармливаемых индеек, к их обыкновенной пище прибавляют растертые желуди или каштаны, смешанные с мукой.

В современном индейководстве для выращивания на мясо главным образом используют гибридных индюшат, получаемых от скрещивания 2–4 сочетающихся линий, чаще одной породы. Затраты комбикорма на 1 кг прироста – 2,5–3,5 кг. Убойный выход мяса – 80–90 %, выход съедобных частей – до 70 %, в том числе грудных мышц (так называемое белое мясо) – 25–30 %.

В течение 21–25 дней живая масса молодняка на откорме увеличивается на 25–40 %, увеличивается выход съедобных частей в тушке, улучшаются питательные, вкусовые и диетические качества мяса.

Индюшат можно откармливать в возрасте четырех месяцев и раньше. В этом случае применяют интенсивные способы откорма при содержании птицы в клетках и на глубокой подстилке без выгулов.

В практике известны 3 вида откорма: интенсивный – в поле, на выгулах; откорм с использованием ограниченного выгула; принудительный. Наиболее выгодным для индивидуальных приусадебных хозяйств является второй вид. За 22–25 дней откорма молодые индюшки дают 2,0–2,5 кг прироста живой массы. Самцы, как правило, откармливаются значительно медленнее.

При откорме молодой птицы прирост обеспечивается преимущественно за счет значительного увеличения количества мышечной ткани с одновременным отложением жира. Очень важно при откорме поддержать у птицы хороший аппетит. Для этого необходимо правильно готовить корм к скармливанию.

В начале периода откорма индеек кормят 2 раза в день: утром и вечером, постепенно увеличивая норму. Затем, когда они привыкнут к большим объемам пищи, их переводят на трехразовое кормление.

Для откорма птицы используют разнообразные корма: из зерновых – кукурузу, овес, ячмень, просо, а также отходы этих культур (отруби, жмыхи, шроты). Скармливают также мясные отходы, творог, обрат, пахту, вареный картофель, кормовую и сахарную свеклу, брюкву, свежую зелень.

Корм каждый раз лучше раздавать в 2–3 приема. Если птица быстро поедает корм, его добавляют еще. В случае резкого снижения поедаемости кормов одно кормление пропускают. Кормление продолжается обычно 30–40 мин, но не более часа. Остатки корма из кормушек убирают. После кормления дают свежую рубленую зелень или корнеплоды. Воду выпаивают вволю.

7. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КРОЛИКОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ФЕРМЕРСКИХ (КРЕСТЬЯНСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

1. Биологические и физиологические особенности кроликов.
2. Породы кроликов и их классификация.
3. Разведение кроликов в фермерских хозяйствах.
4. Содержание кроликов.
5. Кормление кроликов.

Кролиководство – одна из отраслей животноводства, занимающаяся разведением наиболее скороспелых животных и производящая продукцию при небольших затратах кормов, труда и средств. Наибольшую ценность из продуктов кролиководства имеют кроличье мясо и шкурки. Мясо кроликов содержит много белка и является легкоусвояемым, полезным и диетическим продуктом и рекомендуется для питания не только взрослых, здоровых людей, но и детей, людей преклонного возраста, а также больных, страдающих заболеваниями желудка, печени, сердечно-сосудистой системы. Шкурки кроликов после соответствующей обработки используются в натуральном виде или для имитации мехов пушных зверей. Из них изготавливают легкие и кра-

сивые дамские манто и жакеты, детские шубки, воротники, шапки. Кожа кроликов идет на изготовление галантерейных товаров и легкой обуви. Пух кроликов применяют для изготовления высококачественного фетра и различных трикотажных изделий.

К преимуществам кролиководства относятся небольшие капиталовложения. Кролиководство как дополнительная отрасль животноводства имеет важное народнохозяйственное значение, его развитие в условиях Республики Беларусь перспективно прежде всего для личных подсобных хозяйств, где есть возможность использовать пищевые отходы, местные стройматериалы, привлечь к уходу за животными членов семьи, не занятых в общественном производстве. В нашей республике свыше 95 % кроликов находится в личных подсобных хозяйствах населения. Многие любители сумели убедиться не только в полезности, но и выгоды кролиководства. Опыт показывает, что, имея 4–5 кроликоматок, можно получить за год более 4 ц мяса и 200 шкурок. В условиях приусадебных хозяйств породистый кролик к убою на мясо готов через 90 дней, достигая при этом массы 2,7–3 кг. Однако для получения более нежного, диетического мяса и по экономическим соображениям целесообразно убой кроликов производить в возрасте не старше 77 дней при достижении живой массы 2,2–2,6 кг.

1.

Организм кроликов отличается от организма других видов сельскохозяйственных животных рядом биологических и физиологических особенностей. Знание этих особенностей имеет решающее значение для успешного разведения кроликов.

К наиболее важным биологическим особенностям кроликов относят раннее половое созревание, короткий период сукрольности (беременности), скороспелость, высокую плодовитость, способность совмещать физиологические периоды сукрольности с лактацией, молочность, капрофагию и ряд других.

Особенности размножения. Первая особенность – в анатомическом строении. В отличие от других сельскохозяйственных животных крольчихи имеют двойную матку, каждый рог которой (длиной 9–10 см и шириной 3–4 см) открывается самостоятельно во влагалище, поэтому иногда эмбрионы от первого спаривания развиваются в одном роге, а от второго – в другом. В этом случае крольчата рождаются с интервалами, равными промежутку между двумя спариваниями.

Другая особенность половой системы – физиологическая. У крольчих овуляция (выделение созревшей яйцеклетки из фолликула) происходит через 10–12 ч после спаривания под влиянием нервно-гуморального стресса, вызванного половым актом. Из каждого яичника выходит от 3 до 9 яйцеклеток, которые попадают в яйцеводы, где происходит оплодотворение. Такая овуляция называется спровоцированной, тогда как у самок других сельскохозяйственных животных овуляция происходит спонтанно, через определенные периоды времени независимо от того, спаривались животные или нет.

Половая охота у крольчих продолжается 26–40 ч; охота у неоплодотворенных крольчих продолжается в течение 3–5 дней и периодически повторяется в теплые периоды года через 5–7 дней, а в холодное время – через 8–9 дней.

Иногда после спаривания наступает ложная беременность, во время которой крольчиха проявляет инстинкт материнства, мнет солому и устраивает гнездо, а ее молочные железы начинают продуцировать молоко. Ложная беременность длится 17–18 суток, затем угасает функция желтого тела, которое образовалось на месте лопнувшего фолликула и выделяло гормон прогестерон, способствовавший перестройке организма и подготавливавший его к детородной функции.

В размножении кроликов не наблюдается ярко выраженной сезонности. Крольчихи могут оплодотворяться и давать потомство в любое время года.

Кролики отличаются ранним половым созреванием и исключительно высокой плодовитостью. Половая зрелость у кроликов средних по размеру и массе пород наступает в возрасте 3,5–4 месяцев, у крупных – 4–5 месяцев. У самок она характеризуется наступлением регулярных половых циклов.

За год от одной самки обычно получают 4–6 окролов. Крольчихи приносят в помете от 1 до 19 крольчат. Средняя плодовитость самок многих пород составляет 7–8 крольчат. Высокая интенсивность размножения обусловлена также кратковременностью периода сукрольности крольчих, который продолжается от 28 до 34 дней.

На 1–2-й день после окрола крольчиха может снова прийти в состояние охоты и может быть оплодотворена, что позволяет совмещать периоды сукрольности с лактацией, получать при хорошем кормлении и содержании самок уплотненные окролы. Однако такой метод не во всех случаях оправдан, так как при этом организм крольчихи быстро изнашивается и впоследствии самка остается на длительное время бесплодной. После окролов требуется некоторое время для субинволюции матки и восстановления нормальных физиологических функций половых органов, поэтому крольчих желательно покрывать через 25–30 дней после окрола.

Способность к оплодотворению у крольчих восстанавливается через сутки после окрола, если в приплоде меньше 5 крольчат, и через 8–10 дней, если более 5.

Наибольшая оплодотворяемость крольчих бывает, когда самка спаривается с самцом в период явно выраженной половой охоты. У некоторых самок может протекать скрытая половая охота, когда внешне наружные половые органы почти не изменяются. Таких самок надо периодически подсаживать к самцу.

При благоприятных условиях, используя короткий период сукрольности и уплотненные окролы, можно получить от крольчихи за год до 10 и даже до 11 окролов (это 60–70 крольчат). Однако при уплотненных окролах крольчихам следует создавать благоприятные условия содержания и организовывать полноценное кормление. В противном случае интенсивное использование самок неблагоприятно отразится на состоянии их организма, воспроиз-

водительных способностях, в результате чего срок хозяйственного использования крольчих сократится.

Скороспелость – это способность кроликов давать продукцию в ранние сроки без ущерба для своего здоровья. Одной из ее сторон является половая скороспелость, которая определяется способностью кроликов за короткий промежуток времени достигать половой и физиологической зрелости.

Наиболее интенсивно кролики растут в эмбриональный период и в первые 3–3,5 месяца после рождения.

Крольчата рождаются слепыми, голыми и беспомощными, массой 40–80 г. Через 2 дня живая масса крольчонка увеличивается на 1/3, на 6-й день удваивается, во вторую неделю становится больше первоначальной в 3 раза, к концу 3-й недели – в 5–6 раз, а к концу 4-й – в 10 раз. В 3–3,5-месячном возрасте крольчата, выращенные при высоком уровне кормления, имеют живую массу 2,5–3,5 кг, что примерно в 50 раз выше, чем у новорожденного крольчонка. К 8-месячному возрасту рост у кроликов заканчивается. При полноценном кормлении массы 2,6–3,0 кг молодняк достигает в возрасте 100–110 дней, при умеренном – в 4–5 месяцев.

К концу первых суток жизни на голове крольчонка образуются зачатки первичного волосяного покрова, на 5–7-е сутки волосяной покров появляется на всем туловище длиной 5–6 мм, состоящий из остевых и направляющих волос. К 20–25-му дню его развитие завершается, а затем постепенно начинает заменяться вторичным волосяным покровом. Ко времени половой зрелости этот процесс завершается. На 10–14-й день крольчата прозревают, а на 15–20-й день уже могут выходить из гнезда и самостоятельно поедать корм (выход крольчат из гнезда в более раннем возрасте свидетельствует о малой молочности крольчихи).

Молочность крольчих. Интенсивность роста молодняка не только в подсосный период, но и в дальнейшие периоды его развития зависит от биологической полноценности молока и молочности крольчих.

На молочность крольчих влияют уровень и тип кормления, условия содержания, их возраст, сезон года, число окролов, период лактации, число крольчат в гнезде, породная принадлежность. Молочность крольчих летом несколько выше, чем весной. У молодых крольчих молочность низкая, потому что организм еще находится на стадии роста. Наибольшими показателями молочности отличаются крольчихи 3-го и 4-го окролов, что связано с повышением функциональной активности молочной железы.

Молочные и маломолочные крольчихи имеют экстерьерные отличия, что позволяет визуально проводить отбор крольчих по их молочности. У молочных крольчих обхват груди на 7 %, а длина туловища на 2 % больше таких же показателей у маломолочных, а живая масса меньше в среднем на 700–800 г. Молочные крольчихи имеют несколько удлиненное (растянутое) туловище, хорошо развитый и крепкий скелет, глубокую грудь, плотную, эластичную, тонкую кожу. Маломолочным свойственны большая живая масса, компактное укороченное туловище. У них неглубокая грудь и сильнее развита подкожная клетчатка.

Для хорошего роста крольчат в подсосный период достаточно, если у крольчих в сутки выделяется 100–200 г молока. За период лактации крольчиха выделяет от 3,5 до 5 кг молока. Продолжительность лактации зависит от интенсивности использования крольчих (лактация длится обычно 40–45 дней). Крольчат бройлеров (кроликов мясных пород) содержат под самкой 60–65 дней, а при уплотненных окролах – 27–28 дней. Выделение молока прекращается за 2–4 дня до окрола и возобновляется после очередного окрола.

В начале подсосного периода самки кормят крольчат один раз в сутки, реже 2. Процесс сосания длится 3–5 минут. Когда крольчата начинают выходить из гнезда, они могут сосать мать более часто.

На 1 г прироста новорожденных крольчат в первую неделю их жизни затрачивается 1,6 г молока, во вторую – 1,8 г и в третью – 2,3 г. Такое повышение его связано с увеличением массы тела молодняка, которая при рождении в среднем равна 60 г, через 7 дней – примерно 120 г, спустя 14 дней – 200 г и в конце третьей недели – 300 г. В среднем на одного крольчонка приходится 23–31 мл молока в сутки.

Молочные железы у крольчихи расположены вдоль туловища. По обе стороны средней линии живота насчитывается от 8 до 10 сосков.

Молоко крольчих содержит большое количество сухих веществ до 30–36 %, в том числе 10–15 % белка, 10–20 % жира, 1,8–2,1 % молочного сахара, 0,64 % кальция, 0,44 % фосфора, витамины, что способствует чрезвычайно интенсивному росту крольчат в подсосный период.

Судить о молочности крольчих можно по состоянию крольчат в гнезде. У молочных крольчих крольчата спокойно лежат в гнезде, хорошо растут, форма их тела округлая, волосяной покров блестящий, кожа плотная, без морщинистых складок. Если же крольчата начинают расползаться или выходить из гнезда раньше 15-дневного возраста – это первый признак низкой молочности крольчих. У крольчат при этом шерстный покров взъерошен, кожа тусклая, морщинистая, желудок у них обычно пуст. Довольно часто крольчата пишат, сосут друг друга, слабеют, отстают в развитии и зачастую гибнут. От таких маломолочных крольчих часть крольчат надо отсаживать к обильномолочным. Чтобы проверить, есть ли у крольчихи молоко, достаточно перевернуть крольчиху на спину и слегка надавить руками на соски. У многомолочных крольчих молоко выделится крупной каплей или даже струйкой.

Причиной низкой молочности может служить ожирение. Избежать этого можно, балансируя рацион по обменной энергии и по питательным веществам. Хорошие результаты получают при даче крольчихам молокогонных кормов (зеленая масса, корнеклубнеплоды) при оптимальном соотношении их с высокобелковыми кормами (конcentратами и комбикормами). Долю молокогонных кормов следует уменьшать перед окролом и сразу после него, так как крольчата в первую неделю лактации потребляют немного молока и очень обильная молочность в это время может вызвать у самок мастит и гибель приплода.

Более точно определить молочность крольчих можно по приросту живой массы крольчат за первые три недели жизни. Поскольку в первые 20 дней лактации крольчата питаются только молоком матери и на 1 г прироста живой массы крольчат расходуется в среднем 2 г молока, можно определить количество молока, продуцируемого крольчихой за этот период по формуле:

$$M20 = (W2 - W1) * K,$$

где M20 – молочность крольчихи за 20 дней;

W1 – масса помета новорожденных крольчат, г;

W2 – живая масса помета на 21-й день, г;

K – коэффициент перевода живой массы крольчат в молочность крольчихи (K = 2).

Секреция молока у крольчих в период лактации происходит неравномерно. В первые 20 дней лактации крольчиха продуцирует около 60 % выделяемого за весь период лактации молока, в последующие дни лактации молочность крольчих снижается, причем на 45-й день лактации у 70 % крольчих молоко практически отсутствует.

Особенности пищеварения. Основная особенность пищеварения у кроликов заключается в капрофагии – поедании ими собственного кала.

Кролики выделяют кал двух видов: мягкий, или ночной и твердый, или обычный. Мягкий ночной кал отличается от обычного как по форме, консистенции, так и по химическому составу. В нем содержится около 28,5 % протеина (в 3,5 раза больше, чем в твердом кале) и значительное количество витаминов группы В и витамина К, а также азотистых веществ, аминокислот (валина, лейцина, глутаминовой, аспарагиновой) и микроорганизмов. Таким образом, содержимое желудочно-кишечного тракта обогащается легкопереваримым белком микроорганизмов. Благодаря поеданию мягкого кала, в организме кроликов задерживаются биологически активные минеральные элементы – фосфор, калий, натрий. Под действием ферментов микроорганизмов осуществляется более полное переваривание питательных веществ корма, особенно клетчатки, поскольку при капрофагии часть питательных веществ проходит через пищеварительный тракт животных минимум дважды. Капрофагия способствует также лучшему всасыванию питательных веществ корма.

Мягкий кал – это фактически содержимое слепой кишки, скапливающееся в прямой кишке перед анусом. В нормальных условиях содержания кроликов, когда их не тревожат, они расставляют передние ноги в сторону, изгибаются, достают мордой анус через промежность и поедают скапливающийся кал из анального отверстия и, не пережевывая, проглатывают.

У маленьких крольчат капрофагия проявляется обычно на 23–24-й день, т. е. когда они начинают потреблять другие корма, кроме материнского молока.

Лишение кроликов капрофагии приводит к уменьшению количества микрофлоры кишечника и снижению ее разнообразия. В конечном итоге это неблагоприятно сказывается на жизнедеятельности их организма: перевари-

мость питательных веществ рациона снижается, нарушается обмен веществ, у молодняка в 3 раза снижается прирост живой массы, а половозрелые кролики худеют и порой погибают. У сукрольных крольчих происходят отклонения от нормального течения беременности и утробного развития крольчат, что приводит к снижению плодовитости, частым абортam, мертворождению и понижению резистентности крольчат к заболеваниям.

2.

В мире известно более 60 пород кроликов и 100 их цветных вариаций. Однако экономически выгодным является разведение 10–15 пород.

Породы кроликов в зависимости от характера получаемой основной продукции делят на мясо-шкурковые, мясные, пуховые и шкурковые. От кроликов мясо-шкурковых пород наряду со шкуркой хорошего качества получают и высокопитательное диетическое мясо. У кроликов специализированных мясных пород основной продукцией является мясо, а побочной – шкурка. У кроликов пуховых пород основной продукцией является высококачественный пух, а мясо и шкурка рассматриваются как побочные виды продукции.

По длине волосяного покрова породы кроликов подразделяются на длинноволосые (длина волосяного покрова превышает 4 см), нормальноволосые (3,5–4 см) и коротковолосые (1,5–2 см). По размерам и массе тела кроликов породы подразделяют на крупные (живой массой 5 кг и более), средние (от 4 до 5 кг) и мелкие (менее 4 кг).

В Республике Беларусь владельцы приусадебных и фермерских хозяйств отдают предпочтение разведению мясных пород, имеющих максимальный прирост массы в минимальные сроки: бельгийский великан (фландр), калифорнийская, белый и серый великан, французский баран, белая новозеландская. Реже встречаются также породы мясошкуркового (советская шиншилла, серебристый, бабочка, рекс, венский голубой) и пухового (белая пуховая, ангорская) направления продуктивности.

Породы специализированного мясного направления продуктивности

Бельгийский великан (фландр). Создана порода в 16 ст. в Бельгии в результате скрещивания крупных аргентинских и фламандских кроликов.

Животные имеют длинное, хорошо замускулированное тело, большую и широкую голову, уши плотные, широкие, торчащие. У крольчих часто образуется подгрудок. Окраска различная: серо-заячья, темно-серая, черная и др. Живая масса – 6–9 кг и выше. Длина туловища – 75 см. Плодовитость крольчих – 8–10 крольчат.

Калифорнийская. Выведена в США скрещиванием пород шиншиллы, русского горностаевого и новозеландского белого. В Республику Беларусь завезена в 1971 г. Животные имеют крепкую конституцию с уклоном в сторону нежности. Костяк тонкий, прочный, туловище пропорционально развитое. Голова легкая с очень короткой шеей. Подгрудок не образуется. Уши недлинные. Грудь широкая, глубокая, спина короткая, широкая, ровная, круп

широкий, конечности крепкие, прямые. Окраска на туловище белая, нижние части лап, уши, кончик морды и хвост темно-коричневые или черные. Живая масса – 4–5 кг. Длина туловища – 55 см. Плодовитость крольчих – 8 крольчат.

Новозеландская белая. Создана в США в 1910 году в результате отбора среди кроликов породы новозеландская красная животных-альбиносов и последующего скрещивания их с фландром. Окраска чисто-белая, глаза красные. Конституция крепкая.

Голова небольшая, профиль немного выпуклый. Уши толстые у основания, прямостоячие, округленные. Шея короткая. Грудь широкая и глубокая, без подгрудка. Туловище крепко сложено, грудь широкая и глубокая, спина прямая, короткая, широкая и мясистая, пояснично-крестцовая часть укороченная и широкая, круп широкий и закругленный, конечности толстые, короткие, хорошо развитые. Живая масса – 4,6–5 кг. Длина туловища – 49 см. Плодовитость крольчих – 9–12 крольчат.

Белый великан. Порода крупных мясошкурковых кроликов происходит от бельгийского великана (фландра). Выведена в Бельгии и Германии длительным отбором и подбором. Отличаются крепким и удлиненным туловищем. Грудь глубокая и хорошо развита, спина прямая, широкая, круп округлый, ноги длинные, прямые, глаза красные. Окраска чисто белая. Живая масса – 5,1 кг. Длина туловища – 60 см. Плодовитость крольчих – 7–8 крольчат.

Серый великан. Порода выведена в 1952 г. в Украине путем скрещивания местных беспородных кроликов и кроликов породы фландр. Отличается крепкой конституцией, широкой и глубокой грудью, широким крупом, толстыми крупными лапами, массивной головой и толстоватыми ушами, поставленными в виде римской цифры V. Окраска двух типов: серо-заячья, рыжеватая и темно-серая, буроватая. Живая масса 4–4,7 кг. Длина туловища – 65 см. Плодовитость крольчих – 7–8 крольчат.

Французский баран. Выведена во Франции в 1853 г. путем скрещивания английских баранов, нормандских кроликов и фландров.

Туловище широкое и сбитое, голова крупная с широким лбом и сильно загнутой носовой костью, уши свисающие, спина широкая, чуть провисшая, грудь глубокая и широкая, круп округлый. Окраска может быть однотонной (черного, белого, серого, коричневого, шоколадного, голубого и др. оттенков), так и комбинированной. Живая масса – 4–5 кг. Длина туловища – 75 см. Плодовитость крольчих – 8–10 крольчат.

Породы комбинированного направления продуктивности

Советская шиншилла. Выведена в результате скрещивания мелких кроликов породы шиншилла с кроликами породы белый великан. Порода утверждена в 1963 году.

Голова небольшая; уши прямостоячие; грудь широкая и глубокая с небольшим подгрудком; туловище удлиненное, компактное; костяк крепкий; спина слегка аркообразная; круп широкий, округлый; ноги крепкие и пря-

мые. Окраска серебристо-голубая, с черными извилистыми линиями на хребте и боках. Живот, внутренняя сторона лап и хвоста белые с голубоватой подпушью. По краю ушей и верхней части хвоста проходит темная полоса. Характерны светлая кайма вокруг глаз, на затылке светлый пепельно-серый клин. Живая масса – 5 кг. Длина туловища – 68 см. Плодовитость крольчих – 7–8 крольчат.

Серебристый. Выведена в 1946–1952 годы. на Украине в результате чистопородного разведения животных породы шампань.

Для кроликов этой породы характерны крепкая конституция и правильное телосложение. Голова у них средней величины со сравнительно короткими, прямо поставленными ушами; туловище компактное, плотно сбитое, грудь глубокая и широкая, часто с небольшим подгрудком; спина прямая, хорошо омускуленная; круп широкий, округлый; конечности крепкие, пропорционально развитые. Окраска – серебристо-голубая. Живая масса – 4,5 кг. Длина туловища – 57 см. Плодовитость крольчих – 7–8 крольчат.

Бабочка. Выведена в 1887 году в Англии, путем скрещивания с кроликами пород белый великан, шиншилла, фландр и венский голубой. Отличаются крепкой конституцией. Голова у них средняя, туловище плотное; грудь глубокая и широкая, нередко с небольшим подгрудком; спина удлиненная, широкая; круп округлый и широкий; конечности крепкие, прямые, хорошо омускуленные. Окраска – белая с симметричным расположением черных пятен. Живая масса – 4–4,3 кг. Длина туловища – 34–56 см. Плодовитость крольчих – 7–8 крольчат.

Рекс. Выведена в 1919 году во Франции, используя для селекции диких серых кроликов. Кролики некрупные. Конституция нежная, хрупкая. Туловище небольшое, удлиненное. Голова небольшая, легкая. Уши тонкие, прямостоячие, немного закругленные на концах. Грудь глубокая, узкая, с небольшим подгрудком. Спина длинная, узкая, иногда слегка горбатая. Круп узкий. Конечности крепкие, прямые, хорошо поставленные, густо опушенные. Окраска – коричневая, голубая, черная и др. Живая масса – 3–4,5 кг. Длина туловища – 42–55 см. Плодовитость крольчих – 5–6 крольчат.

Венский голубой. Выведена в 1893 году в Австрии в результате скрещивания кроликов породы фландр с местными моравскими кроликами чисто-голубого окраса.

Отличаются крепкой конституцией, гармоничным телосложением. Голова у них легкая, с прямо поставленными ушами; туловище плотное, компактное, грудь глубокая и широкая; спина удлиненная и широкая; круп широкий, округлый; конечности правильно поставленные, прямые, крепкие, мускулистые. Окраска – сизо-голубая. Живая масса – 4–4,5 кг. Длина туловища – 57 см. Плодовитость крольчих – 8–9 крольчат.

Породы пухового направления продуктивности

Белая пуховая. Выведена в России путем скрещивания местных пуховых кроликов с кроликами ангорской породы, завезенными из Франции, при последующем разведении «в себе».

Голова средней величины, округлой формы. Уши прямостоячие, короткие. Туловище шарообразное, грудь не глубокая, без подгрудка. Спина широкая, длинная, слегка выгнутая, круп широкий, конечности прямые, крепкие. Длина пуха – 5–15 см. Пуховая продуктивность – 300–760 г пуха за год. Живая масса – 4–5 кг. Длина туловища – 54 см. Плодовитость крольчих – 6–7 крольчат.

Ангорская. Выведены в Турции в XVIII веке. По размеру кролики средние. Конституция животных нежная и ослабленная. Туловище укороченное. Голова округлая, большая. Шея короткая. Уши стоячие и короткие, на кончиках длинные и пушистые кисточки. Ноги крепкие, прямые. Длина пуха – 15–22 см. Окраска может быть разной – белой, голубой, серой и даже черной. Пуховая продуктивность – 150–500 г пуха за год. Живая масса – 2,5–4 кг. Длина туловища 43–45 см. Плодовитость крольчих – 6–8 крольчат.

3.

При организации воспроизводства кроликов необходимо учитывать их биологические и физиологические особенности, рассчитывая потребность в клетках и кормах, с учетом численности разводимого поголовья. Если целью разведения кроликов является получение шкурки высокого качества и однородных по цвету волоса, то выбирают животных мясо-шкуркового направления продуктивности. Следует приобретать чистопородных самцов и самок, так как только при чистопородном разведении можно получить однородное по окраске волосяного покрова потомство. При разведении кроликов для получения мяса приобретают кроликов мясных пород или мясо-шкурковых. Желательно содержать животных двух и более пород, получая помесный молодняк, отличающийся высокими показателями роста и качеством мяса.

У кроликов не выражена сезонность размножения, самцы и самки активны круглый год. Случку кроликов нужно организовывать так, чтобы она была проведена в сжатые сроки (5–6 дней). Во время такой случки проходят дружные окролы, при которых легче вести наблюдение, уход и кормление подсосных крольчат. Лучшее время для случки летом – раннее утро или вечер, а зимой – день. Половая зрелость у кроликов наступает в 3,5–4 месяцев.

Подготовка кроликов к случке. Перед случкой всех животных осматривают, оценивают упитанность, затем проводят подбор самцов к самкам с учетом их возраста, результатов предыдущей случки (сочетаемость пар). Все самцы и самки должны иметь заводскую упитанность, что достигается полноценным кормлением, которое начинают контролировать за 10–14 дней до планируемой случки. Ожиревшие или истощенные крольчихи плохо идут в случку, приносят слабых и мертвых крольчат, самцы не активны, имеют низкое качество спермы.

Спаривание кроликов проводят как правило, в клетке самца, куда подсаживают крольчиху. Из клетки самца удаляют все предметы, которые могут мешать случке (кормушки, ветки и т. д.).

В случку крольчих пускают в 5–6 месяцев, при достижении живой массы не менее 80 % от массы полновозрастных животных. Самцов пускают

в случку в 6–7-месячном возрасте. За самцом закрепляют 8–10 самок. Молодым производителям назначают не более 1–2 садок в неделю, взрослым – 2–3 садки через день.

Готовность самца к случке определяется по его активным ухаживаниям за самкой. При этом он трется нижней частью шеи о самку и конструкции клетки, совершает резкие скачки, у него учащается мочеиспускание.

Для случки выбирают самок, находящихся в охоте. Внешне крольчиху в охоте узнают по ее возбужденному состоянию, потере аппетита, она собирает и таскает в зубах подстилку, иногда отказывается от корма и разбрасывает его, наружные половые органы у нее ярко-красной окраски и слегка припухшие, уши горячие. Если такой крольчихе положить на спину ладонь, она принимает характерную позу: вытягивается и приподнимает крестец. И наоборот, если самка не в охоте, она либо убегает, либо прижимается к полу; прижимает хвост, издает жалобные звуки, отбивается от самца, стремится его укусить.

Половой акт длится несколько секунд. Сразу после спаривания самку необходимо вынести из клетки самца, в противном случае самец многократно ее покрывает и быстро истощается. При необходимости через 5 минут случку повторяют. Признаком действительно состоявшегося спаривания у кроликов является падение самца с самки на бок с легким урчанием или характерным писком.

Диагностика сукрольности у крольчих. В целях предупреждения прохолоста, желательно как можно раньше узнать сукрольность крольчихи. Рефлексологический метод. Основан на изменении поведения сукрольной самки. Для этого через 5–6 дней после первой случки делают «пробу самцом». Если крольчиха не допускает самца, издает стонущие звуки и проявляет другие признаки отсутствия охоты, то ее условно считают сукрольной, если же принимает его, то случку повторяют снова через 5–8 дней. Пальпация. Более точную диагностику сукрольности проводят на 12–15 дней после покрытия путем прощупывания плодов через брюшную стенку. У сукрольной крольчихи в области таза прощупываются располагающиеся цепочкой эластичные продолговатой формы зародыши величиной с лесной орех.

Уход за сукрольными крольчихами. Сукрольным крольчихам дают полноценный корм с высоким содержанием в нем протеина, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Кормить их следует регулярно в одни и те же часы. Для получения здоровых, хорошо развитых крольчат сукрольным самкам следует давать доброкачественные корма, нельзя вводить в их рационы заплесневелые и промерзшие корма, так как это может вызвать простудные заболевания, эмбриональную смертность или аборт. Зимой при наружном содержании в клетку сукрольной самки кладут обильную подстилку. Важно избегать беспокойства сукрольных крольчих, не создавать шум, не вытаскивать из гнезда за уши. При сильном испуге самки делают резкие скачки, что может вызвать ушибы, неправильное развитие плодов и аборт. Сукрольность крольчих составляет 28–34 дня.

Подготовка к окролу. За 3–5 дней до окрота в клетку крольчихи вставляют гнездовой ящик (рис. 56), предварительно заполнив его на 2/3 древесной стружкой.



Рис. 56. Гнездовой ящик

За несколько дней до окрота крольчиха начинает устраивать гнездо: собирает в кучу подстилку, мнет ее и устилает гнездо пухом, который выщипывает с груди и живота (рис. 57). Гнездовой ящик убирают из клетки при достижении крольчатами возраста 22–25 дней при условии, что температура в клетке или закрытом помещении не менее +20°C и в помещении нет сквозняков. Кролики всегда должны быть обеспечены чистой водой. Наличие воды особенно важно в период проведения окролов, поскольку после родов крольчихи испытывают сильную жажду.



Рис. 57. Самки готовят гнезда

Проведение окролов и осмотр гнезда. Окролы происходят в любое время суток и длятся от 20 минут до часа. После окрота самка облизывает новорожденных крольчат (рис. 58), укладывает их в гнездо, кормит и прикрывает пухом. Крольчиха может принести в помете от 1 до 19 крольчат, массой 40–80 г.



Рис. 58. Новорожденные крольчата

Время окончания окрота определяют по следующим признакам: у крольчихи живот спадает в пахах, нервное состояние сменяется спокойным, гнездо укрыто пухом.

У крольчихи проверяют состояние молочных желез и наличие молока. При отсутствии молока кормление самки усиливают. Молочность в первые дни после окрота определяют по внешнему виду крольчат. У высокомо-лочных крольчих крольчата упитанные, хорошо выглядят, у маломолочных – крольчата расползаются по гнезду, становятся тощими, кожа у них сморщенная, тусклая.

Под крольчихой оставляют 8–10 крольчат. При уравнивании гнезд учитывают дату окрота (разрыв не более 2–3 дней) и развитие крольчат.

Подсаживать к крольчихе чужих крольчат надо осторожно. При этом крольчиху убирают из клетки на 15–20 мин. и отвлекают ее внимание. Чтобы самка приняла чужих крольчат, их очищают от пуха, соломы или сена,

оставшихся от прежнего гнезда, укладывают в середину нового гнезда и укрывают гнездовым пухом. Подложенные крольчата быстро приобретают запах нового гнезда. После этого осторожно впускают в клетку самку. Как правило, самка ведет себя спокойно и одинаково выкармливает своих и подсаженных крольчат. Если же самка не принимает «чужаков», то лучше их не оставлять с ней.

Самка кормит крольчат в течение суток от 1 до 6 раз. За один раз крольчонок в первые дни после рождения высасывает от 4 до 8 г молока, а в возрасте 30 дней – около 30 г.

Отсадка и выращивание молодняка. Крольчат отнимают от матерей с 23- до 45-дневного возраста. За 3 дня до отсадки крольчатам дают антистрессовые препараты, которые смягчают действие стресса и увеличивают их сохранность.

В первые 15–20 дней после отсадки им дают те же корма, которые они получали, находясь рядом с маткой. Новые корма вводят постепенно в течение 5–6 дней. Отъемышей кормят 4–5 раз в день доброкачественными кормами. Грубый корм и чистую воду дают вволю. Нормы кормления для молодняка в связи с высокой интенсивностью роста изменяют и увеличивают через каждые 5–7 дней.

Температура в помещении должна быть выше 15° С. Летом предохранения от тепловых ударов клетки притеняют.

Молодняк, предназначенный для ремонта стада, размещают в клетках в количестве от 2 до 4 крольчат, а пользовательный молодняк – группами по 5–8 животных. Разделение по полу производят при отъеме.

4.

От системы содержания в значительной мере зависит состояние здоровья, рост, мясность и качество шкурок кроликов, что несомненно оказывает влияние на экономическую значимость ведения хозяйства.

Участок для строительства кролиководческой фермы следует располагать на сухом возвышенном месте, подальше от жилых помещений и других хозяйственных построек. Противопоказаны для крольчатников низины, болотистые места, в которых часто бывают туманы.

В фермерских хозяйствах применяют в основном наружноклеточную либо шедовую систему содержания кроликов.

Наружноклеточная система содержания кроликов. При этой системе кроликов содержат круглый год в переносных или стационарных клетках, находящихся либо под открытым небом, либо под навесом.

Преимущества клеточной системы заключаются в том, что при содержании кроликов в клетках можно вести учет, проводить случку и окролы в желательные сроки, применять индивидуальное нормированное кормление животных, выполнять необходимые профилактические мероприятия, своевременно обнаружить и изолировать больных кроликов и т. д.

Круглогодичное содержание в клетках на открытом воздухе не только повышает устойчивость организма, но улучшает племенные и продуктивные качества животных, благотворно влияет на состояние волосяного покрова.

Любители применяют и комбинированный метод содержания: весной, летом и осенью клетки размещают на открытом воздухе, зимой взрослых кроликов в период случки и окролов содержат в помещении, используя стационарные и переносные клетки, которые расставляют в сараях в два или три яруса.

При всех своих достоинствах наружноклеточная система содержания кроликов все же не лишена некоторых недостатков. Основной ее недостаток заключается в низкой производительности труда: один кроликовод может вырастить за год не более 1500–1800 голов молодняка и получить 30–40 ц мяса кроликов в живой массе, т. е. при содержании кроликов в таких клетках один кроликовод может обслужить не более 70–80 самок основного стада с приплодом до реализации. Механизация труда при этом полностью отсутствует.

Клетки можно делать деревянными, кирпичными или из другого материала. Важно, чтобы клетки были простыми по конструкции, а также удобными для животных и их обслуживания (раздачи кормов, осмотра животных, чистки). Устанавливают клетки на высоте от 0,8 до 1 м от земли. Клетки могут быть одноместные, двухместные и групповые.

Наибольшее распространение при наружноклеточной системе содержания получили двухместные одноярусные клетки конструкции Научно-исследовательского института пушного звероводства и кролиководства (рис. 59).




Рис. 59. Двухместная клетка для взрослых кроликов с гнездовым отделением:

- 1 – дверка в гнездовое отделение; 2 – столб-подставка; 3 – сетчатая дверка;
4 – откидная поилка; 5 – откидная кормушка; 6 – ясли; 7 – ось кормушки

Вдоль наружных боковых стенок в них устанавливают два постоянных гнездовых отделения со сплошным деревянным полом, а оставшиеся части клеток представляют собой кормовые отделения с реечным или сетчатым полом. Крыша у клеток односкатная. Из гнездового отделения в кормовое, ближе к фасадной стенке клетки, на уровне 10–12 см от пола расположен лаз. На фасадной стороне клетки навешивают две сетчатые дверки, ведущие в кормовые отделения, и две сплошные дощатые – в гнездовые отделения, а также съемные кормушки и поилки. Для раздачи грубых кормов между кормовыми отделениями устанавливают ясли, выполненные из двух деревянных рамок, обтянутых сеткой.

Молодняк на мелких фермах содержат небольшими группами по 3–4 головы в клетках для взрослых животных, группами по 10–15 голов в сетчатых выгулах с убежищами или групповых клетках (рис. 60). Выгула ставят на столбики на расстоянии 80 см от уровня почвы. К выгулу монтируется тесовое убежище, внутри которого делают 2–4 перегородки, а в задней стенке – 2–4 лаза в общий выгул. Крыша убежища тесовая, подвешенная на металлических петлях, пол сетчатый.




Рис. 60. Двухместная клетка с сетчатым выгулом-вольером

Отсаженный молодняк обычно содержат в групповых клетках (рис. 61), представляющих собой деревянный каркас, передняя стенка и пол которого затянуты металлической сеткой, а крышка, задняя и боковые стенки деревянные. Передняя стенка состоит из двух дверок, на которых крепятся самопрокидывающиеся кормушки и поилки, а также ясли для сена и травы. Крыша клетки наклонная, тесовая с козырьком. Клетки монтируют блоками и ставят на деревянные столбики высотой 80 см. Групповая клетка для молодняка рассчитана на одновременное содержание 18–20 голов молодняка до 3-месячного возраста или 15–16 голов старшего возраста. Для экономного использования земельной площади и кубатуры сарая для содержания самок с приплодом и самцов используют двухъярусные четырех- или шестиместные клетки.




Рис. 61. Групповая клетка для отсаженного молодняка

Клетка-садок предназначена для содержания отнятого молодняка на траве (рис. 62). Переносная клетка-садок имеет трехгранную форму.



Рис. 62. Клетка-садок

Третью часть каркаса обивают с трех сторон досками (для укрытия животных от жары и непогоды), остальную часть обтягивают металлической сеткой. В верхней части делают дверку. Количество кроликов в одном садке зависит от состояния травостоя и частоты перемещения его на новые участки. В качестве посуды в переносных садках используют круглые глиняные плошки с толстым дном.

Шедовая система содержания кроликов. Шед представляет собой сарай с каркасом из дерева, металла или железобетона (рис. 63, 64). Продольные стены таких сараев образованы из задних стенок клеток, в которых содержат кроликов, а короткие торцевые стены выполнены в виде входных и выходных дверей. Двускатная крыша шеда приподнята над клетками. Между крышей прохода и крышей клеток расположен застекленный фонарь, который летом можно открывать. Клетки, изготовленные из дерева и сетки, ставят в один или два яруса. Пол кормового прохода и под клетками бетонируют или асфальтируют.



Рис. 63. Наружный вид шеда с двухъярусным расположением клеток

Наклонная крыша клеток нижнего яруса, покрытая водонепроницаемым материалом, служит поддоном для клеток верхнего яруса. Клетки для взрослых крольчих разделяются на кормовое и родильное отделения специальным лазом. На фасаде клетки навешиваются две дверцы: одна сетчатая – в кормовое отделение, другая тесовая – в гнездовое (родильное).

При шедовой системе содержания кроликов применяется простейшая механизация трудоемких процессов (раздачи кормов, водоснабжения и уборки навоза). Температура в шед в холодное время года на 1–2 °С выше наружной.



Рис 64. Внутренний вид шеда с двухъярусным расположением клеток

Основной недостаток шедового содержания состоит в том, что микроклимат в шедах в значительной степени зависит от погоды. Низкая температура воздуха в них в холодное время года не позволяет механизировать поение животных, уборку навоза, а также организовать круглогодичное равномерное воспроизводство стада, так как при зимних окролах почти весь молодняк погибает от морозов.

В последние годы широкое распространение получили «мини- фермы» (блок одноярусных или двухъярусных деревянных клеток) конструкции И. Н. Михайлова (рис. 65).

Шед представляет собой единую конструкцию, состоящую из двух рядов одно-, двух- или трехъярусных клеток, разделенных центральным проходом для обслуживания животных. Крыша верхнего яруса служит одновременно и крышей шеда. Над центральным проходом крыша шеда двухскатная, приподнятая над уровнем клеток на 70 см, между крышей прохода и крышей клеток имеются застекленные рамы (фонари). Задние боковые стенки клеток являются одновременно стенками шеда, под клетками устраивают деревянные откидные щиты, которые открывают во время уборки навоза.



Рис. 65. Одноярусная «миниферма» для содержания кроликов конструкции И. Н. Михайлова

Это ярусное сооружение, разделенное на секции для различных возрастных групп. Основные элементы конструкции минифермы деревянные, и только некоторые из них изготавливают из оцинкованной сетки (дверцы). Общая площадь одной минифермы составляет 1,4 м². В ней можно содержать в течение года 1 или 2 самки с приплодом (всего до 25 голов), получать, в расчете на крольчиху, до 3,5 окролов и не менее 100 кг мяса.

Отличительной особенностью этих клеток является возможность их функционирования в автономном режиме, что снижает затраты труда на обслуживание животных. В первую очередь это кормушки с раздатчиками корма, автопоилки, сборщики мусора и фекалий.

Работа этой минифермы заключается в простом ее обслуживании. Кроликовод лишь изредка контролирует всю автоматику и раз в неделю заряжает корма и воду, очищает выгребную яму.

Конструкция кормушек и поилок разработана таким образом, что запаса корма и воды хватит на неделю, притом, что они круглосуточно доступны животным, что является залогом их быстрого роста. При этом комбикорма на содержание одного животного расходуется меньше, чем при обычном методе выращивания. Кролики, в связи со спецификой строения своего же-

лудка, должны постоянно жевать. При традиционном 2–3 разовом способе кормления природные потребности животных не удовлетворяются.

Также организм кроликов постоянно нуждается в воде, которая зимой подогревается. Этот метод предусматривает самоочищение вакуумной поилки за счет особенностей ее конструкции.

Моча и помет в миниферме поступают в специальный поддон, который один раз в месяц очищается.

Роль вентиляции в клетках выполняет естественная вытяжка (труба, выходящая вверх из клетки). Благодаря трубе кролики все время дышат чистым воздухом, что способствует хорошему иммунитету и прекрасному здоровью.

В минифермах предусмотрен электроподогрев маточников, что позволяет получать круглогодичные окролы даже в зимние морозы. На миниферме крольчата содержатся вместе с крольчихой до 3-х месячного возраста. Далее молодняк переводится в отдельные клетки дифференцированно по половому признаку и дорастивается в течение месяца до достижения нужных кондиций.

Этот метод позволяет получать высокую прибыль при минимальных затратах времени и усилий на содержание крольчатника, однако большая часть обслуживания не механизирована.

5.

Кормление кроликов в условиях фермерских хозяйств обычно зависит от времени года. Летом основу кормового рациона составляет зеленый корм, дополненный сеном и концентрированными кормами; зимой – сено, дополненное корнеплодами, концентрированными кормами, минеральными и витаминными добавками. Гранулированные кормовые смеси добавляют при откорме на сене.

От уровня кормления зависят воспроизводительность, продуктивность и здоровье животных.

Основные корма, используемые в кролиководстве

Корма, используемые в кролиководстве, подразделяются на концентрированные, животного происхождения, грубые, зеленые, сочные, минеральные и витаминные.

Концентрированные корма. Их удельная масса в общем расходе кормов за год в кролиководстве составляет обычно не менее 40 % по питательности. Концентраты можно подразделить на следующие группы: зерновые корма (зерно злаковых, бобовых и масличных культур), комбикорма и остатки технических производств.

Из зерновых кормов наиболее полезные для кроликов кукуруза, овес, ячмень. Высокой питательностью отличается зерно кукурузы, оно богато углеводами, жиром и предает большую энергетическую ценность, а как монокорм вызывает ожирение. Однако оно несколько бедно протеином, в связи с чем его рекомендуется скармливать кроликам в сочетании с высокопротеиновыми кормами – жмыхами, шротами, горохом, кормовыми бобами, пшеничными отрубями, кормами животного происхождения, бобовыми травами,

бобовым сеном. С успехом можно скармливать кроликам и свежие кукурузные початки, убранные в фазе молочно-восковой и особенно восковой спелости. Особенно охотно кролики поедают овес, который скармливают взрослым кроликам без всяких опасений в больших количествах (до 150–200 г в сутки). Овес благоприятно действует на воспроизводительную функцию животных, достаточно питателен и не вызывает ожирения.

Ценным кормом являются также пшеница и просо, их можно давать без ограничения. Ячмень для кроликов лучше пшеницы, он улучшает пищеварение, питателен и особенно рекомендуется для лактирующих самок и молодняка на откорме. Следует соблюдать умеренность при кормлении пшеницей и ячменем взрослых животных на передержке и сукрольных. Пшеница как монокорм может вызвать вздутие, а при длительном скармливании нарушается минеральный обмен. Рожь скармливают в небольших количествах – не более 10 % зерносмеси. Зерно обычно дают целым или дробленным, слегка замоченными, исключая овес. Зерна ячменя покрыты труднопереваримыми оболочками, поэтому перед скармливанием их необходимо разрушить на мельницах.

Следует обратить внимание, что зерна злаковых и бобовых культур для лучшего их переваривания целесообразно скармливать в дробленном виде, лучше в смеси с каким-либо мягким кормом – вареным картофелем, комбикормом, отрубями. В таком виде зерновые культуры поедаются более охотно.

Зерно бобовых (горох, кормовые бобы, соя, чечевица, вика) богато протеином и минеральными веществами – кальцием и фосфором. Скармливание зерен бобовых ограничивают (не более 40–100 г) в связи с тем, это они могут вызвать вздутие живота (тимпанию) и запоры, особенно у молодняка. Бобовые зерновые корма, во избежание тимпании, скармливают размолотыми или дроблеными, лучше в смеси со злаковыми, отрубями или вареным картофелем. Очень любят кролики семена эспарцета. Однако однообразное кормление крольчих во второй половине сукрольности семенами эспарцета вызывает аборт, а нередко и гибель крольчих от паралича из-за интоксикации.

Комбикорма – лучшая разновидность концентратов. Разработаны промышленные рецепты полнорационных комбикормов для кроликов, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности их организма в питании, а также рецепты комбикормов-концентратов (неполнорационных), скармливаемых животным вместе с сеном, зеленой травой или сочными кормами собственного производства. Полнорационные корма обычно гранулируют, комбикорма-концентраты могут быть и рассыпчатыми. В состав полнорационных гранулированных комбикормов входят 30–40 % по массе (или 25–30 % по энергетической питательности) травяной муки хорошего качества, витаминные и минеральные добавки. Для балансирования полнорационных гранул по протеину и аминокислотам в их состав обязательно включают подсолнечниковый жмых или соевый шрот. В кормосмеси для лактирующих крольчих и крольчат-отъемышей нужно добавлять сухое обезжиренное молоко или ЗЦМ. В такие комбикорма вводят витамины А, Д, Е, углекислый марганец, сернокислое железо, углекислый цинк, углекислую медь, т. е. ве-

щества, которые трудно дозировать и нельзя давать отдельно от основных кормов (добавляют в расчете на 1 т комбикорма). При скармливании полнорационных гранулированных комбикормов все питательные вещества используются наиболее экономно, в результате чего затраты корма на единицу продукции снижаются (известно, что при раздельном способе раздачи кормов потери сена и травы достигают 30 % и более, а потери концентратов – до 10–16 %). Гранулированные комбикорма дольше сохраняют питательность, не требуют смачивания перед раздачей (рассыпные комбикорма, раздавленные в сухом виде, раздражают носоглотку животных и вызывают риниты). Таким образом, комбикорма по биологической полноценности, особенно полнорационные, превосходят обычные смеси зерновых компонентов, так как содержат в своем составе жмыхи, шроты, отруби и витаминно-минеральные добавки. Нельзя использовать комбикорма с высоким (более 1 %) содержанием поваренной соли. Рассыпных комбикормов в рационы кроликов целесообразно вводить до 50 % общей питательности концентратов.

Остатки технических производств. В эту группу кормов входят отруби, жмыхи, шроты, солодовые ростки, жом сухой, пивная дробина и др.

Отруби (остатки мукомольно-крупяного производства) представляют собой наружные оболочки зерен с примесью зародышей. Они богаты протеином (11–15,5 %), фосфором (почти в 2 раза больше, чем в зерне пшеницы), витаминами комплекса В, витамином Е, а также марганцем и цинком. Отруби стимулируют молочную продуктивность. Лучшими считаются пшеничные отруби. В комбикорма для кроликов их вводят от 5 до 15 % по массе. Следует иметь в виду, что отруби скармливают в небольшом количестве, так как установлено, что у самок с 25-го дня лактации до отсадки молодняка и у крольчат до 3-месячного возраста при скармливании большого количества отрубей ухудшается поедаемость других кормов рациона, ослабляется деятельность желудка, что способствует возникновению предпосылок для развития кокцидиоза и желудочно-кишечных заболеваний. Отруби скармливают кроликам слегка увлажненными. Чтобы отруби не разбрасывались из кормушек, лучше всего давать их в смеси с корнеплодами, картофелем, жмыхом или посыпать малосъедобные корма, но последние в этом случае должны измельчаться и смачиваться горячей водой.

Жмыхи и шроты относятся к побочным продуктам масложирового и маслоэкстракционного производства. Наилучшими для кроликов считаются богатые протеином (38–40 %) подсолнечный и соевый, а также льняной и конопляный жмыхи и шроты. Шроты отличаются от жмыхов меньшим содержанием жира – 1–3 %. Жмыхи содержат много жира (7,6–10,2 %) и витамины комплекса В. Жмыхи и шроты также богаты фосфором и железом. Хлопчатниковые жмых и шрот кроликам давать не следует из-за содержания в них ядовитого вещества госсипола. Отходы переработки семян масличных культур скармливают дроблеными или запаренными в смеси с отрубями и картофелем. Молодняку до 2 месяцев давать жмыхи не рекомендуется.

Корма животного происхождения. К кормам этой группы относятся молоко коровье (цельное и снятое – обрат), пахта, сыворотка (побочные продукты сыро- и маслоделия), мясная, мясокостная, кровяная мука и мука из

непищевой рыбы. Так как кролики в основном растительноядные животные, то в их суточные рационы вводят лишь по 5–10 г кормов животного происхождения, преимущественно для балансирования рационов по протеину. Молоко, обрат, сыворотка как в свежем, так и в сухом виде является ценными диетическими кормами и содержат полноценный белок; применяют главным образом для подкормки отсаженного молодняка, особенно при ранней отсадке и лактирующих самок. Цельное и снятое молоко в свежем или заквашенном виде используют для приготовления кормовых мешанок. Сыворотку и пахту выпаивают в натуральном виде.

Мясная, мясокостная, кровяная и рыбная мука содержат от 20 до 60 % протеина и от 1,9–2,5 до 10–14 % жира; богаты эти корма кальцием и фосфором. Скармливают их в составе мешанок или комбикормов (1–2 % по массе). Рыбная и мясокостная мука используются мало из-за риска отравления и потому, что придает мясу кроликов неприятный вкус, как минимум за 3 недели до убоя из рациона их надо исключить.

Грубые корма. К ним относятся сено, солома, облиственные ветви деревьев. Грубые корма обеспечивают достаточный объем рациона и необходимы для лучшего пищеварения, так как в них содержится клетчатка, влияющая на усвоение питательных веществ других кормов, зерна, корнеплодов и др. Основным кормом из этой группы – сено. Наиболее питательно для кроликов бобовое (из люцерны, клевера, эспарцета, вики, сераделлы) и бобово-злаковое (викоовсяное и др.) сено ранней уборки с сохранившимися листочками (при скашивании растений до цветения или в его начале, высушенное в тени на вешалах и т. п.). Бобовое сено примерно в 2 раза богаче протеином, чем злаковое. Для уменьшения потерь питательных веществ важно, чтобы сено было высушено как можно быстрее. В таком сене много белков, витаминов и минеральных веществ. Сено из травы, скошенной после цветения, высушенной под прямыми солнечными лучами, а также из перестоявшихся трав или попавших под дождь, содержит меньше питательных веществ, бывает грубым, плохо поедается и усваивается кроликами. Скармливание такого сена вызывает снижение продуктивности и лактации самок, ухудшение роста и упитанности молодняка. Сено из разнотравья (луговое, лесное, суходольное) будет хорошим при скашивании трав до цветения или лучше в начале его. Плохо поедают кролики малопитательное болотное сено, из тенистых оврагов. При скармливании сена, высушенного в тени, в рацион самок и молодняка необходимо добавлять витамин Д. Кролики плохо усваивают клетчатку, поэтому любое сено должно быть очень хорошего качества: зеленого цвета, ароматное, без пыли и плесени, с листочками. Кролики обладают тонким вкусом и обонянием и очень чувствительны к плесневелым кормам. Даже вода плохого качества может снизить их аппетит и вызвать заболевание.

При недостатке сена для кормления кроликов можно использовать солому, лучше гороховую, соевую или яровую овса, проса. Следует иметь в виду, что это плохой корм для кроликов из-за высокого содержания труднопереваримой клетчатки. И совершенно непригодна даже в запаренном виде озимая солома ржи и пшеницы.

Веточный корм. Кролик – грызун, и для стачивания зубов самцам и крольчихам, которых содержат сравнительно долго, желательно давать облиственные ветви. Они охотно едят ветви всех фруктовых деревьев, липы, березы, акации, осины, ивы, рябины, вербы, клена, тополя, молодого вяза. Нельзя давать кроликам ветки бузины, волчьей ягоды, раkitника, бересклета, так как в них содержатся ядовитые вещества. Ветки косточковых плодовых деревьев – вишни, черешни, абрикоса – кроликам лучше не скармливать из-за содержания в коре синильной кислоты. Ветви дуба, ольхи и орешника следует давать кроликам при расстройстве пищеварения, так как они содержат дубильные вещества, действующие закрепляюще на желудок. Из хвойных деревьев для скармливания зимой (за исключением весеннего и летнего времени) годятся свежие ветки сосны, ели, можжевельника, которые служат дополнительным источником витаминов (в 1 кг хвои ели содержится 55 мг каротина, в сосне – 60 мг, в можжевельнике – 45 мг). Хвоя улучшает аппетит, придает блеск волосяному покрову, стимулирует половую охоту у взрослых кроликов, повышает энергию роста у молодняка, придает мясу кроликов аромат и нежность, обладает антигельминтозными свойствами, эффективна при лечении поносов, легочных и глазных заболеваний.

Заготовку веток можно вести как летом так, и зимой, причем в ветках летней заготовки кролики поедают главным образом листья, а в ветках зимней заготовки – кору. Молодые побеги с листьями заготавливают на зиму в июне–июле, когда они содержат наибольшее количество питательных веществ. Срезают ветки толщиной 0,5–1 см длиной около 50 см, связывают их в нетугие пучки (лучше из 3–4 разных пород деревьев) и развешивают для просушки в хорошо вентилируемом помещении, на чердаках или под навесом. Сухими ветками можно заменять до 50 % нормы грубых кормов.

В летнее время древесные ветки должны включаться в рацион только как добавление к траве, чтобы кролики не грызли клетку. Грубые корма скармливают кроликам в основном поздней осенью, зимой и ранней весной.

Зеленые корма. К ним относятся естественные, а также сеяные однолетние и многолетние травы, отходы садоводства (листья земляники, опавшие яблоки) и овощеводства (ботва корнеплодов, кочерыжки и т. д.). Зеленые корма служат хорошим источником полноценного протеина, сахара, крахмала, витаминов, минеральных веществ. Включение в рационы кроликов разнообразных зеленых кормов способствует нормальному росту и развитию крольчат, обильному продуцированию крольчихами молока.

Все травы, которые едят другие животные, обычно съедобны и для кроликов (лесные, луговые). Но некоторые из них кролик поедает особенно охотно – это травы преимущественно с горьким вкусом и пахучие – в большинстве своем сорняки (полынь, молочай, одуванчик, тысячелистник и т. д.). Из посевных однолетних и многолетних трав кролики предпочитают питательные бобовые и бобово-злаковые: клевер, вику, люцерну, эспарцет, сою, сладкий люпин и смеси – викоовсяную, горохоовсяную, а также злаковые: овес, ячмень, кукурузу, озимую рожь до выхода в трубку. Лучшим зеленым кормом считается разнотравье с примесью бобовых. Лесная трава хорошего ботанического состава бывает на пустошах и хорошо освещенных просеках.

На заливных лугах, в поймах рек часто встречаются бобовые (клевер, люцерна), разнотравье (тысячелистник, одуванчик, подорожник, манжетка). Эти травы кролики хорошо поедают. На зеленые корма переходят сразу, как только появляются первые весенние травы – крапива, лопух, таволга. Кролику скармливают дикорастущие ранние сорняки – пырей (вместе с корнями), сурепку, дикуую редьку, осоку, одуванчик. Осенью широко практикуется скармливание ботвы корнеклубнеплодов (свекольной, брюквенной, турнепсовой, морковной). Самая лучшая ботва – морковная, ее можно давать кроликам вволю, без всяких опасений за их пищеварение. Что же касается ботвы свеклы, то ее дают не более одного раза в сутки и при появлении поноса немедленно исключают из рациона. Ботву картофеля в корм кроликам использовать не рекомендуется, так как она содержит соланин, который вреден для их здоровья.

В некоторых хозяйствах для кроликов выращивают ревень, который кролики хорошо поедают и усваивают. Ревень служит молокогонным кормом для самок и хорошо влияет на развитие крольчат. Обладает он слегка послабляющим действием. Потребность кроликов в зеленых кормах в значительной мере может быть покрыта путем использования дикорастущего разнотравья, особенно если травы дополняют друг друга по питательности и усвояемости, поддерживают устойчивый аппетит.

Подорожник богат протеином, углеводами, минеральными веществами, в нем мало клетчатки. Полезен для молодняка и взрослых кроликов.

Крапива не уступает по кормовой ценности бобовым растениям и с удовольствием поедается (дают как белковую подкормку сукрольным и лактирующим самкам, молодняку). В свежем виде используется до бутонизации, так как позже быстро грубеет. Перед дачей крапиву ошпаривают горячей водой, измельчают, мнут, сдабривают комбикормом и отрубями. В свежем виде обладает слегка послабляющим действием, поэтому эффективна при желудочно-кишечных заболеваниях. Летом крапиву заготавливают на сено, высушивают под навесом, связанную в пучки.

Тысячелистник повышает аппетит, улучшает пищеварение, обладает вяжущими свойствами, поэтому его полезно давать с корнями, оказывающими послабляющее действие (например, с ботвой корнеплодов). У подсосных крольчат улучшает молочность.

Полынь содержит эфирные масла, которые возбуждающе действуют на сердце, пищеварительный тракт и почки. Считается одним из лучших средств повышения аппетита и активизации пищеварения. Кроликам дают ограниченное количество полыни в смеси с другими травами с целью предупреждения желудочно-кишечных расстройств и повышения поедаемости корма. Некоторые виды полыни ядовиты.

Тмин заслуживает особого внимания, так как обладает легким антикокцидиозным и антисептическим действием.

Пижма имеет сильный запах, охотно поедается кроликами. Одуванчики надо давать молодняку в размере не более 30 % от массы всех зеленых кормов (в 1 кг – 0,22 к.ед. и 28 г переваримого протеина).

Из других дикорастущих трав кролики едят щавель, мать-и-мачеху, бедренец, лебеду, манжетку, донник, мышиный горошек, чину луговую, спорыш. В кормушку подкладывают и пряно-ароматические растения: петрушку, укроп, сельдерей, чеснок, ромашку. При включении в рационы кроликов зеленых кормов необходимо следить, чтобы в их состав не попали ядовитые травы, представляющие опасность для здоровья животных. Наиболее опасны они для молодняка и беременных самок. В ядовитых растениях токсические вещества содержатся постоянно или в отдельных фазах роста. Некоторые ядовитые растения – лютики, ветреница, зимовник (или безвременник осенний), паслены, собачья петрушка, калужница болотная, прострел луговой при сушке теряют свои токсические свойства. К числу ядовитых трав относятся: чистотел, вех ядовитый (или цикута – одно из наиболее ядовитых растений) молочай, чемерица, прострел, дурман, чернокорень, белена черная, болиголов ядовитый, наперстянка, ландыш майский, василек рогатый (или живокость), борец, кокорыш (собачья петрушка), весенний горицвет, европейский копытень, болотный багульник, европейский бересклет, осот ядовитый, калужница болотная, мак самосейка, папоротник орляк, полынь эстрагон и полынь настоящая, куриная слепота, хвощ полевой, зверобой, окопник, чистец. При первых случаях отравления необходимо исключить из рациона сомнительную траву, а кролику дать 1–2 чайных ложки 1 %-ного раствора танина или напоить его молоком. Для очистки желудочно-кишечного тракта хорошо дать 1–2 чайных ложки касторового масла. При скармливании кроликам зеленых кормов нужно соблюдать некоторые правила. Весной переводить животных с зимних сухих кормов на зеленые корма надо постепенно. Первые дачи зеленых кормов молодняку не должны превышать 25–50 г, а взрослым особям – 50–100 г в сутки на одну голову. Затем в течение 5–10 дней дозы постепенно увеличивают до полного рациона (во избежание поноса). При скармливании кроликам большого количества зеленых кормов следует на ночь раздавать им свежесушенное сено. Не следует длительное время кормить животных одним, даже любимым видом корма, так как это приводит к потере аппетита, ухудшению поедаемости и усвояемости кормов, недостатку в организме тех или иных необходимых элементов. Не рекомендуется давать зеленую траву, покрытую инеем, он должен сойти, нельзя давать траву, почерневшую от заморозков и покрытую плесенью, а также свежескошенную траву – ее надо обязательно провялить. Однако при скармливании одной травы крольчата плохо растут, а самки перестают лактировать. Использование зеленых кормов вызывает необходимость давать концентрат. Богатые белками бобовые травы позволяют заменять в рационе 50 % концентрированных кормов, что удешевляет кормление кроликов. Кроликам можно скармливать зеленые ветки. При даче веток хвойных деревьев зеленые корма можно заменять на 50 %, лиственных – на 90–100 %.

Сочные корма благоприятно влияют на аппетит, пищеварение, образование молока у крольчих и продуктивность животных. Скармливают их в основном зимой, включая в состав мешанок в запаренном или натуральном измельченном виде. Крольчихам можно давать до 500–600 г корнеплодов в сутки. Мороженые корнеплоды скармливают только в вареном виде. Корне-

плоды богаты легкопереваримыми углеводами и витаминами, поэтому они хорошо усваиваются. Однако в них много воды (70–80 %), мало протеина, жира, клетчатки и минеральных веществ. В корм кроликам используют все корнеклубнеплоды, но лучшими считаются морковь, свекла (сахарная, полусахарная, кормовая), картофель, турнепс. Морковь можно давать вволю без всяких опасений за пищеварение, в то время как другие корнеплоды дают в ограниченных количествах, в особенности молодняку. Морковь можно давать крольчатам с 20–25-дневного возраста по 20–30 г в сутки и постепенно суточную дозу увеличивают до 100–200 г. Полновозрастным кроликам хорошо вымытой и измельченной моркови можно скармливать до 300–400 г в сутки.

Сахарная свекла содержит много сахара и мало клетчатки. Ее можно скармливать в свежем, сушеном и силосованном виде. Особенно хорош для кроликов силос из сахарной свеклы в смеси с вареным картофелем и измельченной зеленой массой бобовых культур. Все корнеплоды скармливают в сыром виде, картофель – в вареном и сыром.

Кролики охотно поедают листья и стебли кормовой капусты. По сравнению с другими сочными кормами в кормовой капусте содержится большое количество питательных веществ, в том числе минеральных (особенно кальция и фосфора). Богата она также железом и серой, что положительно влияет на образование шерстного покрова.

Брюква – малораспространенный корм, но более питательный, чем кормовая свекла, дольше хранится. Тыкву в свежем виде кролики почти не едят, скармливают ее в запаренном виде в составе мешанок. В рацион можно включать кабачки, топинамбур (земляную грушу), репу, редьку. Следует помнить: красную столовую свеклу, листья столовой капусты можно давать лишь в небольших количествах, так как они вызывают поносы и вздутия.

Витаминные и минеральные корма. В группу витаминных кормов входят дрожжи кормовые и гидролизные, травяная и хвойная мука, пшеничные зародыши. Дрожжи являются ценным белково-витаминным кормом. Они богаты протеином (45–54 %), отличающимся высокой биологической ценностью, и содержат почти все витамины комплекса В (за исключением витамина В12). Кроме того, в дрожжах содержатся провитамин Д2 (эргостерон), минеральные вещества и другие биологически активные соединения, которые способствуют лучшему усвоению протеина и углеводов корма. Больше всего витаминов в сухих пивных дрожжах, затем в пекарских и кормовых. В рационы кроликов в качестве белково-витаминной добавки вводят 1–2 % дрожжей по массе.

Травяная мука – ценный витаминный корм, получаемый в результате искусственной сушки зеленой массы различных трав. Лучшей для кроликов считается травяная мука, приготовленная из бобовых или бобово-злаковых трав. В хорошей травяной муке много каротина: в 1 кг травяной муки первого класса содержится 230 мг каротина, 20 % сырого протеина и 22 % сырой клетчатки. В рационы кроликов можно вводить до 30–40 % травяной муки по массе.

Хвойная мука содержит в 1 кг от 50 до 130 мг каротина в зависимости от ее качества. Богата она микроэлементами и антигельминтными веществами. Для приготовления хвойной муки используют ветки сосны и ели. Скармливать их кроликам можно также в свежем виде в первые дни по 10–20 г на голову в сутки, а через 5–7 дней – до 100 г. Такая предосторожность объясняется довольно высоким содержанием в хвойных ветках эфирных масел, которые могут оказать вредное действие на организм кроликов.

Пшеничные зародыши отделяются от зерен при сортовых помолах пшеницы. Богаты витаминами Е и комплекса В, в рационы кроликов можно вводить по 5–10 г в сутки. Хорошей витаминной подкормкой для кроликов являются ягоды рябины.

К группе минеральных кормов относятся мел, костная мука, кормовой фосфат, поваренная соль и соли микроэлементов. В рационы, недостаточно сбалансированные по минеральным веществам, включают мел, костную муку, фосфаты в количестве 0,5–1 % по массе.

Поение кроликов. Наряду с хорошим кормлением очень важно, чтобы кролики всегда имели доступ к воде, так как недостаток воды приводит к уменьшению потребления корма, снижает производство молока у крольчих, отказа их от выкармливания крольчат, может стать причиной каннибализма, поражения почек, а также приводит к обезвоживанию при диарее. Нехватка или отсутствие воды приводит к уменьшению аппетита, усилению жажды, уменьшению массы, вследствие чего животные болеют и умирают.

Поят кроликов ежедневно – утром и вечером, но вода в клетках должна быть постоянно. Кролик потребляет в 1,5–2 раза больше воды, чем сухого вещества корма, т. е. 200–350 мл воды. При кормлении кроликов вволю основную часть воды они выпивают в вечернее и ночное время, в тот период, когда они потребляют наибольшее количество кормов. Скармливание кроликам сухих кормов (гранулы, сено, солома, зерновой корм) увеличивает потребность в воде у лактирующих крольчих до 3,5 л, у откормочного молодняка – до 0,5 л на голову в сутки.

Молодняку в силу более интенсивного обмена веществ и повышенного содержания воды в организме требуется больше воды, чем взрослым животным. Особенно много воды требуется сукольным и лактирующим крольчихам в связи с развитием эмбрионов и производством молока. Потребность лактирующих крольчих в воде зависит от количества подсосных крольчат, всякое ограничение в воде отрицательно влияет на количество молока и отъемную массу крольчат.

Особенности кормления кроликов

в разные возрастные и физиологические периоды

При кормлении кроликов необходимо создать план питания в соответствии с сезонами года. В холодное время года необходимо обязательно добавлять в рацион как концентрированные, так и сочные корма. Питание должно включать такие продукты, как сено, зерно, солому, комбикорма, отруби, пищевые отходы, жмыхи. Летом содержание кроликов значительно дешевле, поскольку они охотно будут есть траву, овощи и ветки деревьев

вместе с зерномучными кормами. Рацион кролика обязательно должен содержать 30 % зерновых от общего объема корма.

Кормление взрослых кроликов в период покоя. Период относительно покоя бывает у самцов в промежутках между случками, а у самок – после отсадки молодняка последнего окрола до начала подготовки к новому производственному году (обычно этот период бывает относительно длительным в позднеосенние и зимние месяцы при наружном содержании в шедах). В это время необходимо сохранить нормальную упитанность животных. Для этого в рацион включают сено, сочные корма (корнеклубнеплоды, силос) и небольшое количество концентратов (до 40 % по энергетической питательности). При недостатке сена в рацион можно включать веточный корм. В этот период взрослому кролику крупной породы достаточно давать в сутки 30 г зерна и 500 г травы, а зимой – 30 г зерна, 100 г картофеля или сахарной свеклы, 250 г силоса и 100 г лугового сена.

Кормление половозрелых кроликов в случной период. Ко времени случки важно довести кроликов до состояния заводской упитанности, поэтому за 20–30 дней до начала случки кроликов следует перевести на более усиленное кормление. Цель правильного кормления в этот период – обеспечить высокую половую активность самцов-производителей, хорошую оплодотворяемость и плодовитость самок, получение жизнеспособного приплода. Количество и качество спермы, продуцируемой самцами-производителями, зависит от содержания в рационе протеина, витаминов А, Д, Е, комплекса В и минеральных веществ. Поэтому в случной период для обогащения рационов полноценным протеином в них следует включать жмых, отруби, мясокостную и рыбную муку. В рационы вводят красную морковь, пророщенные зерна овса и ячменя, витаминное сено. Зелень пророщенных зерен, достигшую 7–8 см, срезают и скармливают самцу по 10–15 г в сутки в течение 2–3 недель до случки и в период случки. При недостаточной упитанности крольчих за 3–4 недели до случки их следует перевести на рационы периода сукрольности.

Летом в рацион включают 350 г зеленого корма, 100 г концентратов и 30 г жмыха; зимой – 240 г корнеплодов, 165 г сена, 95 г концентратов и 35 г жмыха.

Кормление сукрольных самок. В период сукрольности большое количество питательных веществ в организме самки расходуется на развитие зародышей и создание необходимых запасов в теле к периоду лактации, поэтому важно обращать особое внимание на сбалансированность рационов по переваримому протеину, минеральным веществам и витаминам. В этот период в рационы крольчих включают по возможности более доброкачественные и легкоусвояемые корма. Из концентрированных кормов дают комбикорм, овес, зерно бобовых; в качестве белкового корма добавляют жмых подсолнечниковый, шрот соевый; из сочных кормов – морковь, силос (норму силоса целесообразно уменьшить до 150 г, а вместо него полезно ввести в рацион морковь). За 5 дней до окрола уменьшают дачу сена (или других грубых кормов) и силоса, заменяя их концентратами.

Зимний рацион сукрольной самки может состоять из 60 г зерна, 15 г пшеничных отрубей, 10 г жмыха, 100 г вареного картофеля, 200 г моркови и 150–170 г сена; второй возможный вариант – 95 г концентратов, 35 г жмыха, 240 г корнеплодов, 165 г сена; третий вариант – 85 г зерновых (овес, ячмень), 55 г жмыха подсолнечникового, 90 г сена клеверо-тимофеечного (или 100 г сена лугового и 80 г сена бобового), 260 г корнеплодов.

Летом сукрольным самкам необходимо давать в сутки по 50 г зерен злаков, 15–20 г зерен бобовых и 550–700 г травы; второй возможный вариант – 100 г концентратов, 30 г жмыха и 350 г зеленого корма; третий вариант – 80–90 г зерновых (овес, ячмень), 38–45 г жмыха подсолнечникового и 320–385 г травы (клевера).

Кормление лактирующих самок. Сукрольным и особенно лактирующим крольчихам необходимо повышенное количество питательных веществ. Нередко наблюдающееся у крольчих патологическое исхудание в период подсоса при неполноценном кормлении, при большом количестве крольчат или длительном содержании их с матерью не удается исправить положение даже обильным кормлением после отъема, что ведет к гибели лучших животных, преждевременной выбраковке или слишком позднему приходу в последующую охоту. Полноценность рационов по протеину и аминокислотам в подсосный период влияет на число окролов у крольчихи за год. Надо стремиться к тому, чтобы не допускать большого снижения живой массы крольчих в процессе лактации.

Цель кормления во все периоды заключается в том, чтобы обеспечить необходимый уровень продуктивности, поддерживать животных в нормальной кондиции. При этом желательным остается индивидуальное кормление в зависимости от величины гнезда, упитанности, молочной продуктивности и т. п. Следует избегать перекармливания крольчих в период сукрольности, так как у них снижается аппетит и впоследствии в период напряженной лактации – первые 25 дней после окрола – такая крольчиха не способна съесть то количество корма, которое необходимо для покрытия больших расходов, связанных с лактацией. Зато лактирующих крольчих, особенно многоплодных, желательно всегда кормить обильно (вволю), причем кормами с повышенным содержанием энергии, протеина и других веществ. В этот период необходимо увеличить в рационе количество сочных молокогонных кормов: летом – травы, зимой – корнеплодов. Норму концентратов увеличивают до 60–70 и даже 80 % питательности рациона.

Для балансирования рациона по витаминам и минеральным веществам в него вводят различные витаминно-минеральные добавки, кормовые дрожжи, (до 20 г), рыбий жир (3–3,5 г), костную или мясокостную муку (5 г), мел (2 г); содержание поваренной соли также увеличивают до 2,5 г.

Питательность рациона самки увеличивают через каждые 10 дней. Главная задача кролиководы – не допустить расстройства пищеварения у лактирующей крольчихи, которая в этот период ест очень много. В самый напряженный момент лактации (17–25 дней) рекомендуется давать кислое или свежее снятое молоко. Это окупится получением крепких крольчат и сохранением здоровья и плодовитости самой крольчихи. Зимой в первую дека-

ду лактации скармливают 105 г зерновых (ячмень, пшеница), 30 г отрубей пшеничных, 80 г жмыха подсолнечникового, 400 г корнеплодов и 133 г сена злаково-бобового; во вторую декаду лактации – 120 г зерновых, 50 г отрубей пшеничных, 100 г жмыха подсолнечникового, 20 г дрожжей кормовых, 530 г корнеплодов, 178 г сена злаково-бобового.

Кормление молодняка. Крольчата начинают выходить из гнезда и пробовать корм с 15-дневного возраста, поэтому с этого времени необходимо увеличить рацион лактирующей крольчихи с учетом численности помета. Этот переходный период, продолжающийся примерно до 45-дневного возраста, очень важен, так как именно с 3 до 7 недель у молодняка наблюдается наибольшая абсолютная скорость роста.

В конце 3-й недели после рождения крольчонок съедает в сутки 5 г гранулированного корма, в конце 4-й – 10, в конце 5-й – 20 и в конце 6-й – 56 г. Одновременно крольчата в подсосный период поедают листочки сена или зеленой массы, но переход к кормлению молодой травой должен быть постепенным. Ее начинают скармливать с 15–20-дневного возраста по 20 г два раза в день, а на 6–7 день дачу увеличивают до 250 г, т. е. до полной суточной нормы. Очень полезно давать в этот период красную морковь, изрезанную на мелкие кусочки. Следует помнить, что в возрасте 20–45 дней зубы еще недостаточно развиты, и крольчата не могут пережевывать цельные зерна, поэтому такие корма, как овес, ячмень и т. д. надо давать дроблеными, размолотыми, плющенными и без остей.

Наиболее ответственный период в жизни молодняка – отсадка его от крольчих. Молодняк отнимают от крольчих обычно в 30–45 дневном возрасте, когда его пищеварительный аппарат еще недостаточно развит и не приспособлен к переработке большого количества корма. Поэтому в рационы такого молодняка следует включать высокопитательные и легкоусвояемые корма – молодую зеленую траву или витаминное сено бобовых и бобово-злаковых растений, овес, вареный картофель, морковь и небольшое количество пшеничных отрубей, из кормов животного происхождения – сухое молоко, мясокостная, рыбная мука. Концентраты следует скармливать в дробленом или плющенном виде. Наиболее интенсивно кролики растут и лучше всего оплачивают корм продукцией до 3,5–4-месячного возраста. В рационах должен быть высокий уровень протеина – не менее 16–17 г на 100 г к. ед.

В период отсадки крольчат часто нарушаются функции пищеварения, что приводит к вздутию кишечника и другим желудочно-кишечным заболеваниям. Поэтому в первые 2 недели отсаженным крольчатам скармливают те же корма, которые они получали под матерью. Новые корма вводят постепенно, заменяя вначале существующий рацион не более чем на 1/3 по питательности.

В зимний период в рацион для молодняка кроликов в зависимости от возраста должно входить от 25 до 60 г зерновых (ячмень, пшеница) 20–25 г пшеничных отрубей, от 30 до 45 г подсолнечникового жмыха, 5 г кормовых дрожжей, от 5 до 15 г рыбной муки, от 50 до 90 г злаково-бобового сена, от 150 до 270 г корнеплодов, 0,5–1 г поваренной соли и 1,5 г трикальцийфосфата.

В летний период в рацион для молодняка кроликов включают от 21 до 51 г зерновых, 17–21 г пшеничных отрубей, от 26 до 38 г подсолнечникового жмыха, 4 г кормовых дрожжей, от 4 до 13 г рыбной муки от 187 до 332 г зеленого корма, 0,5–1 г поваренной соли и 2–3 г трикальцийфосфата. Летом при преобладании в рационе сочных кормов молодняку дают небольшое количество сена. Корм молодняку надо давать часто и небольшими порциями, от 4 до 5–6 раз в сутки.

В возрасте 90–120 дней кроликов переводят на рационы ремонтного молодняка, содержание переваримого протеина в которых составляет 13–16 г на 100 г к.ед.